PŘÍLOHA Č. 4 CHARAKTERISTIKY LESNÍCH TYPŮ

0Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
0Z1	ZAKRSLÝ BOR **modální**	49,96	BO 12–14	LImd', RNtz	(p–hp); kh	slepenec, silicit, ryolit, jílovitá břidlice	skalnaté hřebeny, vrcholy, střední až srázné svahy	0–45+	převážně slunná	(320–)420–800(–840)	BO 9–10, BR 1, DBZ, BK, SM, JR
	Bylinné patro (±25 %):	*Asplenium septentrionale*, *Asplenium trichomanes*, *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Campanula rotundifolia* agg., *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Ceratodon purpureus*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum piliferum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											
0Z4	ZAKRSLÝ BOR **"bonitnější"**	3,3	BO 12	LImd', RNtz, PZt	(p–hp); kh	slepenec	balvanité a skalnaté hřbety, vrcholové plošiny	0–30	převážně slunná	(420–)540–700	BO 9–10, BR 1, DBZ, BK, SM, JR
	Bylinné patro (5–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*; *Cetraria islandica*, *Cladonia rangiferina* s. l.									
Poznámka											
0Z9	ZAKRSLÝ BOR **specifický – se smrkem**	2,55	DB 11–16; BO 12–16; SM 15	LImd', RNtz	(hp); kh	slepenec	skalnaté hřebeny, vrcholy, střední až srázné svahy	0–45+	převážně slunná	620–720	BO 9–10, BR 1, DBZ, BK, SM, JR
	Bylinné patro (±25 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum commune*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

1Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
1Z1	ZAKRSLÁ DOUBRAVA **modální**	75,73	DB 12–16; BO 12–16	RNmd‘m‘, RNtd‘m‘, KAsd‘m‘, LIma‘	p–ph; k–kh	pískovec, ryolit, jílovitá břidlice, slepenec, droba	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné svahy	5–45+	převážně slunná	(200–)300–680(–720)	DBZ 7–9, HB 1, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (30–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Campanula rotundifolia* agg., *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Festuca pallens*, *Jasione montana*, *Pilosella officinarum*, *Potentilla argentea*, *Rumex acetosella*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Ceratodon purpureus*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*, *Polytrichum piliferum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											
1Z2	ZAKRSLÁ DOUBRAVA **chudší**	9,28	DB 14 – 6; BO 12–14	RNtd, RNkd, KAsd, LImd’	p–ph; b–kh	křemenný pískovec, jílovitá břidlice, droba	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné konvexní svahy	5–45+	převážně slunná	(320–)360–560	DBZ 7–9, HB 1, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (40–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Campanula rotundifolia* agg., *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Festuca pallens*, *Jasione montana*, *Pilosella officinarum*, *Potentilla argentea*, *Rumex acetosella*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Ceratodon purpureus*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*, *Polytrichum piliferum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

2Z

2Z0	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	1,08	DB 12–14	ANsk, LImd‘, LIma‘	(p–hp); b–kh	křemenný pískovec (halda, odval, lom)	skeletnaté hrany lomů, haldy	5–45+	převážně slunná	400–480	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, HB, LPM
	Bylinné patro (40–50 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 2Z.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 2Z.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2Z1	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	12,46	DB 12–14	RNkd‘, RNsd‘, RNtd‘, LImd‘	p–ph; k–kh	křemenný pískovec, jílovitá břidlice	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné svahy	0–45+	převážně slunná	(360–)400–540	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, HB, LPM
	Bylinné patro (*20–30 %*):	*Asplenium septentrionale*, *Asplenium trichomanes*, *Calamagrostis arundinacea*, *Cytisus nigricans*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Hieracium murorum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Ceratodon purpureus*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum piliferum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											
2Z2	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	0,41	DB 12–16; BK 12–16; BO 12–16	RNkd(z‘), RNtz‘, RNz, LImd‘	p–hp; k–kh	křemenný pískovec	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné konvexní svahy	5–45+	převážně slunná	480–520	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, HB, LPM
	Bylinné patro (20–40 %):	*Asplenium septentrionale*, *Asplenium trichomanes*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Cytisus nigricans*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Hieracium murorum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Ceratodon purpureus*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum piliferum*, *Umbilicaria* sp. div.; *Cladonia* sp. div., *Xanthoparmelia conspersa*									
Poznámka											

3Z

3Z0	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,99	BO 18; DB 16	ANsk, LImd‘, LIma‘	(p–hp); b–kh	slepenec, pískovec (halda, odval, lom)	skeletnaté hrany lomů, haldy	5–45+	převážně slunná	540–580	BK 5–7, DB 3–5, BR 1, BO, JD
	Bylinné patro (20–40 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3Z.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3Z.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3Z1	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	2,03	BO 18; DB 16	RNkd‘, RNd, KAsd‘, KAsd	p–hp; k–b	ryolit, ryolitový tuf	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné svahy	5–45+	převážně slunná	440–560	BK 5–7, DB 3–5, BR 1, BO, JD
	Bylinné patro (20–25 %):	*Asplenium septentrionale*, *Asplenium trichomanes*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Cytisus nigricans*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Hieracium murorum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											
3Z3	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	0,64	BO 12–16; DB 12–14	RNka‘, RNma‘, KAsa‘	hp; k–b	slepenec	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné svahy	5–45+	převážně slunná	520–560	BK 5–7, DB 3–5, BR 1, BO, JD, LPM, HB
	Bylinné patro (20–30 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Hieracium laevigatum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											
3Z7	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější**	1,24	BO 12–14; DB 12–14	LImd‘, RGy, RNtd‘m‘, RNsd‘m‘	(p–hp); b–kh	slepenec, pískovec	balvanité a skalnaté hřbety, vrcholy, střední až srázné konvexní svahy	5–45+	převážně slunná	520–680	BK 5–7, DB 3–5, BR 1, BO, JD
	Bylinné patro (10-40 %):	*Asplenium septentrionale*, *Asplenium trichomanes*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Euphorbia cyparissias*, *Genista tinctoria*, *Hieracium murorum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Vaccinium myrtillus*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum juniperinum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

4Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4Z1	ZAKRSLÁ BUČINA **modální**	0,54	BK 22–24	RNkd‘, RNd, KAsd‘, KAsd	hp; k–b	slepenec	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné svahy	5–45+	převážně slunná	680–720	BK 6–8, DB 1–2, BR 1, JD, BO
	Bylinné patro (20–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											
4Z2	ZAKRSLÁ BUČINA **chudší**	0,72	BK 16–18; BO 18	RNkd(z‘), RNz, KAsdz‘, PZs	hp; k–b	slepenec	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné konvexní svahy	5–45+	převážně slunná	580–800	BK 6–8, DB 1–2, BR 1, JD, BO
	Bylinné patro (10–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											
4Z7	ZAKRSLÁ BUČINA **skeletnatější**	1,42	BO 12–14; DB 12–14	LImd‘, RGy, RNtd‘m‘, RNsd‘m‘	(p–hp); b–kh	slepenec, pískovec	balvanité a skalnaté hřbety, vrcholy, střední až srázné konvexní svahy	5–45+	převážně slunná	520–660	BK 6–8, DB 1–2, BR 1, JD, BO
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											

5Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5Z1	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	0,89	BK 18; SM 16–20	RNd(z'), RNkd(z'), KAsd(z')	hp; k–b	slepenec	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné svahy	5–45+	převážně slunná	700–740	BK 5–7, JD 1–3, BR 1, BO 1, SM
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5Z2	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	33,63	BO 12–16; SM 10–18	RNkdz', RNz, KAsdz', PZs	p–hp; k–b	slepenec, pískovec, silicit, arkóza, ryolit	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné konvexní svahy	5–45+	převážně slunná	(520–)620–800	BK 5–7, JD 1–3, BR 1, BO 1, SM
	Bylinné patro (0–30 %):	*Asplenium septentrionale*, *Asplenium trichomanes*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

6Z

6Z1	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	0,64	BK 16–18; SM 18–20	RNdz', RNkdz', KPs	hp; k–b	pískovec	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné svahy	5–45+	převážně slunná	760–800	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BR 1, BO, JR
	Bylinné patro (50–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6Z2	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	30,21	SM 18–22; BK 18–20	RNz, KPs, KPt, PZs	p–hp; k–b	slepenec, pískovec, arkóza, droba	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, střední až srázné konvexní svahy	5–45+	převážně slunná	(620–)740–860	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BR 1, BO, JR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
6Z8	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA **Zakrslá smrková jedlina – vrcholový fenomén**	46,19	BK 16–18; SM 18–20	RNdz', RNz, RNs, KPs, (PZs)	hp–ph; k	slepenec, silicit, andezitobazalt	(skeletnaté) ploché hřbety a vrcholy	0–22	převážně slunná	740–860	JD 4–5, SM 3–4, BK 1–2, BR 1, BO, JR
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Lepidozia reptans*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Plagiothecium undulatum*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
6Z9	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA **specifická – vrcholový fenomén**	0,62	BK 16–18; SM 18–20	RNdz', RNz, RNs, KPs, (PZs)	hp–ph; k	slepenec	(skeletnaté) ploché hřbety a vrcholy	0–22	převážně slunná	800–840	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BR 1, BO, JR
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Lepidozia reptans*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Plagiothecium undulatum*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

0Y

0Y1	SKELETOVÝ BOR **modální (dubo–bukový)**	1,61	BO 16–24	LImd', RGy, (RNtz, PZt)	(p); b–kh	křemenný slepenec	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	660–720	BO 5–7, BK 1–2, BR 1, DBZ 1, BRP, JR, SM, JD
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*, *Polytrichum juniperinum*; *Cladonia rangiferina* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
0Y4	SKELETOVÝ BOR **se SM vyšších poloh**	6,59	BO 18–24	LImd‘, RGy, (RNtz, PZt)	(p); b–kh	křemenný slepenec	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	580–720	BO 5–7, SM 1–3, BK 1–2, BRP 1–2, BR, JR, JD
	Bylinné patro (0–30 %):	*Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Dryopteris carthusiana*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*, *Polytrichum juniperinum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

2Y

2Y0	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	9,54	BO 16–20; DB 16–20	ANsk, LImd‘, (LIma‘)	(p–hp); b–kh	křemenný pískovec (halda, odval, lom)	balvanité a skalnaté hrany lomů, odvaly	5–45+	různá	340–500	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO
	Bylinné patro (10–20 %):	*Avenella flexuosa*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2Y1	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	5,38	BO 16–20; DB 16–20	LImd‘, RGy, RNtd‘, RNsd‘	(p–hp); b–kh	křemenný pískovec, křemenný slepenec	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	400–520	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO
	Bylinné patro (>10 %):	*Avenella flexuosa*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2Y3	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	0,86	BK 20; BO 22; BR 24; MD 22	LIma‘, RGy, RNta‘, RNsa‘	(p–hp); b–kh	pískovec	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	340–440	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, LPM, JV, HB
	Bylinné patro (30–50 %):	*Agrostis capillaris*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula rotundifolia*, *Carex pilulifera*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Rubus idaeus*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum piliferum*; *Cladonia* sp. div., *Parmelia saxatilis*									
Poznámka											

3Y

3Y0	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	7,29	BK 22; BO 20	ANsk, LImd‘, (LIma‘)	(p–hp); b–kh	pískovec, slepenec, silicit, ryolit (halda, odval, lom)	balvanité a skalnaté hrany lomů, odvaly	5–45+	různá	380–580(–620)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*, *Polytrichum juniperinum*; *Cetraria islandica*, *Cladonia rangiferina* s. l.									
Poznámka											

3Y1	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	69,23	SM 22–24; BK 18–22	LImd‘, RGy, RNsd‘, RNtd‘	(p–hp); b–kh	pískovec, slepenec, droba, ryolit	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	(280–)340–620(–680)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3Y3	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	26,42	BK 20–24; DBZ 18–22	LIma‘, RGy, RNta‘, RNsa‘	(p–hp); b–kh	pískovec, slepenec	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	(360–)420–660	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, JV, HB
	Bylinné patro (20–40 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Isothecium alopecuroides*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3Y9	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	0,03	BK 20–24; DBZ 18–22	RNsd‘m‘, RNtd‘m‘, LImd(a‘), (RGy)	(ph); b–kh	jílovitá břidlice	skeletnaté rokle	22–45+	stinná	400–420	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (20–50 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris dilatata*, *Dryopteris filix-mas*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Eurhynchium angustirete*, *Plagiomnium affine* s. l., *Rhizomnium punctatum*, *Tetraphis pellucida*									
Poznámka											

4Y

4Y0	SKELETOVÁ BUČINA **antropogenní**	1,97	SM 20–24; BK 20–24	ANsk, LImd‘, (LIma‘)	(p–hp); b–kh	pískovec, slepenec (halda, odval, lom)	balvanité a skalnaté hrany lomů, odvaly	5–45+	různá	480–680	BK 7–9, JD 1–2, DB 1–2, BR, BO
	Bylinné patro (10–40 %):	*Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 4Y*.									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4Y1	SKELETOVÁ BUČINA **modální**	318,67	SM 20–24; BK 20–24	LImd‘, RGy, RNsd‘, RNtd‘	(p–hp); b–kh	pískovec, slepenec, droba, silicit	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	(440–)480–660(–720)	BK 7–9, JD 1–2, DB 1–2, BR, BO
	Bylinné patro (10–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

4Y3	SKELETOVÁ BUČINA **bohatší**	3,72	DB; BK 20–24; SM; BO 22–24	LIma‘, RGy, RNta‘, RNsa‘	(hp–ph); b–kh	slepenec, droba, prachovec, jílovitá břidlice	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	(480–)520–680	BK 7–9, JD 1–2, DB 1–2, BR, BO, LPM, JV
	Bylinné patro (30–50 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5Y

5Y1	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	140,56	SM 22–24; BK 22–24; BO 18–22	LImd‘, RGy, RNsd‘, RNtd‘	(p–hp); b–kh	slepenec, droba, pískovec, silicit, ryolit	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	(560–)600–780(–820)	BK 5–7, JD 1–3, BR 1, SM 1, BO
	Bylinné patro (10–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5Y3	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	14,35	BK 24–28; SM 24–28	LIma‘, RGy, RNta‘, RNsa‘	(hp–ph); k–b, kh	slepenec, pískovec, andezitobazalt	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	620–760	BK 5–7, JD 1–3, BR 1, SM 1, BO, KL, LP
	Bylinné patro (20–40 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris dilatata*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6Y

6Y1	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	65,21	SM 22–24; BK 20–24	LImd‘, RGy, RNsd‘, RNtd‘	(p–hp); b–kh	slepenec, pískovec, droba, ryolit, silicit	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny	5–45+	různá	(620–)740–860	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BR 1, BO, JR
	Bylinné patro (0–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

6Y8	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA **Skeletová smrková jedlina – vrcholový fenomén**	9,17	SM 22–24; BO 24	LImd‘, RGy, RNtdz‘, RNtz	(p–hp); b–kh	slepenec, pískovec, droba, silicit	balvanité a skalnaté příkré až srázné svahy, hřebeny, vrcholy	5–45+	převážně slunná	740–860	JD 4–5, SM 3–4, BK 1–2, BR 1, BO, JR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

2M

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2M1	CHUDÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	0,97	DB 16–18; BO 16–18	KArdz‘, PZr	p; (š–k)	křemenný pískovec	plošiny, mírné až střední svahy, ploché hřbety	0–22	převážně slunná	400–460	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR 1, JR
	Bylinné patro (20–90 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Hieracium murorum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum undulatum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

3M

3M1	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	192,92	BO 16–18; BK 16–18	KAdz‘, KArdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	křemenný slepenec, pískovec, arkóza, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy, ploché hřbety	0–22	převážně slunná	(400–)440–660	BK 5–7, DBZ 3–5, BO 1, BR 1, JD
	Bylinné patro (30–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*; *Cladonia* sp. div.									
3M1e	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **modální exponovaná**	25,53	"	"	"	křemenný slepenec, pískovec, droba, ryolit	příkré svahy	22–45	převážně slunná	420–640	"
	Bylinné patro (30–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

3M2	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	75,35	BO 16–18; BK 16–18	KAdz‘, KArdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	křemenný slepenec, pískovec, arkóza, silicit	plošiny, mírné až střední svahy, hřbety, kupy	0–22	převážně slunná	400–580 (–620)	BK 5–7, DBZ 3–5, BO 1, BR 1, JD
	Bylinné patro (30–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l.									
Poznámka											

4M

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4M1	CHUDÁ BUČINA **modální**	254,28	SM 18–20; BK 18–20	KAdz‘, KArdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	křemenný slepenec, pískovec, arkóza, droba	plošiny, mírné až střední svahy, ploché hřbety	0–22	převážně slunná	(440–)500–700	BK 5–7, DBZ 1–2, JD 1–2, BO 1, BR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*; *Cladonia rangiferina* s. l.									
Poznámka											
4M2	CHUDÁ BUČINA **chudší**	2,15	BK 20; BO 20–22	KAdz‘, KArdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	křemenný pískovec, křemenný slepenec, droba	plošiny, mírné až střední svahy, hřbety, kupy	0–22	převážně slunná	620–640	BK 5–7, DBZ 1–2, JD 1–2, BO 1, BR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

5M

5M1	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	642,63	SM 18–22; BK 18–22; BO 18–20	KAdz‘, KArdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	křemenný slepenec, pískovec, arkóza, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy, ploché hřbety	0–22	převážně slunná	(560–)620–820(–860)	BK 5–7, JD 3–5, BO 1, SM 1, BR, JR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*; *Cladonia rangiferina* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5M2	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	19,01	BK 24; SM 24	KAdz‘, KArdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	křemenný pískovec, ryolit, ryolitový tuf	plošiny, mírné až střední svahy, hřbety, kupy	0–22	převážně slunná	660–720	BK 5–7, JD 3–5, BO 1, SM 1, BR, JR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											
5M5	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA **vlhčí**	46,25	BK 20–22; SM, JD 20–22; BO 22–24	KAdz‘(g‘), KArdz‘(g‘), PZr(g‘)	p–hp; (š)	křemenný slepenec, křemenný pískovec	plošiny, mírné až střední svahy (konkávní)	0–15	různá	660–780	BK 5–7, JD 3–5, BO 1, SM 1, BR, JR
	Bylinné patro (50–80 %):	*Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

6M

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6M1	CHUDÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	404,81	SM 20–22; BK 18–22	KPr, KPm, PZr, PZm	p–hp; (š–k)	křemenný slepenec, pískovec, arkóza, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy, ploché hřbety	0–22	převážně slunná	(680–)720–880	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BO 1, BR, JR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
6M1e	CHUDÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální exponovaná**	6,98	SM 20–22; BK 18–22	KPr, KPm, PZr, PZm	p–hp; (š–k)	křemenný slepenec, křemenný pískovec	příkré svahy	22–45	"	700–800	"
	Bylinné patro (20–40 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

2K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2K1	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	221,79	DB 18–22; BO 18–22; BK 18–22	KAd, KAmd‘, KArd, KArd‘	p–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(200–)260–520	DBZ 5–7, BK 2–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*									
2K1e	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální exponovaná**	39,15	DB 16–22; BO 16–22	"	"	pískovec, droba, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–45	"	(200–)240–420(–480)	"
	Bylinné patro (30–70 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

2K2	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	57,35	DB 18–20; BK 18–20; BO 18–20;	KAd(z‘), KArd(z‘), (PZr)	p–hp; (š–k)	křemenný pískovec, slepenec, droba, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy, ploché hřbety, vrcholy	0–22	různá	(220–)280–520	DBZ 5–7, BK 2–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2K4	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	123,76	DB 18–20; BO 18–20; BK 18–20	KAd, KAmd‘, KArd, KArd‘	p–hp; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, jílovitá břidlice	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	(280–)360–540	DBZ 5–7, BK 2–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (20–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Cytisus nigricans*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

2K7	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější**	7,88	DB 16–20; BK 16–20; BO 18–22	KAd(s‘), KArd(s‘), KAmd‘(s‘), KArd‘(s‘)	p–ph; (k)	pískovec, droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	360–480	DBZ 5–7, BK 2–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (45–75 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

3K

3K0	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	2,84	DB 16–18; BO 18–20	AN, KAad, KAard	p–hp; (š–k)	pískovec, slepenec, ryolit (navážka, halda, odval)	antropogenní tvary, navážky, haldy	0–22	různá	420–500	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (25–60 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3K.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesních typů 3K.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3K1	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	1 819,93	BO 20–24; BK 22–24; DB 20–22; SM 22–26	KAd, KAmd', KArd, KArd'	p–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, ryolit, silicit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(280–)380–560(–600)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*									
3K1e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **modální exponovaná**	149,92	"	"	"	pískovec, slepenec, droba, ryolit	příkré svahy	22–45	"	(280–)360–600(–640)	"
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3K2	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	972,58	BO 20–22; DB 20–22; BK 20–20	KAd(z'), KArd(z'), (PZr)	p–hp; (š–k)	křemenný pískovec, ryolit, slepenec, droba, silicit	plošiny, mírné až střední svahy, hřbety	0–22	různá	(380–)420–560(–700)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Ptilidium ciliare*									
3K2e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší exponovaná**	1,85	BK 20–22; DB 18–22; BO 18–22	"	"	křemenný slepenec, křemenný pískovec, droba	příkré svahy	22–45	"	400–480	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

3K3	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	365,97	BO 20–24; BK 22–24; DB 20–22; SM 22–26	KAmd', KArd', (KAd, KArd)	p–ph; (š–k)	pískovec, droba, slepenec, prachovec, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	400–540(–580)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3K4	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	1 576,65	BO 20–24; BK 22–24; DB 20–22; SM 22–26	KAd, KAmd‘, KArd, KArd‘	p–hp; (š–k)	pískovec, slepenec, ryolit, droba, silicit	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	(320–)400–600(–640)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Silene nutans*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*									
3K4e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší exponovaná**	2,76	BK 22–26; DB 20–24; SM 22–26; BO 20–24	"	"	pískovec, droba, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–45	"	340–440	"
	Bylinné patro (35–55 %):	– „ –									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3K5	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	114,24	BK 24; DB 22; SM 24; BO 22	KAd(g‘), KAmd‘(g‘)	hp–ph; (š)	pískovec, slepenec, prachovec, jílovec, ryolit	plošiny, mírné (až střední) konkávní svahy	0–15	různá	420–580	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (50–90 %):	*Agrostis capillaris*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3K7	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější**	171,03	BK 20–22; DB 18–22; SM 20–22; BO 20–22	KAd(s'), KArd(s'), KAmd'(s'), KArd'(s')	p–ph; (k)	pískovec, ryolit, slepenec, droba	plošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	(340–)420–580	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula rotundifolia* agg., *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*									
3K7e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější exponovaná**	0,43	BK 20–24; DB 20–22; SM 20–24; BO 20–22	"	p–hp; (k)	slepenec	příkré svahy	22–45	"	400–420	"
	Bylinné patro (30–50 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K1	KYSELÁ BUČINA **modální**	1 975,02	SM 24–26; BK 24–26	KAd, KArd, (KAmd', KArd')	p–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, silicit, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(400–)480–640(–720)	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
4K1e	KYSELÁ BUČINA **modální exponovaná**	4,88	"	"	"	slepenec, pískovec	příkré svahy	22–45	"	420–660	"
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4K2	KYSELÁ BUČINA **chudší**	1 492,26	BO 20–22; SM 22–24	KAd(z'), KArd(z'), (PZr)	p–hp; (š–k)	křemenný pískovec, arkóza, slepenec, ryolit, granit	plošiny, mírné až střední svahy, hřbety	0–22	různá	(440–)480–680(–760)	BK 7–9, DB 1–2, JD 1–2, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Ptilidium ciliare*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K3	KYSELÁ BUČINA **bohatší**	70,34	SM 24–26; BK 24–26	KAmd‘, KArd‘, (KAd, KArd)	p–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, prachovec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(420–)460–600(–700)	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K4	KYSELÁ BUČINA **sušší**	339,38	SM 24–26; BK 24–26	KAd, KArd, (KAmd‘, KArd‘)	p–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, silicit	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	(440–)480–660	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (20–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K5	KYSELÁ BUČINA **vlhčí**	109,51	SM 24–28; MD 26–28; BK 24–26; BR 22	KAd(g‘), KAmd‘(g‘)	hp–ph; (š)	pískovec, slepenec, droba, prachovec	plošiny, mírné (až střední) konkávní svahy	0–15	různá	440–640	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (20–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Pyrola minor*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K7	KYSELÁ BUČINA **skeletnatější**	179,71	BK 22–26; SM 24–26	KAd(s'), KArd(s'), KAmd'(s'), KArd'(s')	p–ph; (k)	pískovec, slepenec, droba, prachovec	plošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	460–660 (–700)	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
4K7e	KYSELÁ BUČINA **skeletnatější exponovaná**	3,43	"	"	"	slepenec	příkré svahy	22–45	"	420–520	"
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

5K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5K1	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	2 635,66	SM 24–28; BK 24–26	KAd, KArd, (KAmd', KArd')	p–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, ryolit, silicit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(520–)600–780(–840)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
5K1e	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální exponovaná**	0,48	"	"	"	"	příkré svahy	22–45+	"	660–680	"
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

5K2	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	1 374,53	SM 22–24; BK 22–24	KAd(z'), KArd(z'), (PZr)	p–hp; (š–k)	křemenný pískovec, arkóza, slepenec, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy, hřbety	0–22	různá	(500–)600–820(–860)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (30–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Ptilidium ciliare*									
5K2e	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší exponovaná**	6,36	SM 22–24; BK 22–24	KAd(z'), KArd(z'), (PZr)	p–hp; (š–k)	křemenný pískovec, ryolit	příkré svahy	22–45	různá	640–720	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5K3	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	77,79	SM 24–28; BK 24–26	KAmd‘, (KAd)	hp–ph; (š–k)	pískovec, droba, prachovec, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	640–720 (–780)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5K4	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **sušší**	288,38	SM 24–26; BK 24–26	KAd, KArd, (KAmd‘, KArd‘)	hp–ph; (š–k)	pískovec, droba, slepenec, prachovec	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	580–760	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5K7	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	82,91	BK 24–26; SM 24–26; JD 22–24	KAd(s‘), KArd(s‘), (KAmd‘(s‘), KArd‘(s‘))	p–ph; (k)	pískovec, slepenec, silicit	plošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	(540–)580–760	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6K1	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	411,54	SM 22–26; BK 22–24	KPm, KAdz‘, KPr, KArdz‘	p–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(620–)680–840	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (20–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
6K2	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	354,64	SM 20–24; BK 20–24	KPm, PZm, KPr, PZr	p–ph; (š–k)	křemenný pískovec, arkóza, slepenec, droba	plošiny, mírné až střední svahy, hřbety	0–22	různá	(640–)680–860	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BO 1, BR, JR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
6K2e	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší exponovaná**	0,5	"	"	"	křemenný pískovec	příkré svahy	22–45	"	740–760	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6K3	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **bohatší**	1,73	SM 22–26; BK 22–24	KPm, KAd(z'), (KPr)	p–ph; (š–k)	pískovec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	800–840	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (30–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
6K7	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější**	7,67	BK 22–24; SM 24–26; JD 22–24	KPm(s'), KAdz'(s'), KPr(s'), KArdz'(s')	p–ph; (k)	pískovec	plošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	720–780	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
0N											
0N1	KYSELÝ KAMENITÝ BOR **modální**	5,32	BO 18–22	PZrs, RNz	p; k–b	křemenný slepenec	balvanité plošiny až střední svahy	0–22	různá	620–700	BO 7–9, DBZ 1–3, BK 1–3, SM, BR, BRP, JR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2N											
2N0	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,51	DB 20–24; BO 22–24; LP 20–24	AN(sk), KAasd, KAarsd	p–hp; k–b	pískovec (halda, odval, lom)	kamenité antropogenní tvary	5–45+	různá	400–460	DBZ 5–7, BK 2–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–60 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 2N.									
	Mechové patro:	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 2N.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2N1	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	55,84	DB 18–22; BO 18–22	KAsd, KAsd', RNd, RNkd'	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, droba, jílovitá břidlice	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	200–540	DBZ 5–7, BK 2–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula rotundifolia*, *Cytisus nigricans*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Ceratodon purpureus*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiothecium denticulatum*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum juniperinum*, *Polytrichum piliferum*; *Cladonia* sp. div., *Xanthoparmelia conspersa*									
Poznámka											

3N

3N0	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,75	BK 22–24; DB 18–22; SM 22–24	AN(sk), KAasd	ph; k–b	jílovitá břidlice (halda, odval, lom)	kamenité antropogenní tvary	5–45+	různá	400–440	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–60 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3N.									
	Mechové patro:	*Ceratodon purpureus*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiothecium denticulatum*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum juniperinum*, *Polytrichum piliferum*; *Cladonia* sp. div., *Xanthoparmelia conspersa*									
Poznámka											

3N1	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	286,68	BK 20–24; DB 18–22; SM 20–24; BO 18–22	KAsd, KAsd', RNd, RNkd'	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, droba, ryolit, granit	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	(220–)400–560(–640)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Hieracium lachenalii*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3N2	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	69,02	BK 18–22; DB 18–20; SM 18–22	KAsd(z'), RNd(z'), RNz	p–hp; k–b	křemenný pískovec, křemenný slepenec, ryolit, droba	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety, kupy	5–45+	různá	(360–)440–620	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Ceratodon purpureus*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiothecium denticulatum*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum juniperinum*, *Polytrichum piliferum*; *Cladonia* sp. div., *Xanthoparmelia conspersa*									
Poznámka											
3N3	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	27,25	DB 20–22; SM 24–28; BO 22	KAsd', RNkd', (KAsd, RNkd)	p–ph; k–b	pískovec, ryolit, slepenec, droba	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	400–580	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiothecium denticulatum*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
3N4	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	157,57	SM 22–24; BK 22–24	KAsd, KAsd', RNd, RNkd'	p–ph; k–b	pískovec, ryolit, slepenec, droba	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety, kupy	5–45+	převážně slunná	(380–)420–640(–720)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–50 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

4N

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4N0	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **antropogenní**	10,46	SM 22–26; BK 22–24	AN(sk), KAasd, KAarsd	p–hp; k–b	pískovec (halda, odval, lom)	kamenité antropogenní tvary	5–45+	různá	500–640	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 4N.									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
4N1	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **modální**	597,42	SM 22–26; BK 22–24	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, droba, ryolit	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	(380–)480–660(–720)	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
4N2	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **chudší**	94,95	SM 22–24; BK 22–24	KAsd(z'), RNd(z'), RNz	p–ph; k–b	křemenný pískovec, křemenný slepenec, silicit, prachovec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety, kupy	5–45+	různá	480–660	BK 7–9, DB 1–2, JD 1–2, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4N3	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **bohatší**	899,77	SM 22–26; BK 22–24	KAsd‘, RNkd‘, (KAsd, RNkd)	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, droba, ryolit, prachovec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	(420–)480–660(–720)	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
4N4	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **sušší**	60,87	SM 22–26; BK 22–24	KAsd, RNd, (KAsd‘, RNkd‘)	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, droba, ryolit	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety, kupy	5–45+	převážně slunná	(480–)540–700	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
4N7	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **skeletnatější**	48,71	BK 18–22; BO 22–24; SM 20–22	KAsd, RNd, RNs, RNt	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, jílovitá břidlice	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	480–680 (–720)	BK 7–9, JD 1–2, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5N

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5N1	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	284,57	SM 26–28; BK 26–28	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, droba, ryolit, granodiorit	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	(520–)580–760(–820)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
5N2	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	622,65	SM 24–26; BK 24–26	KAsd(z'), RNd(z'), RNz	p–hp; k–b	křemenný slepenec, křemenný pískovec, ryolit, silicit, arkóza	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety, kupy	5–45+	různá	(540–)600–800(–840)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
5N3	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	301,3	SM 26–28; BK 26–28	KAsd', RNkd', (KAsd, RNkd)	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, droba, ryolit	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	(480–)560–740(–780)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5N4	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **sušší**	19,82	BK 22–26; SM 24–26; JD 22–24	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	p–ph; k–b	slepenec, pískovec, droba, prachovce	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety, kupy	5–45+	převážně slunná	540–700 (–760)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5N7	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	22,83	BK 26–28; KL 26–28; MD 30–32; SM 26–30	KAsd, RNd, RNs, RNt	p–hp; k–b	slepenec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	560–760	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
6N											
6N1	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	35,37	SM 24–26; BK 24–26	KPs, RNdz'	p–hp; k–b	pískovec, slepenec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	580–820	BK 4–5, SM 3–4, SM 1–3, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula pilosa*, *Melampyrum sylvaticum*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6N2	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	343,47	SM 20–24; BK 20–24	KPs, PZs, RNz	p–hp; k–b	slepenec, pískovec, arkóza, ryolit	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety, kupy	5–45+	různá	(600–)700–860	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–3, BO 1, BR, JR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
6N3	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **bohatší**	46,34	SM 24–26; BK 24–26	KAsd(z'), KPs, RNkd', RNd	p–ph; k–b	slepenec, pískovec, droba, ryolit	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	640–820	BK 4–5, SM 3–4, SM 1–3, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
6N7	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější**	0,26	BK 22–24; SM 24–26; JD 22–24	RNdz', RNsz', RNtz', (KPs)	p–hp; k–b	pískovec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	760–800	BK 4–5, SM 3–4, SM 1–3, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6N8	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **Kyselá kamenitá smrková jedlina – vrcholový fenomén**	66,2	SM 20–24; BK 20–24	KPs, PZs, RNdz‘, RNz	p–ph; k–b	slepenec, pískovec, arkóza, droba	kamenité ploché hřbety a vrcholy	0–22	převážně slunná	780–860	JD 4–5, SM 3–4, BK 1–2, BR, JR, BO
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula pilosa*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiothecium undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
6N9	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **specifická – s borovicí**	50,77	SM 20–24; BK 20–24	KPs, PZs, RNz	p–hp; k–b	silicit, ryolit	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	740–800	BK 4–5, SM 3–4, JD 1–2, BO 1–2, BR, JR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

2I

2I1	KYSELÁ HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	62,13	DB 16–22; BO 16–22	LUd(g‘), LUmd‘(g‘), KAld‘(g‘), KAmd‘(g‘)	ph–jh	droba, prachovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	380–460	DBZ 5–7, BK 2–3, BO 1, BR, JR, JD
	Bylinné patro (40–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2I2	KYSELÁ HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	58,02	DB 16–20; BO 16–20	LUd(g'), KAld(g'), KAd(g')	ph–h	droba, prachovec, slepenec, hlinitý překryv	pošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	(320–)360–520	DBZ 5–7, BK 2–3, BO 1, BR, JR, JD
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

3I

3I1	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	1 517	BK 22–26; DB 20–24; SM 22–26; BO 20–24	LUd(g'), LUmd'(g'), KAld'(g'), KAmd'(g')	ph–jh	droba, prachovec, pískovec, ryolit, hlinitý překryv	pošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	(320–)380–540(–580)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–2, BR, BO
	Bylinné patro (60–90 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pallescens*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Potentilla erecta*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

3I2	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	1 126,46	BK 20–24; DB 18–22; SM 20–24; BO 18–22	KAld(g'), KAd(g'), LUd(g')	hp–h	droba, prachovec, pískovec, ryolit, hlinitý překryv	pošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	(320–)360–540(–580)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–2, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Convallaria majalis*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3I3	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	73,83	BK 22–26; DB 20–24; SM 22–26; BO 20–24	LUmd‘(g‘), KAld‘(g‘), KAmd‘(g‘)	ph–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	plošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	380–520	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–2, BR, BO
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pallescens*, *Convallaria majalis*, *Fragaria vesca*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

4I

4I1	KYSELÁ HLINITÁ BUČINA **modální**	1 586,91	SM 24–28; BK 24–26	LUd, KAld, (LUmd‘, KAld‘)	ph–jh	jílovitá břidlice, prachovec, droba, pískovec, hlinitý překryv	plošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	(400–)440–620(–680)	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4I2	KYSELÁ HLINITÁ BUČINA **chudší**	529,74	BK 22–24; SM 22–26	KAld(g‘), KAd(g‘), LUd(g‘)	hp–h	droba, prachovec, pískovec, hlinitý překryv	plošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	(440–)480–640(–680)	BK 7–9, JD 1–2, DB 1–2, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4I5	KYSELÁ HLINITÁ BUČINA **vlhčí**	15,41	BK 24–28; SM 24–30	LUdg‘, KAldg‘, (LUmg‘d‘, KAlg‘d‘)	h–jh	jílovitá břidlice, prachovec, hlinitý překryv	plošiny, (mírné svahy)	0–10	různá	480–540	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5I

5I1	KYSELÁ HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	177,76	SM 24–28; BK 24–26	KAld, (LUd, KAld‘)	ph–h	droba, slepenec, pískovec, ryolit, hlinitý překryv	plošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	560–760	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Plagiomnium undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Ptilium crista-castrensis*									
Poznámka											

2S

2S1	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	17,2	BK 22–24; DB 22–24; BO 20–24	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, prachovec, andezit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	240–380 (–500)	DBZ 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2S2	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	81,1	DB 20–24; BO 20–24	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	pískovec, prachovec, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	220–460	DBZ 5–7, BK 2–3, LPM, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

2S3	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	37,31	DB 20–24; BK 22–24; BO 20–24	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(200–)240–380	DBZ 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (60–80 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Convallaria majalis*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Scrophularia nodosa*, *Senecio ovatus*, *Stellaria holostea*, *Veronica chamaedrys*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachytheciastrum velutinum*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*									
2S3e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší exponovaná**	1,13	DB 20–24; BK 22–26; BO 20–24	"	ph; (š–k)	jílovitá břidlice	příkré svahy	22–45	"	240–300	"
	Bylinné patro (55–75 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2S4	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	111,91	DB 20–24; BO 20–24	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, slepenec, andezit	mírné až střední svahy (horní části)	5–22	převážně slunná	(200–)280–500(–540)	DBZ 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Carex pilulifera*, *Festuca heterophylla*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Hypericum perforatum*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Silene nutans*, *Stellaria holostea*, *Trifolium medium*, *Veronica officinalis*, *Viola hirta*									
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*									
2S4e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší exponovaná**	2,47	DB 20–24; BK 22–26; BO 20–24	"	"	droba, pískovec, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–45	"ná	200–280 (–460)	DBZ 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (55–75 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2S7	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější**	15,27	DB 20–24; BO 20–24	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, pískovec, prachovec, slepenec	pošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	240–500	DBZ 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Convallaria majalis*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Genista tinctoria*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*									
2S7e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější exponovaná**	7,59	DB 20–24; BK 22–24; BO 20–24	"	"	droba, pískovec, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–45+	"	240–380	"
	Bylinné patro (30–50 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

3S

3S0	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	1,46	BK 24–28; DB 22–24; SM 24–28	AN, KAaa‘	hp–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba (navážka, halda, odval)	antropogenní tvary, navážky, haldy	0–22	různá	420–500	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (35–60 %):	*Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3S*.									
	Mechové patro:	*Různá kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesních typů 3S*.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3S1	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **modální**	750,46	SM 26–28; BK 26–28	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, slepenec, ryolit, andezit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(280–)400–540(–580)	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
3S1e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **modální exponovaná**	0,67	"	"	"	jílovitá břidlice	příkré svahy	22–45	"	480–500	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

3S2	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	35,55	BK 24–26; DB 22–24; SM 24–26; BO 22–24	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, prachovec, ryolit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	360–520	BK 5–7, DB 3–4, JD 1, LPM, KL, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3S3	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	57,23	BK 24–26; DB 22–24; SM 24–28	KAma‘	ph; (š–k)	droba, pískovec, jílovitá břidlice, andezitobazalt	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(280–)320–540	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Convallaria majalis*, *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Galium odoratum*, *Maianthemum bifolium*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hylocomium splendens*, *Mnium hornum*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

3S4	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	643,14	BK 24–26; DB 22–24; SM 24–26; BO 22–24	KAma‘	hp–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, andezit	mírné až střední svahy (horní části)	5–22	převážně slunná	(300–)360–540(–580)	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (35–65 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Carex digitata*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

3S5	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	41,25	BK 24–28; DB 22–24; SM 24–28	KAma‘(g‘)	ph; (š)	jílovitá břidlice, droba, pískovec, andezitobazalt	dolní části mírných svahů, mělké úžlabiny	0–15	různá	(400–)460–540	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Impatiens noli-tangere*, *Juncus effusus*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nummularia*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3S7	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější**	109,2	SM 24–28; BK 24–28	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	pískovec, slepenec, droba, andezitobazalt	plošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	(300–)420–540	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (35–65 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium lachenalii*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
3S7e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější exponovaná**	1,46	"	"	"	pískovec	příkré svahy	22–45	"	300–400	"
	Bylinné patro (35–65 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium lachenalii*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka	0										

4S

4S0	SVĚŽÍ BUČINA **antropogenní**	18,29	BK 24–28; SM 26–28	AN, KAaa‘	hp–ph; (š–k)	pískovec (navážka, halda, odval)	antropogenní tvary, navážky, haldy	0–22	různá	(500–)580–620	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 4S.									
	Mechové patro:	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 4S.									
Poznámka											

4S1	SVĚŽÍ BUČINA **modální**	1 279,43	SM 24–28; BK 24–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, andezit, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(420–)480–640(–700)	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Galium rotundifolium*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4S3	SVĚŽÍ BUČINA **bohatší**	57,83	BK 24–30; SM 26–30	KAma‘	ph; (š–k)	jílovitá břidlice, droba, pískovec, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(460–)500–600(–660)	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											
4S4	SVĚŽÍ BUČINA **sušší**	233,14	SM 24–28; BK 24–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	pískovec, slepenec, droba, andezitobazalt	mírné až střední svahy (horní části)	5–22	převážně slunná	(400–)440–640(–680)	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4S5	SVĚŽÍ BUČINA **vlhčí**	27,81	BK 24–30; SM 26–30	KAma‘(g‘)	ph; (š)	jílovitá břidlice, prachovec, pískovec, slepenec	dolní části mírných svahů, mělké úžlabiny	0–22	různá	440–600	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiothecium curvifolium*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4S7	SVĚŽÍ BUČINA **skeletnatější**	70,27	SM 24–28; BK 24–26	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	pískovec, droba, prachovec, andezitobazalt, gabro	plošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	460–640	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5S

5S1	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	738	SM 28–32; BK 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, andezit, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(500–)600–740(–780)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Galium rotundifolium*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5S2	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	4,09	SM 24–26	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	silicit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	620–660	BK 5–7, JD 3–5, SM, LPM, KL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5S7	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	53,27	SM 28–30; BK 26–28	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	pískovec, droba, prachovec, andezitobazalt	pošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	0–22	různá	(560–)600–760	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6S

6S1	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	5,83	SM 28–30; BK 26–30	KAmd‘m‘, KAd, KPm	hp–ph; (š–k)	pískovec, droba, arkóza	pošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	740–800	BK 4–5, SM 1–3, JD 1–3, KL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Galium rotundifolium*, *Homogyne alpina*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Lycopodium annotinum*, *Mnium spinulosum*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2F

2F0	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,62	DB 18–22; BK 20–24; BO 18–22	AN(sk), KAasa‘	hp–ph; k–b	pískovec, droba (halda, odval, lom)	kamenité antropogenní tvary	5–45+	různá	200–240	DBZ 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, DBL, JV
	Bylinné patro (55–75 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Fragaria vesca*, *Galium sylvaticum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Lathyrus vernus*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*, *Silene nutans*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	0,66	DB 20–24; BO 20–24	KAsa', RNka', (RNma')	hp–ph; k–b	pískovec, droba	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	220–260	DBZ 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, DBL, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Fragaria vesca*, *Galium sylvaticum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Lathyrus vernus*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*, *Silene nutans*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3F

3F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	26,1	SM 24–26; BK 24–26	KAsa', RNka', (RNma')	hp–ph; k–b	pískovec, slepenec, ryolit, andezit, droba	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	300–580	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Galium rotundifolium*, *Geranium robertianum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Scrophularia nodosa*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	2,09	BK 24–30; DB 24–28; SM 24–30	KAsa', RNka', (RNma')	ph; k–b	jílovitá břidlice	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy	5–45+	různá	380–460	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum odoratum*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3F4	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	4,56	BK 24–28; DB 22–26; SM 24–28	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	andezit, andezitobazalt, pískovec, slepenec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy (horní části), hřbety	5–45+	převážně slunná	440–520	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (45–75 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Geranium robertianum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Scrophularia nodosa*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3F9	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	1,83	BK 26; SM 26	KAsa‘, RNka‘	ph; k–b	jílovitá břidlice	kamenité rokle, erozní rýhy	22–45+	stinná	360–480	BK 5–7, DB 2–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (35–55 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4F

4F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **modální**	62,58	SM 26–30; BK 26–28	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	pískovec, jílovitá břidlice, slepenec, andezit, andezitobazalt	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	460–660	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (45–75 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **bohatší**	15,05	BK 24–30; SM 26–30	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	ph; k–b	jílovitá břidlice	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy	5–45+	různá	500–660	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum odoratum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											
4F4	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **sušší**	4,15	SM 26–30; BK 26–28	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	pískovec, slepenec, jílovitá břidlice	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy (horní části), hřbety	5–45+	převážně slunná	500–640	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (45–75 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5F											
5F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	3,35	SM 28–32	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	pískovec, arkóza, droba, jílovitá břidlice	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	600–660	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (45–75 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2C

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2C1	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	44,76	DB 18–20; BK 18–20 BO 18–20	KAms‘a‘, KAsa‘, RNka‘	hp–ph; š–k	pískovec, jílovitá břidlice, ryolit, andezit	mírné až příkré (srázné) konvexní svahy, hřbety, kupy	5–45+	slunná	(320–)400–540	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–2, LP 1–2, BB, BRK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Achillea millefolium* agg., *Brachypodium pinnatum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Carlina vulgaris*, *Clinopodium vulgare*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria vesca*, *Fragaria viridis*, *Hylotelephium telephium* agg., *Inula conyzae*, *Pimpinella saxifraga*, *Poa nemoralis*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*									
Poznámka											

2C2	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	144,48	BK 16–20; DB 16–20; BO 16–20	KAms‘d‘m‘, KAsd‘m‘, RNkd‘m‘	hp–ph; š–k	droba, slepenec, pískovec, ryolit, andezit	mírné až příkré (srázné) konvexní svahy, hřbety, kupy	5–45+	slunná	(340–)380–560	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–2, LP 1–2, BB, BRK
	Bylinné patro (30–70 %):	*Anthericum ramosum*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Cytisus nigricans*, *Festuca heterophylla*, *Festuca ovina*, *Fragaria vesca*, *Genista tinctoria*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3C

3C1	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	39,01	BO 20–22; DB 20–22; BK 22–24	KAms‘a‘, KAsa‘, RNka‘	hp–ph; š–k	droba, pískovec, jílovitá břidlice, andezitobazalt	mírné až příkré (srázné) konvexní svahy, hřbety, kupy	5–45+	slunná	380–620 (–660)	BK 5–7, DB 2–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Achillea millefolium* agg., *Astragalus glycyphyllos*, *Brachypodium pinnatum*, *Calamagrostis epigejos*, *Campanula persicifolia*, *Carex montana*, *Clinopodium vulgare*, *Epilobium montanum*, *Fragaria vesca*, *Fragaria viridis*, *Galium mollugo* agg., *Hieracium murorum*, *Hypericum perforatum*, *Inula conyzae*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Veronica chamaedrys*, *Viola hirta*, *Viola riviniana*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3C2	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	20,84	BK 20; DB 20; BO 20	KAms‘d‘m‘, KAsd‘m‘, RNkd‘m‘	hp–ph; š–k	ryolit, pískovec, droba, silicit	mírné až příkré (srázné) konvexní svahy, hřbety, kupy	5–45+	slunná	360–560	BK 5–7, DB 2–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Achillea millefolium* agg., *Calamagrostis epigejos*, *Carex pilulifera*, *Clinopodium vulgare*, *Cytisus nigricans*, *Epilobium montanum*, *Fragaria vesca*, *Galium mollugo* agg., *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Hypericum perforatum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Veronica officinalis*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3C3	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	3,42	BK 24–26; DB 20–22; SM 24–26; BO 20–22	KAms‘a‘(e‘), KAsa‘(e‘), RNka‘(e‘)	ph; š–k	droba, prachovec, pískovec, bazalt	mírné až příkré (srázné) konvexní svahy, hřbety, kupy	5–45+	slunná	400–560	BK 5–7, DB 2–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–85 %):	*Achillea millefolium* agg., *Astragalus glycyphyllos*, *Brachypodium pinnatum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Campanula rapunculoides*, *Carex digitata*, *Carex montana*, *Clinopodium vulgare*, *Epilobium montanum*, *Fragaria moschata*, *Fragaria vesca*, *Galium mollugo* agg., *Hepatica nobilis*, *Hieracium murorum*, *Hypericum perforatum*, *Inula conyzae*, *Lathyrus vernus*, *Lilium martagon*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*, *Torilis japonica*, *Trifolium medium*, *Veronica chamaedrys*, *Viola hirta*, *Viola mirabilis*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

4C

4C1	VYSÝCHAVÁ BUČINA **modální**	5,5	SM 18–22; BO 18–22; DB 18–22	KAms‘a‘, KAsa‘, RNka‘	hp–ph; š–k	andezitobazalt, dacit, slepenec, jílovitá břidlice	mírné až příkré (srázné) konvexní svahy, hřbety, kupy	5–45+	slunná	600–680	BK 7–9, DB 1–3, JD, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula persicifolia*, *Campanula rotundifolia*, *Clinopodium vulgare*, *Convallaria majalis*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Fragaria vesca*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

2B

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2B1	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	184,04	BK 22–26; DB 22–26; BO 20–22	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, andezit, bazalt, prachovec, pískovec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(220–)380–480(–520)	DB 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (50–60 %):	*Aegopodium podagraria*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Dactylis glomerata* agg., *Euphorbia cyparissias*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria vesca*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium murorum*, *Hordelymus europaeus*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

2B4	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	55,23	BK 22–26; DB 22–26; BO 20–22	KAma‘	ph–h; (š–k)	droba, andezit, bazalt, prachovec, slepenec	mírné až střední svahy (horní části)	5–22	převážně slunná	360–500 (–540)	DB 5–7, BK 2–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Carex digitata*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Fragaria vesca*, *Fragaria viridis*, *Galium sylvaticum*, *Geum urbanum*, *Hieracium murorum*, *Hypericum perforatum*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*, *Tanacetum corymbosum*									
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

3B

3B1	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	189,44	BK 24–28; DB 22–24; SM 24–26	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	bazalt, droba, prachovec, pískovec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	360–560 (–600)	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium murorum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3B2	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	2,31	BK 24–28; DB 22–24; SM 24–26	KAma‘	ph–h; (š–k)	jílovitá břidlice, droba	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	420–540	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Convallaria majalis*, *Dryopteris filix-mas*, *Galium rotundifolium*, *Geranium robertianum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*, *Stellaria holostea*, *Veronica chamaedrys*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
3B4	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	414,98	BK 24–28; DB 22–24; SM 24–26	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, pískovec, andezit, bazalt	mírné až střední svahy (horní části)	5–22	převážně slunná	(340–)400–500(–560)	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Carex digitata*, *Clinopodium vulgare*, *Festuca heterophylla*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*, *Veronica chamaedrys*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

4B

4B1	BOHATÁ BUČINA **modální**	72,95	SM 28–34; BK 28–34	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	bazalt, droba, prachovec, pískovec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	540–680	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula trachelium*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Galium odoratum*, *Hordelymus europaeus*, *Melica nutans*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiothecium curvifolium*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4B4	BOHATÁ BUČINA **sušší**	18,93	SM 28–34; BK 28–34	KAma‘, KAme‘	ph; (š–k)	droba, prachovec, pískovec, slepenec	mírné až střední svahy (horní části)	5–22	převážně slunná	(440–)500–600(–640)	BK 7–9, JD 1–2, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula persicifolia*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Clinopodium vulgare*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Galium odoratum*, *Hordelymus europaeus*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5B

5B1	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	201,22	SM 28–34; BK 28–34	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	bazalt, droba, prachovec, pískovec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(600–)640–780	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula trachelium*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Galium odoratum*, *Hordelymus europaeus*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiothecium curvifolium*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5B7	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	29,41	SM 28–34; BK 28–34	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	ph–h; (k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy (konvexní), hřbety	5–22	různá	600–720	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula trachelium*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Maianthemum bifolium*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum verticillatum*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3H

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3H1	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	61,23	BK 24–28; DB 22–26; SM 24–28	KAla‘, LUma‘, HNl	h–jh	jílovitá břidlice, droba, bazalt, hlinitý překryv	plošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	(380–)420–560	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–2, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula trachelium*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

4H

4H1	HLINITÁ BUČINA **modální**	47	SM 28–32; BK 26–32	KAla‘, LUma‘	h–jh	jílovitá břidlice, droba, prachovec, hlinitý překryv	plošiny, mírné (až střední) svahy	0–15	různá	440–620	BK 7–9, JD 1–3, DB, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (70–90 %):	*Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula trachelium*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Dentaria bulbifera*, *Fragaria vesca*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

2D

2D1	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	1,94	BK 24–26; DB 24–26	KAme‘, KAne‘	h–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	údolní dna, báze svahů, svahové úžlabiny	0–22	různá	240–420	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (60–70 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula trachelium*, *Carex sylvatica*, *Dactylis glomerata* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum multiflorum*, *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Stellaria holostea*, *Veronica chamaedrys*, *Viola mirabilis*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2D2	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	12,99	DB 20–24; BK 22–24	KAma‘	ph–jh	droba, prachovec, pískovec, deluviální hlína	údolní dna, báze svahů, svahové úžlabiny	0–22	různá	200–480	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Convallaria majalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geum urbanum*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3D

3D1	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	5,2	BK 24–28; DB 24–26; SM 26–28	KAme‘, KAne‘	ph–jh; (š)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	údolní dna, báze svahů, svahové úžlabiny	0–22	různá	280–400	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Maianthemum bifolium*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Ranunculus lanuginosus*, *Rubus idaeus*, *Sanicula europaea*, *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

3D2	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	0,74	BK 26–30; DB 24–28; SM 26–30	KAma‘	ph–jh; (š)	droba, prachovec, pískovec, deluviální hlína	údolní dna, báze svahů, svahové úžlabiny	0–22	různá	280–340	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Stellaria holostea*									
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3D4	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	35,93	BK 24–28; DB 24–26; SM 26–28	KAme‘	ph–jh; (š)	droba, bazalt, prachovec, pískovec, deluviální hlína	údolní dna, báze svahů, svahové úžlabiny	0–22	převážně slunná	(360–)400–520(–560)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Dactylis polygama*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium murorum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

3D5	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	6,65	BK 26–28; DB 24–26; SM 26–28	KAmg‘e‘	h–jh; (š)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	údolní dna, mělké svahové úžlabiny, báze svahů	0–20	různá	360–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (80–90 %):	*Actaea spicata*, *Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Bromus benekenii*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galeopsis speciosa*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Hepatica nobilis*, *Impatiens noli-tangere*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio ovatus*, *Urtica dioica*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

3D9	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	83,89	SM 30–32; JD 30–32; BK 30–32	KAme‘, KAne‘	ph–jh	droba, prachovec, pískovec, bazalt, deluviální hlína	neskeletnaté rokle, strže	22–45	stinná	(200–)280–560(–620)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Actaea spicata*, *Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galium odoratum*, *Geum urbanum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Senecio ovatus*, *Vicia sepium*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4D

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4D9	OBOHACENÁ BUČINA **specifická – roklinová**	0,47	SM 30–34; BK 28–34	KAme‘, KAne‘	ph–jh	smíšený fluviální sediment , deluviální hlína	neskeletnaté rokle, strže	22–45	stinná	500–540	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Glechoma hederacea*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5D

5D3	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	0,67	BK 26–32; JS 26–32; SM 28–34	KAne‘, KAmn‘e‘	ph–h; (š–k)	smíšený fluviální sediment, deluviální hlína	údolní dna, báze svahů, svahové úžlabiny	0–22	různá	640–680	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (40–60 %):	*Aegopodium podagraria*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca gigantea*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Petasites albus*, *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*									
Poznámka											

2A

2A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	53,32	BK 22; DB 18–22; BO 18–22	KAse‘(a‘), RNke‘(a‘), RNme‘(a‘)	ph–h; k–b	droba, pískovec, andezit, bazalt	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy (horní části), hřbety	5–45+	převážně slunná	200–460 (–520)	DB 5–7, HB 1–2, JV 1–2, LP 1–2, BK 1–2, JS, JLM, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Alliaria petiolata*, *Brachypodium pinnatum*, *Campanula persicifolia*, *Campanula rapunculoides*, *Carex muricata* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria moschata*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium murorum*, *Chaerophyllum temulum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Primula veris*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Scrophularia nodosa*, *Stellaria holostea*, *Tanacetum corymbosum*, *Urtica dioica*, *Veronica chamaedrys*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*									
Poznámka											

3A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3A0	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,24	BK; LP 24–28; DB 24–28; SM 24–28	AN(sk), KAasa‘(e‘)	ph; k–b	deluviální sediment, stavební odpad (halda)	kamenité antropogenní tvary	5–45+	různá	480–520	BK 4–6, DB 1–3, JV 1–2, LP 1–2, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (40–60 %):	*Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3A*.									
	Mechové patro:	*Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3A*.									
Poznámka											
3A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **modální**	85,14	SM 24–26; BK 24–26	KAs(n)e‘, RNk(n)e‘, RNme‘	ph–h; k–b	andezit, bazalt, droba, pískovec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy	5–45+	různá	(360–)400–560(–640)	BK 4–6, DB 1–3, JV 1–2, LP 1–2, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (40–60 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium murorum*, *Chelidonium majus*, *Impatiens noli-tangere*, *Lamium maculatum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Scrophularia nodosa*, *Senecio ovatus*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **chudší**	16,16	BK 22–26; DB 22–24; SM 24–26	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp–h; k–b	pískovec, droba, jílovitá břidlice, slepenec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	5–45+	různá	340–520	BK 4–6, DB 1–3, JV 1–2, LP 1–2, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (60–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Digitalis grandiflora*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Geranium robertianum*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Scrophularia nodosa*, *Senecio ovatus*, *Veronica officinalis*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **sušší**	2,76	BK 22–26; DB 22–24	KAse‘(a‘), RNke‘(a‘), RNme‘(a‘)	ph–h; k–b	pískovec, slepenec, jílovitá břidlice	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy (horní části), hřbety	5–45+	převážně slunná	440–500	BK 4–6, DB 1–3, JV 1–2, LP 1–2, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (40–60 %):	*Alliaria petiolata*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium pinnatum*, *Bromus benekenii*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Dryopteris filix-mas*, *Epilobium montanum*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium murorum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum multiflorum*, *Senecio ovatus*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*, *Veronica chamaedrys*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											

4A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
4A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **modální**	115,1	SM 26–28; BK 26–28	KAs(n)e‘, RNk(n)e‘, RNme‘	ph–h; k–b	bazalt, andezit, pískovec, droba	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy	5–45+	různá	(440–)500–680	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–2, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula trachelium*, *Corydalis cava*, *Corydalis intermedia*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Euphorbia dulcis*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum multiflorum*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
4A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **chudší**	0,4	BK, JV, LP 24–28; SM 24–28	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp–ph; k–b	pískovec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	0–45+	různá	500–540	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–2, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

5A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **modální**	55,68	SM 26–30; BK 24–28	KAs(n)e‘, RNk(n)e‘, RNme‘	ph; k–b	droba, andezit, bazalt, slepenec	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy	5–45+	různá	580–760	BK 5–7, JD 1–3, KL 1–3, JLH, LP, JS, JVM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum multiflorum*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
5A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **chudší**	39,15	SM 26–28	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp–ph; k–b	slepenec, pískovec, bazalt	kamenité mírné až příkré (srázné) svahy, hřbety	0–45+	různá	(520–)580–680(–740)	BK 5–7, JD 1–3, KL 1–3, JLH, LP, JS, JVM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

3J

3J0	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **antropogenní**	0,25	BK 22–26; LP, JV 22–26; DB 22–26	ANsk, LIma‘(e‘)	hp–ph; k–kh	pískovec (halda, odval, lom)	skeletnaté hrany lomů, odvaly	5–45+	různá	460–480	JV 3, BK 2–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (50–70 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3J.									
	Mechové patro:	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3J.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **modální**	28,52	BK 24–26; JV 24–26	RNme‘, RNs(n)e‘, RNte‘, (LIme‘)	ph; k–kh	pískovec, slepenec, bazalt, droba	suťové a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	(300–)480–660	JV 3, BK 2–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (50–70 %):	*Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Campanula trachelium*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galeopsis pubescens*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Hepatica nobilis*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											
3J2	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **chudší**	17,08	BK 24–26; DB 20–22; JV 22–24; LP 22–24	RNsa‘, RNta‘, RNma‘, (LIma‘)	ph; k–kh	pískovec, slepenec, andezitobazalt, droba	suťové a skalnaté svahy, vrcholy, hřebeny	5–45+	různá	300–660	JV 3, BK 2–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (60–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris dilatata*, *Dryopteris filix-mas*, *Epilobium angustifolium*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium murorum*, *Lamium maculatum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Polypodium vulgare*, *Rubus idaeus*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											
3J9	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **specifická – roklinová**	5	BK 24–26; DB 20–22; JV 22–24; LP 22–24	RNke‘, RNme‘, RNne‘, KAsne‘	ph–h; k–b	pískovec	skeletnaté rokle, hluboké erozní rýhy	22–45+	stinná	320–520	JV 3, BK 2–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (50–70 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lamium maculatum*, *Lunaria rediviva*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Polypodium vulgare*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

5J

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **modální**	6,06	BK 26–28; KL 24–26	RNme‘, RNs(n)e‘, RNte‘, (LIme‘)	ph; k–kh	andezit, bazalt, droba, pískovec	suťové a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	(600–)660–760	JV 3, BK 2–3, JD 1–3, JL 1, JLH, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Euphorbia dulcis*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Lunaria rediviva*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum multiflorum*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

5J5	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **vlhčí**	38,22	BK 24–30; JV; JS; JL 24–30	RNne‘(g‘), RNme‘(g‘), RNse‘	ph; k–b	droba, slepenec, pískovec, prachovec	suťové a skalnaté konkávní svahy	5–45+	různá	(440–)480–640(–700)	JV 3, BK 2–3, JD 1–3, JL 1, JLH, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

2L

2L1	PAHORKATINNÝ LUH **modální**	4,99	DB 26–30; JS 28–32	FLmg‘e‘, FLkg‘e‘, FLge‘, (FLqe‘)	ph–jh	holocenní fluviální hlína	říční a potoční nivy (aluviální roviny) v údolních dnech	0–5	—	360–420 (–520)	DBL 3–5, JS 2–3, JLM 1, JLV 1, JVM, OLL, LP, HB, BB
	Bylinné patro (90–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Anthriscus sylvestris*, *Athyrium filix-femina*, *Circaea lutetiana*, *Colchicum autumnale*, *Dactylis glomerata* agg., *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galeopsis tetrahit* agg., *Galium aparine*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Heracleum sphondylium*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chaerophyllum temulum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lamium maculatum*, *Myosotis palustris* agg., *Phalaris arundinacea*, *Solanum dulcamara*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2L5	PAHORKATINNÝ LUH **vlhčí**	1,17	DB 28–30; SM 32–34; OL 24–26	FLge‘, FLqe‘, GLfe‘	h–jh	holocenní fluviální hlína	říční a potoční nivy (aluviální roviny) v údolních dnech	0–5	—	200–220	DBL 3–5, JS 2–3, JLM 1, JLV 1, JVM, OLL, LP, HB, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cirsium oleraceum*, *Filipendula ulmaria*, *Gagea lutea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geum rivale*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Petasites hybridus*, *Phalaris arundinacea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3L

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
3L1	JASANOOLŠOVÝ LUH **modální**	318,81	OL 24–26	FLmg‘e‘, FLkg‘e‘, FLge‘, (FLqe‘)	ph–h	holocenní fluviální hlína	potoční nivy (aluviální roviny) v údolních dnech	0–5	—	(260–)380–580(–640)	OLL 5–7, JS 3–4, JV, DBL, JLH, JLV, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Anthriscus sylvestris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Dactylis glomerata* agg., *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Filipendula ulmaria*, *Galium aparine*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Glyceria fluitans* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lamium maculatum*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Ranunculus repens*, *Solanum dulcamara*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
3L5	JASANOOLŠOVÝ LUH **vlhčí**	4,83	OLL 26–28; JS 26–30	FLqe‘, GLfe‘	h–jh	holocenní fluviální hlína	potoční nivy (aluviální roviny) v údolních dnech	0–5	—	460–520	OLL 5–7, JS 3–4, JV, DBL, JLH, JLV, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Carex acuta*, *Carex brizoides*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum arvense*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Primula elatior*, *Ranunculus lanuginosus*, *Scirpus sylvaticus*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3L9	JASANOOLŠOVÝ LUH **specifický – prameništní**	183,89	OL 24–26	GLme‘, GLqe‘, (GLoe‘)	ph–jh	droba, prachovec, pískovec, ryolit, deluviální hlína	prameniště ve sníženinách plošin a mírných až středních svahů	0–22	různá	(380–)420–640(–700)	OLL 7–8, JS 2–3, JV, VR
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Agrostis stolonifera*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex elata*, *Carex remota*, *Circaea lutetiana*, *Dactylis glomerata* agg., *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galeopsis tetrahit* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Myosotis palustris* agg., *Oxalis acetosella*, *Ranunculus repens*, *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum palustre*									
Poznámka											

5L

5L1	MONTÁNNÍ (JASANO) OLŠOVÝ LUH **modální**	0,69	OL 22–24; JS 28	FLmg‘a‘(e‘), FLkg‘a‘(e‘), FLga‘(e‘), (FLqa‘(e‘))	ph–h; (š)	holocenní fluviální hlína	potoční nivy (aluviální roviny) v údolních dnech	0–5	—	600–680	OLL 7–8, JS 1–2, SM 1, KL, JD, JLH, OLS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Ficaria verna*, *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lycopus europaeus*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5L5	MONTÁNNÍ (JASANO) OLŠOVÝ LUH **vlhčí**	18,32	OLL 28–30; JS 26–30; SM 30–32	FLqe‘a‘(e‘), GLfa‘(e‘)	h–jh	holocenní fluviální hlína	potoční nivy (aluviální roviny) v údolních dnech	0–5	—	620–700	OLL 7–8, JS 1–2, SM 1, KL, JD, JLH, OLS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Ajuga reptans*, *Caltha palustris*, *Cardamine impatiens*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Circaea lutetiana*, *Cirsium oleraceum*, *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Geranium phaeum*, *Geum rivale*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nemorum*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha longifolia*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Ranunculus flammula*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*									
	Mechové patro:	*Campylium stellatum*, *Climacium dendroides*, *Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5L9	MONTÁNNÍ (JASANO) OLŠOVÝ LUH **specifický – prameništní**	89,31	OL 22–24; JS 28	GLma‘(e‘), GLqa‘(e‘), (GLoa‘(e‘))	ph–jh	droba, prachovec, pískovec, bazalt, deluviální hlína	prameniště ve sníženinách plošin a mírných až středních svahů	0–22	různá	460–700 (–780)	OLL 8–9, SM 1, JS, KL, JD, OLS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Anemone nemorosa*, *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex canescens*, *Carex remota*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Phalaris arundinacea*, *Scirpus sylvaticus*, *Stachys sylvatica*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum palustre*									
Poznámka											

3U

3U1	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **modální**	91,65	BK 24–28; DB 24–26; SM 26–30; JS 28–30	KAmg‘e‘, KAge‘, FLkg‘e‘, (GLfke‘)	ph–h, (š–k)	droba, prachovec, pískovec, ryolit, fluviálně-deluviální hlína	úžlabiny vodotečí v údolních dnech	0–22	převážně stinná	(200–)300–560	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JD, OLL, JLM, JLH, JLV, LP, HB, BB
	Bylinné patro (65–75 %):	*Actaea spicata*, *Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis intermedia*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Polygonatum multiflorum*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3U5	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **vlhčí**	12,36	SM 28–32; JS 28–30; JV 26–30	FLke‘, FLge‘, GLfke‘, KAfge‘	ph–h	deluviálně-fluviální hlína, (droba, prachovec)	širší úžlabiny s aluvii v údolních dnech	0–15	různá	280–540	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JD, OLL, JLM, JLH, JLV, LP, HB, BB
	Bylinné patro (±95 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis intermedia*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3U7	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **skeletnatější**	7,07	JS 26–28; SM 28–32; BK 28	KAgs‘e‘, KAsg‘e‘, (FLye‘)	ph–h; š–k	pískovec, (fluviálně-deluviální hlína)	kamenité úžlabiny vodotečí	15–45	převážně stinná	300–480	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JLH, JLM, JLV, JD, LP, HB, BB, OLL
	Bylinné patro (±95 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Athyrium filix-femina*, *Corydalis cava*, *Corydalis intermedia*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Polygonatum multiflorum*, *Senecio ovatus*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div., *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

5U

5U1	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **modální**	49,32	JS; JV 28–32; BK 26–30	KAmg‘e‘(a‘), KAge‘(a‘), FLke‘(a‘), (GLfke‘(a‘))	ph–h; (š–k)	pískovec, slepenec, fluviálně-deluviální hlína	úžlabiny vodotečí v údolních dnech	0–22	převážně stinná	460–640	JV 3, JS 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH, SM, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Mnium* sp. div., *Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5U5	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **vlhčí**	10,39	SM 28–32; BK 26–30	FLke‘(a‘), FLge‘(a‘), GLfe‘(a‘), KAfkge‘(a‘)	ph–h; (š)	deluviálně-fluviální hlína, (pískovec, prachovec)	širší úžlabiny s aluvii v údolních dnech	0–15	různá	480–620	JV 3, JS 1–3, OLL 1–3, BK, JLH, LP, JD, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

2V

2V1	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	0,43	DB 26–28; OL 24–28	KAga‘, KAqa‘, HNg, (GLka‘)	ph–jh; (š–k)	polygenetická hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	220–260	DB 4–5, BK 1–3, JV 1, JS 1, JD 1, HB, LP, JLM, JLV, OLL, BB, TR
	Bylinné patro (>80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Campanula trachelium*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Oxalis acetosella*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3V

3V1	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	162,26	SM 26–28; BK 24–26	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph–h; (š–k)	slepenec, pískovec, droba, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	(320–)380–520(–600)	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula trachelium*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Plagiochila asplenioides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3V2	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	2,21	BK 26; SM 26–28	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	slepenec, pískovec, prachovec, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	400–500	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex leporina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3V3	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	1,69	BK 26; SM 26–28	KAge‘, KAqe‘, (GLke‘)	ph–h; (š–k)	bazalt, bazaltový tuf, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	420–520	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Allium ursinum*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula trachelium*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Convallaria majalis*, *Corydalis cava*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Glechoma hederacea*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3V9	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	2,4	BK 26; DB 24; SM 26	GLka‘(e‘), GLma‘(e‘), GLwa‘(e‘), KAqa‘(e‘)	ph–h; (š)	pískovec, deluviální hlína	ploché úžlabiny, terenní poklesliny s prameništi	0–22	různá	420–520	BK 3–5, DBL 1–3, JD 1–3, OLL, JS, JV, LP, JLH, JLM, JLV, BB
	Bylinné patro (80–90 %):	*Ajuga reptans*, *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Scirpus sylvaticus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

4V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4V1	VLHKÁ BUČINA **modální**	134,87	SM 32–34; BK 28–30	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph–h; (š–k)	droba, pískovec, andezitobazalt, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	(340–)420–620	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula trachelium*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Plagiochila asplenioides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

4V2	VLHKÁ BUČINA **chudší**	0,5	SM 30–32; JD 28–32	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	andezitobazalt, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	480–520	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex leporina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

4V9	VLHKÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	18,49	SM 32–34; JD 30–32	GLka‘(e‘), GLma‘(e‘), GLwa‘(e‘), KAqa‘(e‘)	ph–h; (š)	droba, pískovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	ploché úžlabiny, terenní poklesliny s prameništi	0–22	různá	460–600	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1–2, OLL, JS, JV, JLH, LP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Scirpus sylvaticus*, *Stachys sylvatica*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiochila asplenioides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5V1	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	72,37	SM 32–34; BK 28–30	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph–h; (š–k)	droba, pískovec, prachovec, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	(440–)480–700	BK 4–6, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OLL, OLS, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Climacium dendroides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											
5V2	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	1,12	SM 30–32; BK 28–30	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	660–720	BK 4–6, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OLL, OLS, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
5V3	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	0,55	SM 30–32; JV, BK 26–30; JD 26–32	KAge‘(a‘), KAqe‘(a‘), (GLke‘(a‘))	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, bazalt, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	640–680	BK 4–6, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OLL, OLS, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia vulgaris*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5V9	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	18,53	SM 30–32; BK 28–30	GLka‘(e‘), GLma‘(e‘), GLwa‘(e‘), KAqa‘(e‘)	ph–h; (š)	droba, pískovec, bazalt, deluviální hlína	ploché úžlabiny, terenní poklesliny s prameništi	0–22	různá	(520–)580–700	BK 4–5, JD 3–5, KL 1, OLL 1, SM, JS, OLS, JLH, LP, JVM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Scirpus sylvaticus*, *Stachys sylvatica*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiochila asplenioides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6V

6V1	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	35,66	SM 28–32; JD 30–32	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–ph; (š–k)	droba, pískovec, prachovec, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	580–740	BK 3–5, JD 2–4, SM 2–3, KL 1, JS, JLH, OLL, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cicerbita alpina*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

6V2	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	0,77	BK, KL 26–30; SM 28–32; JD 26–32	KAgd‘m‘, KAqd‘m‘, KPg, (GLkd‘m‘)	hp–ph; (š–k)	smíšený fluviální sediment, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	640–700	BK 3–5, JD 2–4, SM 2–3, KL 1, JS, JLH, OLL, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis villosa*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cicerbita alpina*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6V3	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **bohatší**	0,35	SM 28–32; JD 30–32	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph; (š–k)	smíšený fluviální sediment, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	660–680	BK 3–5, JD 2–4, SM 2–3, KL 1, JS, JLH, OLL, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cicerbita alpina*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galium odoratum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

6V9	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	70,2	SM 28–30; JD 28–30	GLma‘, GLka‘, GLwa‘, (KAqa‘)	ph; (š)	droba, pískovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	ploché úžlabiny, terenní poklesliny s prameništi	0–22	různá	620–760	BK 3–5, SM 2–4, JD 2–4, KL, OLL, OLS, JS, JLH
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Cicerbita alpina*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Scirpus sylvaticus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiochila asplenioides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

7V

7V2	VLHKÁ BUKOVÁ SMRČINA **chudší**	2,55	SM 24–26	KPg, KPq, (GLkd‘m‘)	hp–ph; (š–k)	smíšený fluviální sediment, deluviální hlína	svahové úžlabiny, báze svahů, mírné až střední svahy	0–22	různá	680–780	SM 5–7, JD 1–3, BK 1–2, KL 1, JR, OLL, OLS
	Bylinné patro (50–80 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis villosa*, *Cicerbita alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula pilosa*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

3O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3O0	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,21	BK 24–28; DB 22–26; SM 24–28	ANg, KAaga‘, (PGaa‘)	ph–jh	deluviální hlína (navážka)	navážky na plošinách	0–5	—	440–460	BK 3–5, DB 2–4, JD 2–4, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (20–40 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3O.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typů 3O.									
Poznámka											
3O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **modální**	676,15	BK 24–28; DB 22–26; SM 24–28	PGka‘, PGma‘, PGla‘, KA(l)ga‘	h–jh	droba, jílovitá břidlice, ryolit, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(360–)400–520(–580)	BK 3–5, DB 2–4, JD 2–4, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (40–70 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Fragaria vesca*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											
3O2	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **chudší**	113,91	DB 22–24; SM 24–26	PGkd‘m‘, PGka‘, KAgd‘m‘, KAga‘	ph–h	droba, pískovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(260–)400–520	BK 3–5, DB 2–4, JD 2–4, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (40–70 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex leporina*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Fragaria vesca*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3O3	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **bohatší**	204,06	BK 26–28; DB 24–26; SM 26–28	PGka‘(e‘), PGma‘(e‘), PGla‘(e‘), KA(l)ga‘(e‘)	h–jh	droba, pískovec, andezit, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	340–480 (–540)	BK 3–5, DB 2–4, JD 2–4, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (75–100 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Fragaria vesca*, *Galium odoratum*, *Juncus effusus*, *Lysimachia vulgaris*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3O7	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **skeletnatější**	14,48	BK 24–28; DB 22–26; SM 24–28	PGka‘(s‘), PGma‘(s‘), KAga‘(s‘)	ph–h; (š–k)	pískovec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	440–520	BK 3–5, DB 2–4, JD 2–4, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (40–70 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex leporina*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Fragaria vesca*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4O

4O0	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **antropogenní**	61,13	DB 22–24; JD 24–26	ANg, KAaga‘, (PGaa‘)	ph–jh	pískovec, slepenec, deluviální hlína (navážka)	navážky na plošinách	0–5	—	560–620	JD 3–5, DBL 2–4, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (40–70 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesních typů 4O.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesních typů 4O.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	4500,82	DB 22–24; JD 24–26	PGka‘, PGma‘, PGla‘, KAga‘	ph–jh	droba, jílovitá břidlice, andezitobazalt, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(320–)440–640(–680)	JD 3–5, DBL 2–4, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg., *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											
4O3	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **bohatší**	26,79	JD 26–30; DBL 26–28; SM 30	PGka‘(e‘), PGma‘(e‘), PGla‘(e‘), KA(l)ga‘(e‘)	h–jh	droba, jílovitá břidlice, pískovec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	400–580	JD 3–5, DBL 2–4, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Juncus effusus*, *Lysimachia vulgaris*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											
4O7	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **skeletnatější**	57,52	SM 26–34; JD 26–32; BO 30–32	PGka‘(s‘), PGma‘(s‘), KAga‘(s‘)	ph–h; (š–k)	pískovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	460–640	JD 3–5, DBL 2–4, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris dilatata*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg., *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ (BUKOVÁ) JEDLINA **modální**	2 800,89	SM 28–32; JD 28–32	PGka‘, PGma‘, KAga‘	ph–h	droba, jílovitá břidlice, andezitobazalt, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(500–)580–720(–780)	JD 5–7, BK 1–3, SM, OS, LP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg., *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5O7	OGLEJENÁ SVĚŽÍ (BUKOVÁ) JEDLINA **skeletnatější**	8,51	SM 28–32; JD 28–32	PGka‘(s‘), PGma‘(s‘), KAga‘(s‘)	ph–h; (š–k)	pískovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	540–660	JD 5–7, BK 1–3, SM, OS, LP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex brizoides*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg., *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6O

6O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	367,89	SM 28–32; JD 28–32	PGmd‘m‘, PGkd‘m‘, KAgd‘m‘, KPg	ph–h; (š)	droba, pískovec, andezitobazalt, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	600–720 (–760)	JD 4–6, SM 2–3, BK 1–3, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Cicerbita alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg., *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiochila asplenioides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2P

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2P1	OGLEJENÁ KYSELÁ DOUBRAVA S JEDLÍ **modální**	9,96	DB 20–24; SM 24–28; BO 22–26	PGd, PGkd‘, KAgd, KAgd‘	hp–h; (š)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	360–440	DB 5–7, JD 1–3, BK, BO, BR, OS, SM
	Bylinné patro (40–80 %):	*Calamagrostis villosa*, *Carex leporina*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

3P

3P0	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,38	DB 24–28; BO 24–28; SM 26–32	ANg, PGad, KAagd	hp–h; (š)	pískovec, prachovec, jílovec (navážka)	navážky na plošinách	0–5	—	460–500	DB 3–5, JD 2–3, BK 1–3, SM, BR, OS, BO
	Bylinné patro (20–40 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro soubor lesních typůl 3P.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy 3P1 a 3P2.									
Poznámka											

3P1	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **modální**	3 438,66	DB 24–28; BO 24–28; SM 26–32	PGd, PGkd‘, KAgd, KAgd‘	hp–h; (š)	droba, jílovitá břidlice, pískovec, ryolit, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(300–)400–540(–580)	DB 3–5, JD 2–3, BK 1–3, SM, BR, OS, BO
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex leporina*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3P2	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **chudší**	138,58	SM 28–32; BO 24–28	PGd(z'), PGkd(z'), KAgd(z')	hp–ph; (š)	pískovec, prachovec, ryolit, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(420–)480–580	DB 3–5, JD 2–3, BK 1–3, SM, BR, OS, BO
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

4P

4P0	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA **antropogenní**	11,21	SM 24–28 DB 20–24 BŘ 18–22	AN(r)g, PGad, KAa(r)gd	hp–ph; (š)	pískovec (navážka)	navážky na plošinách	0–5	—	480–600	JD 4–5, DBL 2–4, BK 1, BO, SM, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	Kombinace druhů charakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesních typů 4P.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů charakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesních typů 4P.									
Poznámka											

4P1	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	8 653,48	SM 24–26; JD 24–26	PGd, PGkd', KAgd, KAgd'	hp–h; (š)	droba, jílovitá břidlice, pískovec, ryolit, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(360–)440–620(–720)	JD 4–5, DBL 2–4, BK 1, BO, SM, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4P2	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA **chudší**	42,33	JD 22–24; DB 22; SM 24	PGd(z'), PGkd(z'), KAgd(z')	hp–ph; (š)	pískovec, slepenec, droba, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	480–680	JD 4–5, DBL 2–4, BK 1, BO, SM, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4P5	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA **vlhčí**	14,54	DB 26–28; SM 26–30; BO 26–30	PGd, PGdq, SGmd'	ph–h	smíšený fluviální sediment, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–5	—	(500–)540–660	JD 4–5, DBL 2–4, BK 1, BO, SM, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex brizoides*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*									
Poznámka											

5P

5P1	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **modální**	3 795,65	SM 24–28; JD 26–28	PGd, PGkd, KAgd	hp–h; (š)	droba, prachovec, pískovec, ryolit, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(460–)560–720(–820)	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Plagiochila asplenioides*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5P2	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **chudší**	579,2	SM 24–26; JD 24–26	PGd(z‘), PGkd(z‘), KAgd(z‘)	hp–ph; (š)	pískovec, slepenec, droba, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	560–720 (–760)	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pallescens*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5P5	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **vlhčí**	44,78	DB 24–26; SM 30–32; BO 28–30	PGd, PGdq, SGmd‘	ph–h	pískovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny	0–5	—	560–700	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO, BR, OS
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											
5P7	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **skeletnatější**	18,91	SM 24–28; JD 26–28	PGd(s‘), PGkd(s‘), KAgd(s‘)	hp–ph; (š–k)	pískovec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	580–660	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO, BR, OS
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula pilosa*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6P

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6P1	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	1 751,72	SM 26–28; JD 26–28	PGd, PGkd, KPg	hp–ph; (š)	pískovec, slepenec, droba, ryolit, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(560–)620–800(–840)	JD 5–7, SM 3–5, BK 1, BO, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											
6P2	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA **chudší**	410,92	SM 24–26; JD 24–26	PGdz', PGkdz', KPg, PZg	hp–ph; (š)	pískovec, slepenec, droba, ryolit, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(580–)640–860	JD 5–7, SM 3–5, BK 1, BO, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											
6P5	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA **vlhčí**	16,39	SM 28–30; JD 28–30	PGd, PGdq, SGmd', KPq	ph–h	pískovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny	0–5	—	600–860	JD 5–7, SM 3–5, BK 1, BO, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6P7	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA **skeletnatější**	1,23	SM 26–28; JD 26–28	PGd(s'), PGkd(s'), KPg(s')	hp–ph; (š–k)	smíšený fluviální sediment, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	720–740	JD 5–7, SM 3–5, BK 1, BO, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium saxatile*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

7P

7P1	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ SMRČINA **modální**	1,36	SM 20–26	PGdz', KPg, PZg	hp–ph; (š)	slepenec, pískovec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	620–860	SM 7–9, JD 1–3, BR, BRP, BK, JR
	Bylinné patro (± 80 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris dilatata*, *Galium saxatile*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Senecio ovatus*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

7P5	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ SMRČINA **vlhčí**	2,03	SM 28–30, JD 28–30	PGd, PGdq, SGmd', PZq	ph–h	droba, pískovec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny	0–5	—	840–880	SM 7–9, JD 1–3, BR, BRP, BK, JR
	Bylinné patro (± 80 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris dilatata*, *Equisetum sylvaticum*, *Galium saxatile*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

3Q

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **modální**	5,14	BO 18–22; SM 22	PGdz‘, KAgdz‘, KArgdz‘, PZg, PZrg	p–ph; (š)	křemenný pískovec, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	460–500	DB 5–7, JD 2–3, BO 1, BR, OS, BK, SM
	Bylinné patro (40–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Danthonia decumbens*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

4Q

4Q0	OGLEJENÁ CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA **antropogenní**	1,35	DB 18–22; SM 18–22; BO 18–22	ANg, PGadz‘, KAagdz‘	hp–ph; (š)	deluviální hlína (navážka)	navážky na plošinách	0–5	—	540–560	JD 5–7, DB 3–5, BO 1, BR 1, SM, BK, OS
	Bylinné patro (50–60 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesních typů 4Q.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesních typů 4Q.									
Poznámka											

4Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	274,77	DB 18–22; SM 18–22; BO 18–22	PGdz‘, KAgdz‘, KArgdz‘, PZg, PZrg	p–ph; (š)	křemenný pískovec, křemenný slepenec, droba, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	400–660	JD 5–7, DB 3–5, BO 1, BR 1, SM, BK, OS
	Bylinné patro (50–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Danthonia decumbens*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5Q

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ JEDLINA **modální**	432,77	BO 20–24; SM 22–24	PGdz‘, KAgdz‘, KArgdz‘, PZg, PZrg	p–ph; (š)	křemenný pískovec, křemenný slepenec, droba, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	540–720 (–780)	JD 5–7, SM 1–2, BO 1, BK 1, BR, OS
	Bylinné patro (50–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Nardus stricta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
5Q5	OGLEJENÁ CHUDÁ JEDLINA **vlhčí**	23,5	BO 22–24; SM 22–24	PGdz‘, PGdqz‘, PZq	hp–ph; (š)	křemenný pískovec, křemenný slepenec, droba, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny	0–5	—	(620–)660–780	JD 5–7, SM 1–2, BO 1, BK 1, BR, OS
	Bylinné patro (50–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

6Q

6Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	56,22	SM 22–24; JD 22–24	PGdz‘, PZ(r)g, KP(r)g	p–ph; (š)	křemenný pískovec, křemenný slepenec, droba, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	(660–)760–860	JD 5–7,SM 3–5, BO 1, BK, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* s. str., *Nardus stricta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6Q5	OGLEJENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA **vlhčí**	201,43	SM 22–24; JD 22–24	PGqdz‘, PZq, KPq	hp–ph; (š)	křemenný pískovec, křemenný slepenec, droba, hlinitý překryv	plošiny, terénní poklesliny	0–5	—	(620–)680–860	JD 5–7,SM 3–5, BO 1, BK, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* s. str., *Nardus stricta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum capillifolium* s. l.									
Poznámka											

1G

1G0	MOKŘADNÍ OLŠINA **antropogenní**	0,17	OL 22–24	GLaqa‘(e‘), ANq	ph–jh	deluviální hlína (navážka)	antropogenní poklesliny na plošinách se zhoršeným odtokem (v okolí rybníků)	0–5	—	560–580	OLL 7–9, VR 1–2, JS, TPC, TPB, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (±90 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesního typu 1G.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesního typu 1G.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1G1	MOKŘADNÍ OLŠINA **modální**	7,14	OL 22–24	GLq'e'(a'), GLme'(a')	h–jh	jílovitá břidlice, pískovec, deluviální hlína	poklesliny na plošinách se zhoršeným odtokem (v okolí rybníků)	0–5	—	320–620	OLL 7–9, VR 1–2, JS, TPC, TPB, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (±90 %):	*Butomus umbellatus*, *Caltha palustris*, *Carex acutiformis*, *Carex elongata*, *Carex riparia*, *Carex vesicaria*, *Cirsium oleraceum*, *Galium palustre* agg. (převážně *G. palustre*), *Hottonia palustris*, *Humulus lupulus*, *Iris pseudacorus*, *Lemna minor*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Lythrum salicaria*, *Myosotis palustris* agg., *Phalaris arundinacea*, *Phragmites australis*, *Solanum dulcamara*, *Typha latifolia*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Rhizomnium punctatum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

3G

3G1	GLEJOVÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **modální**	2,68	DBL 24–30; JD 26–30; OL 22–26	GLma', SGma'	ph–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	420–480	DBL 4–5, JD 3–4, OLL 1, SM, OS, BR, LPM, OLS
	Bylinné patro (±90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Galeopsis pubescens*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Scrophularia nodosa*, *Stellaria media*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

3G2	GLEJOVÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **chudší**	7,09	DB 20–24; SM 22–26; OL 20–24	GLmm'd'(o'), SGmm'd'(o')	ph–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	360–460	DBL 4–5, JD 3–4, OLL 1, SM, OS, BR, LPM, OLS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Calamagrostis canescens*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex canescens*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Equisetum sylvaticum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis palustris* agg., *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Campylium stellatum*, *Climacium dendroides*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3G3	GLEJOVÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	1,31	SM 26–32 OL 26–30	GLma‘, SGma‘	ph–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	440–460	DBL 4–5, JD 3–4, OLL 1, SM, OS, BR, LPM, OLS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Myosotis palustris* agg., *Scirpus sylvaticus*, *Solanum dulcamara*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

4G

4G0	GLEJOVÁ DUBOVÁ JEDLINA **antropogenní**	0,03	SM 28–30; JD 28–30	GLaa‘, SGaa‘, ANq	ph–jh	pískovec, hlinitý sediment (navážka)	antropogenní terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	580–600	JD 4–6, DBL 3–4, OLL 1, SM, OS, BR, OLS, BK
	Bylinné patro (50–70 %):	Kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesního typu 4G.									
	Mechové patro:	Různá kombinace druhů chrakteristických pro lesní typy náležející do souboru lesního typu 4G.									
Poznámka											

4G1	GLEJOVÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	94,64	SM 28–30; JD 28–30	GLma‘(o‘), SGma‘(o‘)	ph–jh	droba, pískovec, slepenec, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	(400–)440–620(–660)	JD 4–6, DBL 3–4, OLL 1, SM, OS, BR, OLS, BK
	Bylinné patro (70–90 %):	*Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Galium palustre* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg., *Myosotis palustris* agg., *Oxalis acetosella*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Sphagnum girgensohnii*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4G2	GLEJOVÁ DUBOVÁ JEDLINA **chudší**	83,31	DBL 22–26; OL 18–22; SM 24–28	GLmd'm'(o'), SGmd'm'(o')	ph–jh	droba, pískovec, slepenec, ryolit, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	(360–)400–620	JD 4–6, DBL 3–4, OLL 1, SM, OS, BR, OLS, BK
	Bylinné patro (±90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis canescens*, *Carex canescens*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Galium palustre* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Juncus effusus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg., *Myosotis palustris* agg., *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

5G

5G1	GLEJOVÁ JEDLINA **modální**	548,05	SM 26–30; JD 28–30	GLma'(o'), SGma'(o')	ph–jh	droba, pískovec, slepenec, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	(440–)480–660(–740)	JD 6–7, SM 1–2, OLL 1, BK, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Galium palustre* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg., *Myosotis palustris* agg., *Oxalis acetosella*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5G2	GLEJOVÁ JEDLINA **chudší**	14,34	OL 24–26; JD 26–28; SM 26–30	GLmd'm'(o'), SGmd'm'(o')	ph–jh	droba, pískovec, ryolit, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	540–740	JD 6–7, SM 1–2, OLL 1, BK, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex canescens*, *Carex elongata*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Juncus effusus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg., *Valeriana dioica*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Lepidozia reptans*, *Mnium hornum*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Tetraphis pellucida*									
Poznámka											

6G

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6G1	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	429,65	SM 28–30; JD 28–30	GLma‘(o‘), GLoa‘, SGma‘(o‘), SGoa‘	ph–h; (š)	slepenec, pískovec, droba, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	(540–)580–700(–800)	JD 4–5, SM 3–5, OLS 1, OLL, OS, BK, BR, BRP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cicerbita alpina*, *Circaea alpina*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Galium palustre* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Molinia caerulea* agg., *Myosotis palustris* agg., *Oxalis acetosella*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*									
Poznámka											

6G2	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA **chudší**	130,14	SM 28–30; JD 28–30	GLmm‘d‘(o‘), GLom‘d‘, SGmm‘d‘(o‘), SGom‘d‘	ph–h; (š)	pískovec, slepenec, droba, ryolit, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	600–760 (–800)	JD 4–5, SM 3–5, OLS 1, OLL, OS, BK, BR, BRP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Caltha palustris*, *Carex canescens*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris dilatata*, *Equisetum sylvaticum*, *Galium palustre* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Molinia caerulea* agg., *Myosotis palustris* agg., *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*									
Poznámka											

7G

7G1	GLEJOVÁ JEDLOVÁ SMRČINA **modální**	8,46	SM 26–30; JD 28–30	GLod‘m‘, GLmd‘m‘o‘, SGod‘m‘	ph–h; (š)	smíšený fluviální sediment, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	660–680	SM 7–9, JD 1–3, OLS 1, BRP, JR, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Carex brizoides*, *Carex echinata*, *Carex remota*, *Cicerbita alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Lycopodium annotinum*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* s. str., *Oxalis acetosella*, *Trientalis europaea*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum palustre*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
7G2	GLEJOVÁ JEDLOVÁ SMRČINA **chudší**	65,52	SM 26–28; JD 26–28	GLod‘, GLmd‘o‘, SGod‘	ph–h; (š)	slepenec, pískovec, droba, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách, lemy rašelinišť	0–5	—	(600–)640–840	SM 7–9, JD 1–3, OLS 1, BRP, JR, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Carex canescens*, *Carex echinata*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus*, *Lycopodium annotinum*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* s. str., *Oxalis acetosella*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

4T

4T1	GLEJOVÁ CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	1,73	SM 20–24; BO 20–24	GLmz‘(o‘), SGmd‘(o‘)	hp–jh	křemenný slepenec, droba, prachovec, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	500–580	JD 4–6, DBL 3–4, SM 1, BR 1, BRP 1, BO, OLL, OLS, OS
	Bylinné patro (±80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum capillifolium* s. l., *Sphagnum girgensohnii*									
Poznámka											

5T

5T1	GLEJOVÁ CHUDÁ JEDLINA **modální**	3,5	SM 22–24; BO 18–22	GLmz‘(o‘), SGmd‘(o‘)	hp–h	pískovec, arkóza, slepenec, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	(420–)540–760	JD 5–7, SM 1–2, BR 1, BRP 1, BO, OLL, OLS, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Molinia caerulea* agg., *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

6T

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6T1	GLEJOVÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	43,75	SM 18–20	GLoz‘, GLmo‘z‘, SGod‘	hp–h; (š)	slepenec, pískovec, arkóza, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	(540–)600–780(–820)	JD 4–5, SM 3–5, BRP 1, BR 1, BO, OLS, OLL, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Equisetum sylvaticum*, *Phegopteris connectilis*, *Soldanella montana*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

7T

7T1	GLEJOVÁ CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA **modální**	83,78	SM 18–20	GLoz‘, SGod‘	hp–h; (š)	pískovec, slepenec, arkóza, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	(540–)640–840(–880)	SM 7–9, JD 1–2, BRP 1, OLS, JR
	Bylinné patro (± 80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex canescens*, *Carex echinata*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus conglomeratus*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Phegopteris connectilis*, *Soldanella montana*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium uliginosum*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Polytrichum strictum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum palustre*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

0R

0R9	RAŠELINNÝ BOR **Rašelinná borová březina iniciální přírodní – extrémní**	0,2	BO 12–14; BR 12–14	ORmed‘, ORfid‘	org	organický sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	500–520	BRP 5–7, BO 1–3, BL 1–3
	Bylinné patro (±70 %):	*Calamagrostis villosa*, *Carex nigra*, *Carex rostrata*, *Eriophorum vaginatum*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium oxycoccos* s. str., *Vaccinium uliginosum*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Polytrichum strictum*, *Sphagnum magellanicum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

1R

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
1R1	RAŠELINNÁ OLŠINA **modální**	2,32	OL 20–22	ORmed‘, ORqd‘	org, (ph)	organický sediment	terénní poklesliny na plošinách, ploché úžlabiny	0–5	—	500–580	OLL 7–9, BRP 1–2, SM 1, BR, OS, OLS, VR
	Bylinné patro (75–90 %):	*Ajuga reptans*, *Angelica sylvestris*, *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex acutiformis*, *Carex brizoides*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Galium palustre* agg., *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Phalaris arundinacea*, *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria galericulata*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Campylium stellatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Rhizomnium punctatum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum palustre*									
Poznámka											
1R3	RAŠELINNÁ OLŠINA **bohatší**	0,1	SM 22–26; OL 20–22; BŘ 16–20	ORsam‘, ORmem‘, ORqm‘	org, (h)	organický sediment	terénní poklesliny na plošinách, ploché úžlabiny	0–5	—	640–660	OLL 7–9, BRP 1–2, SM 1, BR, OS, OLS, VR
	Bylinné patro (75–90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex acutiformis*, *Carex brizoides*, *Carex paniculata*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Filipendula ulmaria*, *Galium aparine*, *Galium palustre* agg., *Lysimachia vulgaris*, *Phalaris arundinacea*, *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Campylium stellatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Rhizomnium punctatum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum palustre*									
Poznámka											
1R9	RAŠELINNÁ OLŠINA **specifická – se smrkem**	0,62	OL 20–22	ORmed‘, ORqd‘	org, (ph)	organický sediment	terénní poklesliny na plošinách, ploché úžlabiny	0–5	—	640–680	OLL 7–8, BRP 1–2, SM 1–2, BR, OS, OLS, VR
	Bylinné patro (75–90 %):	*Calamagrostis canescens*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex canescens*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg., *Scutellaria galericulata*										
	Mechové patro:	*Campylium stellatum*, *Plagiothecium denticulatum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum palustre*									
Poznámka											

4R

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4R1	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ RELIKTNÍ SMRČINA **modální**	14,14	SM 28–30	ORmem‘, ORqm‘	org, (h)	organický sediment	terénní poklesliny na plošinách, ploché úžlabiny	0–5	—	500–560	SM 8–9, OLL 1, OLS 1, BRP, OS, JD
	Bylinné patro (±75 %):	*Carex canescens*, *Carex nigra*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Oxalis acetosella*, *Trientalis europaea*										
	Mechové patro:	*Campylium stellatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Sphagnum palustre*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											
4R9	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ RELIKTNÍ SMRČINA **specifická – zbahnělá**	0,09	SM 28–30	ORqm‘, ORmem‘, ORsam‘	org, (h)	organický sediment	terénní poklesliny na plošinách, ploché úžlabiny	0–5	—	560–580	SM 7–8, OLL 1–3, OLS 1–3, BRP, OS, JD
	Bylinné patro (±75 %):	*Athyrium filix-femina*, *Carex canescens*, *Carex elongata*, *Carex nigra*, *Carex rostrata*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.)										
	Mechové patro:	*Campylium stellatum*, *Polytrichum commune*, *Rhizomnium punctatum*, *Sphagnum palustre*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

5R

5R1	KYSELÁ RAŠELINNÁ BOROVÁ SMRČINA **modální**	0,29	SM 20–24; BO 18–20	ORfid‘, ORmed‘, ORqd‘	org, (hp)	organický sediment	terénní poklesliny na plošinách	0–5	—	660–700	SM 6–7, BO 2–3, BRP 1, OLS, OLL, OS
	Bylinné patro (60–80 %):	*Calamagrostis villosa*, *Carex canescens*, *Carex nigra*, *Equisetum sylvaticum*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *M. caerulea* s. str.), *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium uliginosum*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

6R

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6R1	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ SMRČINA **modální**	48,12	SM 26–30	ORmem‘, ORqm‘	org, (ph)	organický sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích), ploché úžlabiny	0–10	různá	(420–)500–700(–840)	SM 8–9, OLS 1, OLL, BRP, OS, JD
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopodium annotinum*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium uliginosum*										
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum girgensohnii*, *Sphagnum palustre*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

6R9	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ SMRČINA **specifická – zbahnělá**	18,93	SM 28–32; OLL/OLS 24–26	ORmem‘, ORqm‘	org, (ph)	organický sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích) a rovinách s prameništi	0–10	různá	560–760	SM 7–9, OLS 1–2, OLL 1, BRP, OS, JD
	Bylinné patro (60–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Cirsium palustre*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus conglomeratus*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

7R

7R1	KYSELÁ RAŠELINNÁ SMRČINA **modální**	20,06	SM 22–26	ORfid‘, ORqd‘	org, (hp)	organický sediment na pískovci a slepenci	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	(500–)620–820(–860)	SM 9–10, BRP 1, JR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex canescens*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Eriophorum vaginatum*, *Melampyrum pratense*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium uliginosum*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

POUŽITÉ ZKRATKY A JMÉNA DŘEVIN:

ZKRATKA	ČESKÉ JMÉNO	VĚDECKÉ JMÉNO
SM	smrk ztepilý	***Picea abies*** (L.) H. Karst.
JD	jedle bělokorá	***Abies alba*** Mill.
BO	borovice lesní	***Pinus sylvestris*** L.
BOR	borovice vystoupavá rašelinná	***Pinus*** ×***ascendens*** Businský **nothosubsp.** ***skalickyi*** Businský
KOS	borovice kleč	***Pinus mugo*** Turra
BL	borovice pyrenejská blatka	***Pinus uncinata*** Ramond ex DC. **subsp.** ***uliginosa*** (G. E. Neumann) Businský
MD	modřín opadavý	***Larix decidua*** Mill**.**
TS	tis červený	***Taxus baccata*** L.
DB	dub letní a okruh dubu zimního	***Quercus robur*** L. + ***Q***. ***petraea*** **agg.**
DBL	dub letní	***Quercus robur*** L.
DBZ	dub zimní, okruh blízce příbuzných druhů	***Quercus petraea*** **agg.**
DBP	dub pýřitý, okruh blízce příbuzných druhů	***Quercus pubescens*** **agg.**
CER	dub cer	***Quercus cerris*** L.
BK	buk lesní	***Fagus sylvatica*** L.
HB	habr obecný	***Carpinus betulus*** L.
JV	javor mléč a j. klen	***Acer platanoides*** L. + ***A***. ***pseudoplatanus*** L.
JVM	javor mléč	***Acer platanoides*** L.
KL	javor klen	***Acer pseudoplatanus*** L.
BB	javor babyka	***Acer campestre*** L.
JS	jasan ztepilý	***Fraxinus excelsior*** L.
JSU	jasan úzkolistý podunajský	***Fraxinus angustifolia*** Vahl **subsp.** ***danubialis*** Pouzar
JLM	jilm habrolistý	***Ulmus minor*** Mill.
JLH	jilm drsný	***Ulmus glabra*** Huds.
JLV	jilm vaz	***Ulmus laevis*** Pall.
BR	bříza bělokorá	***Betula pendula*** Roth
BRP	bříza pýřitá nebo bříza karpatská	***Betula pubescens*** Ehrh**.** / ***Betula carpatica*** Waldst. et Kit. ex Willd.
JR	jeřáb ptačí	***Sorbus aucuparia*** L.
BRK	jeřáb břek	***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz
MK	jeřáb muk, okruh blízce příbuzných druhů	***Sorbus aria*** **agg.**
TR	třešeň ptačí	***Prunus avium*** (L.) L.
STR	střemcha obecná	***Prunus padus*** L.
LP	lípa srdčitá a l. velkolistá	***Tilia cordata*** Mill. + ***T***. ***platyphyllos*** Scop.
LPM	lípa srdčitá (l. malolistá)	***Tilia cordata*** Mill.
OLL	olše lepkavá	***Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn.
OLS	olše šedá	***Alnus incana*** (L.) Moench
OS	topol osika	***Populus tremula*** L.
TPB	topol bílý	***Populus alba*** L.
TPC	topol černý	***Populus nigra*** L.
JIV	vrba jíva	***Salix caprea*** L.

ZKRATKA	ČESKÉ JMÉNO	VĚDECKÉ JMÉNO
VR	vrba bílá, v. křehká a jejich kříženec	***Salix alba*** L. + ***S***. ***euxina*** L. V. Belyaeva + ***S***. ×***rubens*** Schrank
VRD	vrba dvoubarvá	***Salix bicolor*** Willd.
VRE	vrba šedá	***Salix elaeagnos*** Scop.
VRN	vrba nachová	***Salix purpurea*** L.
VRS	vrba slezská	***Salix silesiaca*** Willd.
VRT	vrba trojmužná	***Salix triandra*** L.

Česká a vědecká jména dřevin a vymezení druhových agregátů (agg.) odpovídá Seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka et al. 2012).

SYNUZIE PODROSTU

Synuzie podrostu představuje abecedně seřazený výpis druhů bylinného a mechového patra charakteristický pro konkrétní lesní typ. Výběr charakteristických druhů byl vytvořen na základě empirického rozboru lesnicko-typologických zápisů, které byly pořízeny v porostech s dřevinnou skladbou blízkou skladbě potenciálně přirozené, tj. přibližně odpovídající stupni přirozenosti 4–6 (Macků 2012). Většina synuzií podrostu byla převzata z charakteristik oblastních plánu rozvoje lesů I (1997–2001) a expertně revidována. V souvislosti s revizemi lesnicko-typologických map a úpravou Lesnicko-typologického klasifikačního sytému byl pro některé lesní typy vytvořen výpis charakteristických druhů synuzie podrostu zcela nový.

Taxonomické pojetí a nomenklatura druhů a poddruhů byla sjednocena podle národních seznamů cévnatých rostlin (Danihelka et al. 2012), mechorostů (Kučera et al. 2012) a lišejníků (Liška et al. 2008). Taxonomicky komplikované skupiny druhů nebo druhy, u kterých lze očekávat častější výskyt chyb při determinaci (např. *Molinia arundinacea* a *M*. *caerulea*), byly sloučeny do širších pojetí. V případě bylinného patra byly využity zejména agregáty (zkratka agg.) jednoznačně vymezené v Seznamu cévnatých rostlin České republiky (Danihlelka et al. 2012). Výjimku tvoří lesní ostružiníky, které nejsou řazeny pod *Rubus fruticosus* agg., ale přímo do vnitrorodového taxonu *Rubus* sect. *Rubus*. U mechorostů, lišejníků a v omezené míře také u cévnatých rostlin bylo využito obecnějšího vymezení druhových skupin s pomocí zkratky „s. l.“ (viz níže). Vymezení těchto druhových skupin bylo převzato z Vegetace České republiky 4: Lesní a křovinná vegetace (Chytrý 2013). Pokud bylo možné jednoznačně odvodit konkrétní druh z širšího pojetí (např. z *Anthoxanthum odoratum* agg. v nižších polohách *Anthoxanthum odoratum* s. str.) nebo se alespoň dal předpokládat jeho častější výskyt v daném lesním typu (např. specifikem přírodní lesní oblasti), byl druh uveden samostatně nebo v závorce za zmiňovanou šířeji pojatou skupinou. Zejména jedinci mechů z rodu rašeliník (*Sphagnum*) a lišejníků z rodu dutohlávka (*Cladonia*) jsou při fytocenologickém popisu vegetace často určovány pouze na úroveň rodu, přesto i nejednoznačná informace o jejich prezenci je indikačně významná. Proto, pokud nejsou zmiňovány konkrétní druhy, následuje v těchto případech za rodovým jménem zkratka „sp. div.“, tj. ve smyslu přítomnosti více možných druhů rodu (nikoliv všech).

Do mechového patra jsou kromě mechorostů tradičně řazeny také lišejníky. Ve výpisu charakteristických druhů jsou uvedeny vždy po mechorostech za středníkem. Ačkoliv je pokryvnost mechového patra u řady lesních typů významným determinačním znakem (vysokou pokryvnost mívají zejména kyselá, živinami chudá a jinou než srážkovou vodou ovlivněná stanoviště), nebyla v podkladových materiálech uváděna konzistentně, a tudíž není zmiňována. Nicméně u lesních typů, kde jsou jednotlivé druhy (taxony) mechového patra uváděny, lze pokryvnost předpokládat vyšší.

Zkratky používané v synuziích podrostu:

agg. agregát (latinsky *aggregate*)
sect. sekce (latinsky *sectio*)
s. l. v širším smyslu, v širším pojetí (latinsky *sensu lato*)
s. str. v užším smyslu, v užším pojetí (latinsky *sensu stricto*)
sp. div. různé druhy rodu (latinsky *species* div*ersae*)
subsp. poddruh (latinsky *subspecies*)

Literatura:

Danihelka, J., Chrtek, J. jun. & Kaplan, Z.: *Checklist of vascular plants of the Czech* Republic. Preslia 84, s. 647–811, 2012.

Kučera, J., Váňa, J. & Hradílek, Z.: *Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis*. Preslia 84, s. 813–850, 2012.

Liška, J., Palice, Z. & Slavíková, Š.: *Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic*. Preslia 80, s. 151–182, 2008.

Macků, J.: *Methodology for establishing the degree of naturalness of forest stands*. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, 5, s. 161–166, 2012.

RELIÉF, SKLON, EXPOZICE A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Charakteristiky sklon, expozice a nadmořská výška byly získány analýzou aktuálních lesnicko-typologických map. Rozpětí hodnot představuje interval mezi 5. a 95. percentilem. V závorce jsou uvedeny revidované krajní hodnoty, které přesáhly mezipercentilové rozpětí o více než 20 m u nadmořské výšky a 5° u sklonu.

Svahy se sklonem 5–10° jsou v reliéfu označeny jako mírné, se sklonem 10–22° jako střední, se sklonem 22–45° jako příkré a se sklonem > 45° jako strmé (srázné). Roviny a plošiny mají sklon 0–5°.

PŮDY

PŮDNÍ TYP

(velkými písmeny)

LI	litozem
RN	ranker
RZ	rendzina
PR	pararendzina
RG	regozem
FL	fluvizem
KO	koluvizem
SM	smonice
CE	černozem
CC	černice
SE	šedozem
HN	hnědozem
LU	luvizem
KA	kambizem
PE	pelozem
AD	andozem
KP	kryptopodzol
PZ	podzol
PG	pseudoglej
SG	stagnoglej
GL	glej
SR	solončak
SC	slanec
OR	organozem
KU	kultizem
AN	antropozem

subtyp

(malými písmeny)

a	antropický
an	andický (KA)
c	karbonátový
d	dystrický
e	povrchový (GL)
f	fluvický
fi	fibrický (OR)
g	oglejený
h	humusový (PZ)
h	humolitový (OR)
hr	hořečnatý (LI)
i	stratifikovaný (FL)
j	chromický (rubifikovaný)
k	kambický
l	luvický
m	modální
me	mezický (OR)
n	melanický
o	histický
p	pelický
pl	planický
q	glejový
q	akvický (GL)
r	arenický
s	suťový
s	rankerový
sa	saprický (OR)
su	sulfidický
t	litický
u	umbrický
v	vyluhovaný
ve	vertický (CE)
w	hydroeluviovaný
x	černický (CE)
y	psefitický
z	podzolový (RN)

subtypy kultizemě KU:

ho	hortická
ky	kypřená
ri	rigolovaná

subtypy antropozemě AN:

g	oglejená
h	humózní
hh	hlubokohumózní
in	intoxikovaná
ko	kontaminovaná
p	pelická
pk	překrytá
q	glejová
r	arenická
re	redukovaná
sk	skeletovitá
sp	spolická
su	sulfidická
te	terasovaná
ur	urbická

varieta

(malými písmeny s apostrofem)

a‘	mezobazická
b‘	eutrofní
c‘	slabě karbonátová
d‘	oligobazická (LI)
e‘	eubazická
g‘	slabě (hluboko) oglejená
h‘	humózní
k‘	kaolinitická
l‘	slabě luvická (KA)
n‘	mělce melanická
o‘	zrašelinělá
q‘	hluboko glejová
s‘	silně skeletovitá
u‘	mělce umbrická
v‘	slabě vyluhovaná
w‘	slabě hydroeluviovaná
x‘	hořečnatá
y‘	ortštejnová (PZ)
z‘	podzolovaná
z‘	železitá (PZ)

subvarieta

d‘	oligotrofní
m‘	mezotrofní
d‘m‘	oligomezotrofní

akumulační fáze

i‘	akumulovaná
w‘	erodovaná
y‘	překrytá

půdní druh

p	písčitá (půda)
hp	hlinitopísčitá
ph	písčitohlinitá
h	hlinitá
jh	jílovitohlinitá
j	jílovitá, (jíl)
jp	jílnatý písek
jhp	jílnatohlinitý písek
org	organická

SKELET

hrp	hrubý písek (2–4 mm)
š	štěrk (4–30 mm)
k	kameny (30–300 mm)
b	balvany (> 300 mm)
kh	kompaktní hornina (skála)

SKELETNATOST (příklad zápisu)

hp–ph	hlinitopísčitá až písčitohlinitá, 0–10 % skeletu
hp, (k)	hlinitopísčitá, 10–50 % kamene
ph, k	písčitohlinitá, 50–80 % kamene
(ph), k	kamenitá (> 80 % kamene) s písčitohlinitou výplní

Nomenklatura půdních jednotek je uvedena podle:

Němeček, J. et al.: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha: ČZU, 2011;

Vokoun, J. et al.: Příručka pro průzkum lesních půd (Taxonomický klasifikační systém půd ČR v lesnické praxi). Interní text, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2003.