PŘÍLOHA Č. 4 CHARAKTERISTIKY LESNÍCH TYPŮ

4Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4Z0	ZAKRSLÁ BUČINA **antropogenní**	0,6	BK 14–16, JD 14–18	ANsk, ANsp, LIm	(hp); š	výsypka, navážka, lom	výsypky, navážky, hrany lomu	15–30	plošina	440–520	BK 5–7, DBL 1, BR 1, JD, BO
	Bylinné patro (30–50 %):	V závislosti na trofnosti viz 4Z1 nebo 4Z2.									
	Mechové patro:	V závislosti na trofnosti viz 4Z1 nebo 4Z2.									
Poznámka											
4Z1	ZAKRSLÁ BUČINA **modální**	1,1	BK 14–16, JD 14–18	RNtd‘, RNmd‘, KAsd‘	hp; k	pískovec, jílovec	hřbety, kamenité svahy	15–45	slunná	460–680	BK 5–7, DBL 1, BR 1, BO 1, JD
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4Z2	ZAKRSLÁ BUČINA **chudší**	7,2	BK 14–16, JD 14–18	RNt(z‘), RNd(z‘), KAsd(z‘)	hp; k	pískovec, silicit	hřbety, kamenité svahy	(0–)10–45+	slunná	420–640	BK 5–7, DBL 1, BR 1, BO 1, JD
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

5Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5Z2	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	6,7	BK 14–16, JD 14–18, SM 16–20	RNtd‘(z‘), RNsd‘(z‘), RNd(z‘), KAsd(z‘)	p–hp; k, b	pískovec	balvanité a skalnaté svahy, hřbety	0–45	převážně slunná	(560–)620–900	BK 5–7, JD 1–3, BR 1, SM
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

6Z

6Z2	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	54,0	BK 12–16, JD 14–16, SM 14–18	RNsdz‘, RNtdz‘, RNz, PZs	hp; b, k	pískovec	balvanité a skalnaté svahy, hřbety	0–35	slunná	(920–)960–1140	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR 1, JR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6Z9	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA **specifická – vrcholový fenomén**	142,9	BK 12–16, JD 14–16, SM 14–18	RNs(z‘), RNtd(z‘), PZs, KPs	hp–ph; k, b	pískovec	vrcholy, hřbety	0–35 (–45+)	převážně stinná	(860–)920–1100(–1140)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR 1, JR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

7Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
7Z7	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA **skeletnatější**	15,5	SM 12–16	LImd‘, RNsdz‘, RNtdz‘, RNz	(p–hp); b	pískovec	balvanité svahy, osypy	0–40	slunná	1040–1220	SM 7–9, BK 1–3, JD 1, BR 1, JR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

7Z9	ZAKRSLÁ BUKOVÁ SMRČINA **specifická – vrcholový fenomén**	128,9	SM 12–16	RNsz‘, RNtdz‘, RNz, PZs	hp–ph; b	pískovec	vrcholy, hřbety	0–45+	různá	(1040–) 1100–1280	SM 7–9, BK 1–3, JD 1, BR 1, JR
	Bylinné patro (50–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

8Z

8Z9	ZAKRSLÁ JEŘÁBOVÁ SMRČINA **specifická – vrcholový fenomén**	19,2	SM 10–14	RNsz‘, RNtdz‘, RNz, PZs	hp; b	pískovec	vrcholy, hřbety	0–45+	různá	1220–1320	SM 7–9, JR 1, BR
	Bylinné patro (50–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3Y1	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	1,0	BK 20–26, JD 24–30	LImd‘, RNtd‘, RNsd‘	(hp); k, kh	pískovec, suť	kamenité a suťové hřbety	10–40	stinná	420–460	BK 5–7, DBL 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro ((10)30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
3Y3	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	2,6	BK 26–34, JD 28–36, KL 22–34	LIma‘, RNta‘, RNsa‘	(hp); k, kh	pískovec, jílovec, suť	skalnaté a suťové svahy	0–40	různá	380–620	BK 5–7, DBL 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, KL, TS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3Y9	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	47,3	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	LIma‘, RNta‘, RNsa‘	(hp); k, kh	pískovec, jílovec, suť	rokle	0–45	různá	(380–)420–580(–640)	BK 5–7, DBL 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, KL, TS
	Bylinné patro (30–50 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Polystichum aculeatum*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

4Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4Y0	SKELETOVÁ BUČINA **antropogenní**	4,3	BK 20–34, JD 24–36	ANsk, ANsp, LImd‘	(hp); š	výsypka, odval, lom	výsypky, hromadnice, lomy	0–40	různá	400–640	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1–3, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro ((10)30–50(70) %):	V závislosti na trofnosti viz 4Y1 nebo 4Y3.									
	Mechové patro:	V závislosti na trofnosti viz 4Y1 nebo 4Y3.									
Poznámka											

4Y1	SKELETOVÁ BUČINA **modální**	11,3	BK 20–26, JD 24–30	LImd‘, RNsd‘, RNtd‘	(p–hp); k	pískovec, silicit, suť	kamenité osypy a svahy	(0–)10–45+	převážně slunná	(380–)420–620(–660)	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1–3, BO 1, BR, LPM, KL
	Bylinné patro ((10)30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4Y3	SKELETOVÁ BUČINA **bohatší**	4,6	BK 26–34, JD 28–36, KL 22–34	LIma‘, RNma‘, RNsa‘, RNta‘	(hp); k	pískovec, jílovec, silicit, suť	skalnaté svahy	(0–)15–45	různá	420–580	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1–3, BR, BO, LPM, KL, TS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio nemorensis* agg.									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5Y0	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **antropogenní**	22,5	BK 20–34, JD 24–36, SM 26–38	ANsk, ANsp, LImd‘	(p–hp); k	výsypka, odval, lom	hromadnice, výsypky, lomy	(0–)10–45	převážně slunná	560–880 (–920)	BK 5–7, JD 1–3, BR 1–3, SM 1–3, KL, LPM
	Bylinné patro ((10)30–50(70) %):	V závislosti na trofnosti viz 5Y1 nebo 5Y3.									
	Mechové patro:	V závislosti na trofnosti viz 5Y1 nebo 5Y3.									
Poznámka											
5Y1	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	105,9	BK 20–26, JD 24–30, SM 26–32	LImd‘, RNsd(z‘), RNtd(z‘)	(p–hp); k, b	pískovec, silicit, suť	balvanité osypy, skalnaté svahy	(0–)10–45+	různá	(500–)560–880(–980)	BK 5–7, JD 1–3, BR 1–3, SM 1–3, KL, LPM
	Bylinné patro ((10)30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5Y3	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	37,0	BK 26–34, JD 28–36, KL 22–34, SM 30–38	LIma‘, RNma‘, RNsa‘, RNta‘	(p–hp); k, b	pískovec, jílovec, suť	balvanité osypy, skalnaté svahy	(0–)10–45+	různá	(460–)560–960(–1020)	BK 5–7, JD 1–3, BR 1–3, SM 1–3, KL, LPM, TS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5Y9	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	303,8	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	RNkd‘, RNsd‘, RNtd‘, RGy	(p–hp); k, b	pískovec, jílovec, silicit, suť	rokle, mury	0–45+	převážně stinná	(420–)520–860(–1200)	BK 5–7, JD 1–3, BR 1–3, SM 1–3, KL, LPM
	Bylinné patro (30–50 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Polystichum aculeatum*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

6Y

6Y1	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	17,9	BK 20–24, JD 22–28, SM 24–30	LImd‘, RNsdz‘, RNtdz‘	(p–hp); b, k	pískovec, suť	skalnaté svahy, balvanité osypy	(0–)10–45+	převážně stinná	(840–)880–1040(–1120)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR 1, JR
	Bylinné patro ((10)30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
6Y9	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	4,5	BK 28–30, JD 30–34, KL 28–30, SM 32–36	RNkd‘, RNsd‘, RNtd‘, LImd‘	(p–hp); b, k	pískovec, suť	rokle, mury	10–45	převážně stinná	780–980 (–1020)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR 1, JR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Polystichum aculeatum*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

7Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
7Y1	SKELETOVÁ BUKOVÁ SMRČINA **modální**	2,2	JD 18–22, SM 20–24	LImd‘, RNsdz‘, RNtdz‘, RNz	(p–hp); b	pískovec, suť	balvanité svahy, osypy	22–45+	převážně stinná	1000–1260	SM 7–9, BK 1–3, JD 1, BR 1, JR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4M

4M1	CHUDÁ BUČINA **modální**	7,6	BK 22–24, JD 24–30	PZr, PZr, KArdz‘, KAdz‘	p–hp; (k)	pískovec, silicit	mírné a střední svahy	0–22	slunná	480–600	BK 5–7, DBL 1–3, JD 1–3, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5M

5M1	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	3,9	BK 24–26, JD 26–30, SM 28–32	PZm(r), KPm(r), KAdz‘, KArdz‘	p–hp; (k)	pískovec	střední svahy, hřbety	10–22	slunná	600–760	BK 5–7, JD 3–5, JD 1, SM 1, BR, JR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K1	KYSELÁ BUČINA **modální**	207,6	BK 26–28, JD 28–32	KAd(z')	hp; (k)	pískovec, silicit	mírné a střední svahy	0–22	převážně slunná	(340–)420–620(–720)	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1–3, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
4K1e	KYSELÁ BUČINA **modální – exponovaná**	10,8	BK 26, JD 28–30	"	"	"	příkré a strmé svahy	22–45+	slunná	(420–)500–640	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4K2	KYSELÁ BUČINA **chudší**	54,5	BK 26, JD 28–32	KAdz', KArdz', KPr, PZr	p–hp; (k)	pískovec, silicit	mírné svahy, hřbety	15–22	převážně slunná	400–620(–720)	BK 7–9, DBL 1–3, JD 1–3, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
4K2e	KYSELÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	1,6	BK 24, JD 26–28	"	"	"	příkré a strmé svahy	22–45	slunná	460–580	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4K4	KYSELÁ BUČINA **sušší**	6,8	BK 24, JD 26–28	KAd(z'), KArd(z'), KPr	p–hp; (k)	pískovec, silicit	mírné a střední svahy	0–22	slunná	420–580	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
4K4e	KYSELÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	1,2	"	"	"	"	příkré svahy	22–35	převážně slunná	500–560	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4K5	KYSELÁ BUČINA **vlhčí**	71,0	BK 28–32, JD 30–34	KAd(g'), KArd(g'), KPr(g')	hp–ph; (k)	pískovec, silicit	mírné a střední svahy, údolí	0–22	různá	420–560(–600)	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1–3, BR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4K7	KYSELÁ BUČINA **skeletnatější**	772,2	BK 24–32, JD 26–34	KAds'(z'), KAsd(z')	hp; (k)	pískovec, silicit	mírné a střední svahy, hřbety	0–22	různá	(380–)440–620(–680)	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1–3, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
4K7e	KYSELÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	23,9	BK 24–30, JD 26–32	"	"	"	příkré a strmé svahy	22–45+	slunná	380–600(–700)	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5K1	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	488,9	BK 26–28, JD 28–32, SM 30–34	KAdz‘, KPm	hp; (k)	pískovec, silicit	hřbety, střední svahy	0–22	slunná	(500–)600–900(–940)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
5K1e	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	30,6	BK 26, JD 28–30, SM 30–32	"	"	"	příkré svahy	22–45	"	(540–)580–840(–920)	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

5K2	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	141,6	BK 26, JD 28–32, SM 30–34	KAdz‘, KArdz‘, KPm(r), PZm(r)	p–hp; (k)	pískovec, silicit	hřbety, střední svahy	0–22	slunná	540–860(–920)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5K5	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **vlhčí**	44,5	BK 28–32, JD 30–34, SM 32–36	KAd(g‘)(z‘), KPm(g‘)	hp; (k)	pískovec, silicit	mírné a střední svahy	0–22	stinná	580–880	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*, *Tetraphis pellucida*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5K7	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	1522,7	BK 24–32, JD 26–34, SM 28–36	KAds‘(z‘), KAsd(z‘), KPms‘	hp; (k)	pískovec, (silicit)	mírné a střední svahy	(0–)10–22	různá	(440–)600–880(–920)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5K7e	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	67,4	BK 24–30, JD 26–32, SM 28–34	"	"	"	příkré svahy	22–45	slunná	(500–)560–800(–900)	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6K

6K1	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	95,6	BK 24–26, JD 26–30, SM 28–32	KPm, PZm, KAdz‘	hp; (k)	pískovec	střední svahy, hřbety	(0–)10–22	převážně slunná	(860–)900–1100(–1140)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6K2	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	6,6	BK 24, JD 26–30, SM 28–32	KPm, PZm, (KAdz‘)	hp; (k)	pískovec	hřbety, střední svahy	5–22	stinná	960–1040	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
6K5	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **vlhčí**	6,8	BK 26–28, JD 28–32, SM 30–34	KPm(g'), PZm(g'), KAdz'(g')	hp; (k)	pískovec	mírné a střední svahy	0–22	různá	800–940	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*, *Tetraphis pellucida*									
Poznámka											
6K7	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější**	502,5	BK 22–28, JD 24–32, SM 26–34	KPms', PZms', KAds'z', KAsdz'	hp; (k)	pískovec	střední svahy, hřbety	0–22	různá	(780–)860–1000(–1060)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
6K7e	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	15,3	BK 22–26, JD 24–30, SM 26–32	KPms', PZms', KAds'z', KAsdz'	"	"	příkré svahy	22–45	slunná	780–940(–980)	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											
6K9	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **specifická – vrcholový fenomén**	12,0	BK 20–24, JD 22–26, SM 24–28	KPm, PZm, KAdz'	hp; (k)	pískovec	příkré svahy	(0–)10–22	slunná	900–980	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

7K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
7K3	KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA **bohatší**	261,0	BK 20–22, JD 22–26, SM 24–28	PZm, KPm	hp–ph; (k)	pískovec	střední svahy, hřbety	(0–)10–22	převážně slunná	(1040–)1080–1220(–1280)	SM 7–9, BK 1–3, JD 1, BR, JR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Barbilophozia lycopodioides*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

7K7	KYSELÁ BUKOVÁ SMRČINA **skeletnatější**	32,4	BK 18–22, JD 20–26, SM 22–28	PZms‘, KPms‘, (PZs, KPs)	hp–ph; (k)	pískovec, suť	hřbety, střední svahy	5–22	slunná	1060–1240	SM 7–9, BK 1–3, JD 1, BR, JR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Barbilophozia lycopodioides*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4N

4N1	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **modální**	169,2	BK 24–28, JD 26–32	KAds‘, KAsdz‘, RNd(z‘), RNu(z‘)	hp; k	pískovec, silicit	hřbety, kamenité svahy	0–45+	různá	(340–)440–640(–720)	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4N2	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **chudší**	85,2	BK 22–26, JD 26–30	KAsdz‘, PZs, RNdz‘, RNz	hp; k	pískovec, silicit	hřbety, kamenité svahy	(0–)10–45	slunná	(380–)460–600(–640)	BK 7–9, DBL 1–3, JD 1–3, BO, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4N3	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **bohatší**	56,1	BK 26–30, JD 28–32	KAds‘, RNd	hp; k	pískovec, silicit	kamenité svahy, hřbety	0–45+	převážně slunná	(380–)440–620(–660)	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4N4	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **sušší**	0,7	BK 20–24, JD 24–26	KAds‘, KAsdz‘, RNd(z‘), RNu(z‘)	hp; k	pískovec, silicit	hřbety, kamenité svahy	(22–) 30–45	slunná	660–720	BK 7–9, DBL 1–3, JD 1–3, BO, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4N7	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **skeletnatější**	1,3	BK 22–26, JD 26–30	RNdz‘, RNsz‘, RNtz‘	hp; k	pískovec, silicit	kamenité svahy, lokální vyvýšeniny	5–45	stinná	440–640	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5N

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5N1	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	1187,2	BK 24–28, JD 26–32, SM 28–34	KAsdz‘, KPs, KPr, RNdz‘	hp; k	pískovec	hřbety, kamenité svahy	(0–)10–45+	různá	(460–)580–900(–980)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5N2	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	319,5	BK 22–26, JD 26–30, SM 28–32	KAsdz‘, KPs(r), PZs(r), RNz	p–hp; k	pískovec	hřbety, kamenité svahy	0–45+	převážně slunná	(500–)580–860(–960)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5N3	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	95,9	BK 26–30, JD 28–32, SM 30–34	KAsz‘, KPs, KPr, RNdz‘	hp; k	pískovec	kamenité svahy, hřbety	(0–)10–45+	převážně slunná	(520–)600–900	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5N7	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	51,6	BK 22–26, JD 26–30, SM 28–32	RNdz‘, RNsz‘, RNtz‘	p–hp; k, b	pískovec	hřbety, kamenité svahy	0–45+	převážně stinná	(520–)580–840(–900)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6N

6N1	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	340,0	BK 22–26, JD 24–30, SM 26–32	KPs(r), PZs(r), RNdz‘	hp; k	pískovec	kamenité svahy, hřbety	(0–)15–45+	různá	(760–)840–1040(–1120)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6N2	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	4,6	BK 22–24, JD 24–28, SM 26–30	PZs, PZr, RNz	p–hp; k	pískovec	hřbety, kamenité svahy	(0–)10–35	slunná	(880–)920–980	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
6N7	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější**	3,3	BK 22–24, JD 24–28, SM 26–30	RNdz‘, RNz, RNsz‘, RNtz‘	p–hp; k, b	pískovec	kamenité hřbety	0–30	různá	840–940	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

7N

7N1	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ SMRČINA **modální**	55,1	BK 18–20, JD 20–24, SM 22–26	PZs, RNz, RNuz‘, RNdz‘	hp–ph; b	pískovec, suť	hřbety, balvanité svahy	(5–)22–45+	převážně stinná	(1000–)1060–1220(–1260)	SM 7–9, BK 1–3, JD 1, BR, JR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Barbilophozia lycopodioides*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

7N3	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ SMRČINA **bohatší**	18,8	BK 18–22, JD 20–26, SM 22–28	KPs, PZs, RNz, RNdz‘	hp–ph; b	pískovec, suť	hřbety, balvanité svahy	(5–)22–45+	stinná	1040–1220	SM 7–9, BK 1–3, JD 1, BR, JR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Avenella flexuosa*, *Blechnum spicant*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum verticillatum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Barbilophozia lycopodioides*, *Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3S1	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **modální**	6,3	BK 26–30, JD 28–34, KL 24–28	KAma‘	hp–ph; (š)	pískovec, jílovec, (slínovec)	mírné a střední svahy, hřbety	0–22	převážně slunná	320–440	BK 5–7, DBL 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4S

4S1	SVĚŽÍ BUČINA **modální**	3282,1	BK 28–30, JD 30–34, KL 26–28	KAma‘	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, (slínovec)	mírné a střední svahy	0–22	různá	(340–)420–620(–740)	BK 7–9, JD 1–3, DBL, LP, HB, JV
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
4S1e	SVĚŽÍ BUČINA **modální – exponovaná**	29,7	BK 28, JD 30–32, KL 26	"	"	"	příkré svahy	22–45	slunná	380–620(–660)	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4S2	SVĚŽÍ BUČINA **chudší**	23,5	BK 28, JD 30–34, KL 24	KAmd'm', KArd'm'	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec	mírné a střední svahy	0–22	různá	(400–)520–660	BK 7–9, JD 1–3, DBL 1, LPM, KL, HB
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4S3	SVĚŽÍ BUČINA **bohatší**	3,1	BK 28–34, JD 30–36, KL 28–30	KAma‘	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, slínovec	mírné a střední svahy	0–22	různá	400–580	BK 7–9, JD 1–3, DBL, LP, HB, JV
	Bylinné patro (30–50 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
4S3e	SVĚŽÍ BUČINA **bohatší – exponovaná**	0,4	BK 26–32, JD 28–34, KL 26–28	"	"	"	příkré svahy	22–35	slunná	440–460	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Maianthemum bifolium*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4S4	SVĚŽÍ BUČINA **sušší**	7,5	BK 26, JD 28–30, KL 22–24	KAma‘, KAra‘	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, slínovec	hřbety, lokální vyvýšeniny	0–22	různá	340–520(–560)	BK 7–9, JD 1–3, DBL, LP, HB, JV
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
4S4e	SVĚŽÍ BUČINA **sušší – exponovaná**	6,0	BK 26, JD 28–30, KL 22–24	"	"	"	hřbety, příkré svahy	22–40	převážně slunná	440–600	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Hylocomium splendens*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4S5	SVĚŽÍ BUČINA **vlhčí**	63,0	BK 30–34, JD 32–36, KL 28–32	KAma‘(g‘), (KAl(g‘))	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, (slínovec)	mírné svahy, úžlabiny	0–22	různá	400–540(–600)	BK 7–9, JD 1–3, DBL, LP, HB, JV
	Bylinné patro (30–50 %):	*Deschampsia cespitosa*, *Galium odoratum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											
4S7	SVĚŽÍ BUČINA **skeletnatější**	940,3	BK 26–34, JD 28–36, KL 22–32	KAms‘a‘	hp–ph; k	pískovec, jílovec, (slínovec)	střední svahy, hřbety	0–22	převážně stinná	(380–)440–620(–720)	BK 7–9, JD 1–3, DBL, LP, HB, JV
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4S7e	SVĚŽÍ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	334,4	BK 26–32, JD 28–34, KL 22–30	"	"	"	"	22–45+	převážně slunná	(360–)420–640(–720)	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5S1	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	14204,3	BK 28–30, JD 30–34, KL 26–28, SM 32–36	KAma‘	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, (slínovec)	mírné a střední svahy	0–22	různá	(440–)560–880(–1000)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
5S1e	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	39,3	BK 28, JD 30–32, KL 26, SM 32–34	"	"	"	příkré svahy	22–45	převážně slunná	560–860(–900)	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5S2	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	6,8	BK 28, JD 30–34, KL 24, SM 32–36	KAmd'm', KArd'm'	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec	střední svahy, hřbety	(0–)10–22	slunná	560–780	BK 5–7, JD 3–5, SM, LPM, KL
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
5S2e	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	1,9	BK 26, JD 28–32, KL 22–24, SM 30–32	"	"	"	příkré svahy	22–45	"	600–700	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5S5	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **vlhčí**	9,4	BK 30–34, JD 32–36, KL 28–32, SM 34–38	KAm(g')	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, (slínovec)	mírné svahy, úžlabiny	0–22	převážně stinná	560–780(–840)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (30–50 %):	*Deschampsia cespitosa*, *Galium odoratum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

5S7	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	5238,8	BK 26–34, JD 28–36, KL 22–32, SM 30–38	KAms'a', (KAsa')	hp–ph; k	pískovec, jílovec, (slínovec)	střední svahy, hřbety	(0–)10–22	různá	(440–)580–880(–980)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
5S7e	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	261,3	BK 26–32, JD 28–34, KL 22–30, SM 30–36	"	hp–ph; (k)	"	příkré a strmé svahy	22–45+	převážně slunná	(480–)540–820(–960)	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
6S1	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	2654,9	BK 26–28, JD 28–32, KL 24–26, SM 30–34	KAmd'm', KAd, KPm	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec	mírné a střední svahy	0–22	různá	(560–)880–1080(–1160)	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

6S7	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější**	389,7	BK 24–30, JD 26–34, KL 20–28, SM 28–36	KAms'd'm', KAds', KPms'	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec	střední svahy, hřbety	(0–)10–22	různá	(800–)880–1000(–1080)	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
6S7e	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	13,0	BK 24–28, JD 26–32, KL 20–26, SM 28–34	"	"	"	příkré svahy	(22–)30–45+	stinná	(840–)880–1080	"
	Bylinné patro (10–30(50) %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
7S1	SVĚŽÍ BUKOVÁ SMRČINA **modální**	1,4	BK 22–24, JD 24–28, KL 18–22, SM 26–30	KPm	hp–ph; (k)	pískovec	hřbety	5–22	slunná	1060–1100	SM 5–7, BK 3–5, JD 1, KL, BR, JR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Gentiana asclepiadea*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	*Barbilophozia lycopodioides*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4F

4F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **modální**	964,7	BK 26–34, JD 28–36, KL 22–32	KAms‘a‘, KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp; k	pískovec, jílovec, slínovec	kamenité příkré a strmé svahy	(0–)10–45+	různá	(320–)420–640(–740)	BK 5–7, JD 1–3, JV 1–2, DBL, LP, JLH, HB, TS
	Bylinné patro (30–50 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **bohatší**	310,0	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34	KAsa‘(e‘), RNka‘(e‘), RNma‘(e‘)	hp–ph; k	jílovec, slínovec, pískovec	kamenité svahy	(0–)10–45+	stinná	(380–)460–600(–720)	BK 5–7, JD 1–3, JV 1–2, DBL, LP, JLH, HB, TS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg.									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

5F

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	8241,8	BK 26–34, JD 28–36, KL 22–32, SM 30–38	KAsa‘, KAms‘a‘, RNma‘, RNka‘	hp; k	pískovec, jílovec, slínovec	kamenité svahy	(0–)15–45+	různá	(440–)560–880(–1040)	BK 5–7, JD 3–5, JV 1–2, LP, JLH, SM, TS
	Bylinné patro (30–50 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	4083,8	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	KAsa‘(e‘), KAms‘a‘(e‘), RNma‘(e‘), RNka‘(e‘)	hp–ph; k	jílovec, slínovec, pískovec	kamenité svahy	(0–)15–45+	převážně stinná	(440–)560–880(–1000)	BK 5–7, JD 3–5, JV 1–2, LP, JLH, SM, TS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Senecio nemorensis* agg.									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

5F9	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	0,6	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	KAsa‘, RNka‘	hp–ph; k	pískovec, jílovec	rokle	15–40	slunná	660–740	BK 5–7, JD 3–5, JV 1–2, LP, JLH, SM, TS
	Bylinné patro (30–50 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg.									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Dicranella heteromalla*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6F

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	1130,5	BK 24–30, JD 26–34, KL 20–28, SM 28–36	KAsa‘, KAms‘a‘, RNma‘, RNka‘	hp–ph; k	pískovec, jílovec, (slínovec)	kamenité svahy, hřbety	(0–)22–45+	převážně stinná	(720–)880–1080(–1180)	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL 1–2, JLH, TS
	Bylinné patro (30–50 %):	*Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Luzula luzuloides*, *Luzula sylvatica*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*										
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **bohatší**	303,3	BK 28–30, JD 30–34, KL 28–30, SM 32–36	KAsa‘, KAms‘a‘, RNma‘, RNka‘	hp–ph; k	pískovec, jílovec, (slínovec)	kamenité svahy, hřbety	(0–)22–45+	převážně stinná	(780–)880–1080(–1140)	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL 1–2, JLH, TS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Luzula sylvatica*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

7F

7F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ SMRČINA **modální**	128,5	BK 20–24, JD 22–28, KL 16–22, SM 24–30	KPs, RNkd‘m‘	hp–ph; b	pískovec, suť	balvanité svahy, hřbety	(5–)22–45+	různá	(1040–)1080–1240(–1300)	SM 5–7, BK 1–3, JD 1–3, KL, BR, JR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Gentiana asclepiadea*, *Luzula luzuloides*, *Luzula sylvatica*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*										
	Mechové patro:	*Barbilophozia lycopodioides*, *Dicranella heteromalla*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3B

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3B0	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	2,4	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34	KAaa‘, ANpk	hp–ph; (š)	výsypka, navážka	výsypky, navážky	0–15	různá	320–340	BK 5–7, DBL 1–3, HB 1, JD 1, LP, JV, JLH, JS, TR
	Bylinné patro (30–50 %):	Nelze stanovit charakteristickou kombinaci druhů.									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											
3B1	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	15,9	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34	KAma‘, KAva‘	hp–ph; (š)	slínovec, jílovec, pískovec	mírné a střední svahy, plošiny	0–22	převážně slunná	300–400	BK 5–7, DBL 1–3, HB 1, JD 1, LP, JV, JLH, JS, TR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4B

4B1	BOHATÁ BUČINA **modální**	923,7	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34	KAma‘(e‘), KAva‘(e‘)	hp–ph; (š)	slínovec, jílovec, pískovec	mírné a střední svahy	0–22	převážně slunná	(320–)380–620(–720)	BK 7–9, JD 1–3, DBL, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
4B1e	BOHATÁ BUČINA **modální – exponovaná**	1,3	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34	"	"	"	příkré svahy	22–30	stinná	320–600	"
	Bylinné patro (30–50 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4B2	BOHATÁ BUČINA **chudší**	1302,8	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34	KAma‘	hp–ph; (š)	jílovec, pískovec, slínovec	mírné a střední svahy	0–22	převážně stinná	(340–)440–620(–720)	BK 7–9, JD 1–3, DBL, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											
4B2e	BOHATÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	26,0	"	"	"	"	příkré svahy	22–40	různá	(380–)420–640(–700)	"
	Bylinné patro (30–50 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											
4B7	BOHATÁ BUČINA **skeletnatější**	745,5	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34	KAms‘a‘(e‘), KAvs‘a‘(e‘)	hp–ph; (k)	jílovec, slínovec, pískovec	mírné a střední svahy	0–22	různá	(380–)440–620(–680)	BK 7–9, JD 1–3, DBL, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

5B

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5B1	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	366,4	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	KAma‘(e‘), KAva‘(e‘)	hp–ph; (k)	jílovec, slínovec, pískovec	střední svahy	(0–)10–22	převážně slunná	(500–)580–880(–960)	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (30–50 %):	*Asarum europaeum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

5B2	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	2572,6	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	KAma‘	hp–ph; (k)	jílovec, pískovec, slínovec	střední svahy	(0–)10–22	různá	(480–)560–860(–960)	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (30–50 %):	*Dentaria bulbifera*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5B7	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	1084,4	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	KAm(v)s'a'(e'), KAsa'(e')	hp–ph; (k)	jílovec, slínovec, pískovec	střední svahy, hřbety	(0–)10–22	slunná	(500–)580–880(–980)	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (30–50 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
5B7e	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	13,7	"	"	"	"	příkré svahy	22–45	různá	500–700(–780)	"
	Bylinné patro (30–50 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

6B

6B1	BOHATÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	120,7	BK 28–30, JD 30–34, KL 28–30, SM 32–36	KAma', (KAms'a')	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, (slínovec)	střední svahy	(0–)10–22	slunná	(840–)900–1060(–1160)	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL, JLH, JS
	Bylinné patro (30–50 %):	*Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4W

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4W1	VÁPENCOVÁ BUČINA **modální**	2,1	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34	RZk, KAve‘	hp–ph; (š)	vápenec	mírné a střední svahy, hřbety	0–22	slunná	420–580	BK 9–10, DBL, JD, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

3H

3H1	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	4,7	BK 26–34, JD 28–36, KL 26–34	LUma‘, KAla‘	ph–jh	jílovec, slínovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	mírné a střední svahy, plošiny	0–15	slunná	320–400	BK 5–7, DBL 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Galium odoratum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

3H3	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	0,5	BK 28–34, JD 30–36, KL 28–34	LUma‘(e‘), KAl(v)a‘(e‘), PRka‘	ph–jh	slínovec, jílovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	plošiny, mírné svahy	0–15	slunná	320–360	BK 5–7, DBL 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3H5	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	11,8	BK 28–34, JD 30–36, KL 28–34	LUmg'a'(e'), KAlg'a'(e')	ph–jh	jílovec, slínovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	plošiny, mírné a střední svahy	0–15	různá	300–360	BK 5–7, DBL 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Luzula pilosa*, *Oxalis acetosella*										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4H

4H1	HLINITÁ BUČINA **modální**	17,0	BK 28–34, JD 30–36, KL 28–34	KAla', LUma'	ph–jh	jílovec, slínovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	plošiny, mírné svahy	0–10	převážně slunná	320–460	BK 7–9, JD 1–3, DBL, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Galium odoratum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4H3	HLINITÁ BUČINA **bohatší**	13,0	BK 28–34, JD 30–36, KL 28–34	LUma'(e'), KAl(v)a'(e')	ph–jh	slínovec, jílovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	mírné svahy, úžlabiny, plošiny	0–10	různá	320–620	BK 7–9, JD 1–3, DBL, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4H

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4H5	HLINITÁ BUČINA **vlhčí**	202,0	BK 28–34, JD 30–36, KL 28–34	KAlg‘a‘(e‘), LUmg‘a‘(e‘)	ph–jh	jílovec, slínovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	údolí, mírné svahy, úžlabiny	0–10	převážně slunná	320–580(–620)	BK 7–9, JD 1–3, DBL, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Luzula pilosa*, *Oxalis acetosella*										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

5H

5H5	HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA **vlhčí**	79,2	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	KAlg‘a‘, (LUmg‘a‘)	ph–h	jílovec, slínovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	plošiny, mírné svahy	0–10	převážně slunná	(600–)660–900	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, JS, JLH, SM
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Asarum europaeum*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Luzula pilosa*, *Oxalis acetosella*										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

3D

3D1e	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	7,6	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36	KAme‘, KAve‘, PRke‘, KOme‘	ph–j; (š)	slínovec, jílovec, pískovec, hlinitý sediment	příkré svahy	22–35	převážně slunná	300–400	BK 5–7, DBL 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JS, TR, TS
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3D5	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	4,7	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36	KAmg‘e‘, PRkg‘, KOpg‘e‘	ph–j; (š)	slínovec, jílovec, pískovec, hlinitý sediment	mírné a střední svahy, plošiny	0–15(–22)	různá	300–400	BK 5–7, DBL 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JS, TR
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4D

4D1	OBOHACENÁ BUČINA **modální**	14,4	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36	KAme‘, KApe‘, PRpe‘, KOme‘	ph–j; (š)	jílovec, slínovec, pískovec, hlinitý sediment	mírné a střední svahy, úžlabiny	0–22	slunná	340–640	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DBL, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4D2	OBOHACENÁ BUČINA **chudší**	15,0	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36	KAma‘(e‘), KOma‘(e‘)	ph; (š)	jílovec, pískovec, slínovec, hlinitý sediment	střední svahy, úžlabiny	(0–)10–22	převážně stinná	(440–)500–620(–700)	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DBL, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4D5	OBOHACENÁ BUČINA **vlhčí**	87,2	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36	KAmg‘e‘, KApg‘e‘, PRpg‘, KOmg‘e‘	ph–j; (š)	jílovec, slínovec, pískovec, hlinitý sediment	úžlabiny, údolí	0–22	převážně slunná	360–580 (–620)	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DBL, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*										
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4D7	OBOHACENÁ BUČINA **specifická – sesuvná**	11,6	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36	KAme‘(g‘), KApe‘(g‘), PRp(g‘)	ph–h; (š)	jílovec, slínovec, pískovec, hlinitý sediment	střední svahy	10–15 (–22)	slunná	320–460	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DBL, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dentaria glandulosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

5D

5D1	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	1,3	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAme‘, KAve‘, KOme‘	ph–h; (k)	jílovec, slínovec, pískovec, hlinitý sediment	mírné svahy, úžlabiny	10–22	stinná	580–760	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5D2	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	4,8	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAma‘(e‘), KOma‘(e‘)	hp–ph; (k)	jílovec, pískovec, slínovec, hlinitý sediment	mírné svahy, úžlabiny	(0–)10–22	stinná	560–760	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											
5D3	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	0,4	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAme‘, KOm	ph–h; (k)	jílovec, slínovec, pískovec, hlinitý sediment	mírné svahy, úžlabiny	15–22	slunná	780–880	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											
5D5	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **vlhčí**	22,7	BK 32–36, JD 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAmg‘, KOmg‘	ph–h; (k)	jílovec, slínovec, pískovec, hlinitý sediment	úžlabiny, mírné svahy	0–22	slunná	480–800 (–940)	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Aegopodium podagraria*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria glandulosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*									
	Mechové patro:	Pokryvnost mechorostů je (obyčejně) nízká.									
Poznámka											

4A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **modální**	26,1	BK 30–36, JD 32–36, KL 30–36	KAse‘, RNke‘, RNme‘, KAvs‘	hp–ph; k	slínovec, jílovec, pískovec	kamenité svahy, hřbety	(0–)10–35(–45)	různá	420–600 (–640)	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DBL 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR, TS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											
4A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **chudší**	44,3	BK 28–36, JD 30–36, KL 28–36	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp–ph; k	pískovec, jílovec	kamenité svahy, hřbety	(0–)10–45	různá	(420–)480–720	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DBL 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR, TS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											
4A9	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **specifická – vápencová**	13,8	BK 26–34, JD 28–36, KL 26–34	RZm, RZk, RZv, KAvs‘	hp–ph; k	vápenec	hřbety	(5–)22–40	slunná	440–560	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, JS, JLH, DBL, JD, HB, TR, TS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

5A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **modální**	26,8	BK 30–36, JD 32–36, KL 30–36, SM 34–38	KAse‘(a‘), KAvs‘e‘(a‘), RNke‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–ph; k	slínovec, jílovec, pískovec	hřbety, kamenité svahy	0–45+	různá	(560–)600–860(–920)	BK 5–7, JD 1–3, KL 1–3, JLH 1, LP, JS, JVM, TS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

3J

3J9	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **specifická – roklinová**	20,9	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	RNme‘(a‘), RNte‘(a‘), KAse‘(a‘)	(hp); k	jílovec, pískovec, slínovec, suť	rokle	0–35 (–45)	různá	360–580 (–620)	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DBL 1, JD, HB, JS, JLH, TS
	Bylinné patro (30–50 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Geranium robertianum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Polystichum aculeatum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

5J

5J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **modální**	6,2	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	RNme‘(a‘), RNse‘(a‘), RNte‘(a‘), LIme‘(a‘)	hp–ph; k, b	jílovec, pískovec, slínovec, suť	balvanité a skalnaté svahy	10–45	slunná	680–860 (–900)	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH 1–3, JS, LP, SM, TS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5J9	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **specifická – roklinová**	27,9	BK 30–34, JD 32–36, KL 30–34, SM 34–38	RNme'(a'), RNse'(a'), RNte'(a')	hp–ph; k, b	jílovec, pískovec, slínovec, suť	rokle	0–45+	převážně stinná	500–840 (–940)	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH 1–3, JS, LP, SM, TS
	Bylinné patro (30–50 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Geranium robertianum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Polystichum aculeatum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

6J

6J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOSMRKOVÁ JAVOŘINA **modální**	0,1	BK 28–30, JD 30–34, KL 28–30, SM 32–36	RNme'(a'), RNse'(a'), RNte'(a'), LIme'(a')	(hp); k, b	pískovec, jílovec, (slínovec), suť	balvanité osypy	22–30	slunná	920–960	KL 1–3, BK 1–3, JD 1–3, SM 1–3, JLH 1, JS, TS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

2L

2L9	PAHORKATINNÝ LUH **specifický – štěrkopískový**	2,6	DBL 30–36, JD 32–36, JS 30–36, OL 24–30, SM 34–38	FLye', FLme'(g')	p–hp; (š)	holocénní fluviální štěrkopísek	říční nivy a terasy	0–5	—	300–440	DBL 3–5, LP 1–2, JV 1–2, JS 1–2, JL 1, HB, OL, VR
	Bylinné patro ((30)50–70(90) %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Salvia glutinosa*, *Stachys sylvatica*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3L

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3L1	JASANOOLŠOVÝ LUH **modální**	99,6	JD 32–36, JS 30–36, OL 24–30, SM 34–38	FLme‘(a‘), FLye‘(a‘), FLge‘(a‘), (GLfe‘(a‘))	ph	holocénní fluviální hlína	potoční nivy	0–5	—	(300–)340–540(–620)	OL 5–7, JS 1–3, JV, DBL, JLH
	Bylinné patro (50–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Oxalis acetosella*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3L9	JASANOOLŠOVÝ LUH **specifický – prameništní**	25,0	JD 32–36, JS 30–36, OL 22–30, SM 34–38	GLme‘(a‘), GLqe‘(a‘), GLra‘	ph–h	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	prameniště, úžlabiny, terénní sníženiny	0–15	—	(300–)400–620	OL 5–7, JS 1–3, JV, DBL, JLH
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

4L

4L1	PODHORSKÝ LUH **modální**	4,8	JS 28–34, KL 26–32, OLS 22–26	FLya‘, (FLra‘, GLfa‘)	p–hp; k	holocénní fluviální štěrk, písek	říční nivy a terasy	0–5	—	400–560	KL 1–3, OLS 1–3, STR 1–3, JS 1, VR 1, LP 1, JLH, VRE, VRT
	Bylinné patro ((30)50–70(90) %):	*Aegopodium podagraria*, *Aruncus dioicus*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

5L

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5L1	MONTÁNNÍ (JASANO) OLŠOVÝ LUH **modální**	243,5	JD 32–36, JS 30–36, OL 24–30, SM 34–38	FLma‘, FLya‘, FLga‘, (GLfa‘)	ph	holocénní fluviální hlína	potoční nivy	0–5	—	(420–)480–680(–760)	OL 7–9, JS 1–3, SM, KL, JD, JLH
	Bylinné patro (50–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5L9	MONTÁNNÍ (JASANO) OLŠOVÝ LUH **specifický – prameništní**	38,6	JD 30–36, JS 28–36, OL 22–28, SM 32–38	GLma‘(s‘), GLqa‘	hp–h	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	prameniště, úžlabiny, terénní sníženiny	0–15	—	(480–)520–880(–940)	OL 7–9, JS 1–3, SM, KL, JD, JLH
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Doronicum austriacum*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula sylvatica*, *Stachys sylvatica*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Mnium hornum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

6L

6L1	LUH OLŠE ŠEDÉ **modální**	2,4	OLS 20–26, SM 26–30	FLya‘	hp; k	holocénní fluviální zahliněný štěrkopísek	potoční nivy	0–5	—	600–1000	OLS 7–9, SM 1–3, KL, OS, BR, JS, OL, JR, JD, JIV
	Bylinné patro ((30)50–70(90) %):	*Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Circaea alpina*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Luzula sylvatica*, *Petasites albus*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3U

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3U1	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **modální**	301,1	BK 32–36, JD 34–36, JS 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAmg‘e‘, KAge‘, FLme‘, (GLf(m)e‘)	hp–ph; (š)	pískovec, jílovec, slínovec, fluviálně-deluviální hlína	úžlabiny	0–30 (–45+)	různá	(300–)340–600(–760)	JS 3–5, JV 1–3, DBL 1–3, BK 1–3, JD, OL, JLH, LP, HB
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Actaea spicata*, *Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3U5	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **vlhčí**	13,9	JD 34–36, JS 34–36, KL 32–36, SM 36–38	FLge‘, KAge‘, GLfe‘	ph–h; (š)	deluviálně-fluviální hlína, (pískovec, jílovec, slínovec)	údolí, potoční nivy, úžlabiny	0–15	různá	420–580 (–620)	JS 3–5, OL 1–3, JV 1–3, DBL 1–3, BK, JD, JLH, LP, HB
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3U

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3U7	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **skeletnatější**	197,9	BK 32–36, JD 34–36, JS 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAsg‘e‘, KAgs‘e‘, FLm(y)e‘, (GLfe‘(s‘))	hp–ph; k	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	kamenité zářízнuté úžlabiny	0–30 (–45)	různá	(340–)400–600(–660)	JS 3–5, JV 1–3, DBL 1–3, BK 1–3, JLH, JD, LP, HB, OL, TS
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Circaea alpina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

5U

5U1	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **modální**	98,5	BK 28–36, JD 30–36, JS 30–36, KL 28–36, SM 32–38	KAmg‘e‘, KAge‘, FLm(y)e‘, (GLf(m)e‘)	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, fluviálně-deluviální hlína	úžlabiny	0–30 (–45)	převážně slunná	(420–)500–840(–940)	JV 1–3, JS 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH, SM, LP, OL
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Actaea spicata*, *Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula sylvatica*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5U5	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **vlhčí**	398,3	JD 34–36, JS 34–36, KL 32–36, SM 36–38	FLge‘, KAge‘, GLfe‘	hp–h; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, deluviálně-fluviální hlína	úžlabiny, potoční nivy	0–15	různá	(480–)540–820(–1040)	JV 1–3, JS 1–3, OL 1–3, BK, JLH, LP, JD, SM
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5U7	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **skeletnatější**	842,2	BK 26–36, JD 28–36, JS 28–36, KL 26–36, SM 30–38	KAsg‘e‘, KAgs‘e‘, FLm(y)e‘	hp–ph; k	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	kamenité zaříznuté úžlabiny	0–35 (–45+)	různá	(420–)520–860(–1120)	JV 1–3, JS 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH, SM, LP, OL, TS
	Bylinné patro ((30)50–70(90) %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Circaea alpina*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lunaria rediviva*, *Luzula sylvatica*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3V1	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	1,8	BK 32–36, JD 34–36, JS 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAga‘(e‘), LUga‘(e‘), PGla‘	hp–ph; (š)	pískovec, jílovec, deluviální hlína	úlabiny, terénní sníženiny	0–22	převážně slunná	320–500	BK 3–5, DBL 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, OL, HB
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

4V

4V1	VLHKÁ BUČINA **modální**	250,5	BK 32–36, JD 34–36, JS 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘)	ph–h; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	úžlabiny, terénní sníženiny	0–22	převážně stinná	(360–)420–600(–720)	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OL
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4V2	VLHKÁ BUČINA **chudší**	0,2	BK 28–36, JD 30–36, JS 30–36, KL 28–36, SM 32–38	KAga‘, KAqa, (GLka‘)	ph–h; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	úžlabiny, terénní sníženiny	0–22	převážně slunná	460–600	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OL
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											
4V3	VLHKÁ BUČINA **bohatší**	9,9	BK 32–36, JD 34–36, JS 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAge‘(a‘), KAqe‘(a‘), GLke‘(a‘)	ph–h; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	úžlabiny, terénní sníženiny	0–22	různá	420–580 (–620)	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OL
	Bylinné patro (50–70(90) %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											
4V7	VLHKÁ BUČINA **skeletnatější**	6,0	BK 28–36, JD 30–36, JS 30–36, KL 28–36, SM 32–38	KAgs‘a‘(e‘), KAqs‘a‘(e‘)	ph–h; k	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	kamenité úžlabiny	(0–)10–22	různá	(420–)460–620	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OL
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Circaea alpina*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria nemorum*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4V9	VLHKÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	1,3	JD 32–36, JS 32–36, KL 30–36, SM 34–38	GLma‘, GLka‘, (KAqa‘, PGqa‘)	ph–h; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	prameniště, úžlabiny, terénní sníženiny	0–22	slunná	500–600	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1–3, OL, JS, JV, JLH, LP
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Caltha palustris*, *Carex remota*, *Deschampsia cespitosa*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Petasites albus*, *Stachys sylvatica*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

5V

5V1	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	633,9	BK 32–36, JD 34–36, JS 34–36, KL 32–36, SM 36–38	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘)	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	úžlabiny, terénní sníženiny	0–22	převážně stinná	(460–)580–820(–980)	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OL, SM
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Dentaria glandulosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

5V2	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	28,0	BK 28–36, JD 30–36, JS 30–36, KL 28–36, SM 32–38	KAga‘, KAqa, (GLka‘)	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	úžlabiny, terénní sníženiny	(0–)10–22	převážně slunná	(500–)580–880(–960)	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OL, SM
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5V7	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	57,3	BK 28–36, JD 30–36, JS 30–36, KL 28–36, SM 32–38	KAgs‘a‘(e‘), KAqs‘a‘(e‘)	hp–ph; k	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	kamenité úžlabiny	(0–)10–22	různá	(480–)560–860(–920)	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OL, SM
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Circaea alpina*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Salvia glutinosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

5V9	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	10,7	JD 32–36, JS 32–36, KL 30–36, SM 34–38	GLma‘, GLka‘, (KAqa‘)	hp–h; (k)	pískovec, jílovec, slínovec, deluviální hlína	prameniště, úžlabiny, terénní sníženiny	0–22	různá	(580–)620–880(–920)	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, OL 1, SM, JS, JLH, LP, JVM
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Caltha palustris*, *Carex remota*, *Deschampsia cespitosa*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Petasites albus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

6V

6V1	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	3,4	BK 28–36, JD 30–36, JS 30–36, KL 28–36, SM 32–38	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, (slínovec), deluviální hlína	úžlabiny	10–22	slunná	(800–)840–1060(–1120)	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL 1–3, JS, JLH, OL
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6V2	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	6,6	BK 26–34, JD 28–36, KL 26–34, SM 30–38	KPg, KAgd'm', KAqd'm', (GLkd'm')	hp–ph; (k)	pískovec, jílovec, deluviální hlína	úžlabiny	0–22	různá	(580–)620–980(–1060)	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL 1–3, JS, JLH, OL
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis villosa*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

6V7	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější**	59,5	BK 26–36, JD 28–36, JS 30–36, KL 26–36, SM 30–38	KAgs'd'm', KAqs'd'm'	hp–ph; k	pískovec, jílovec, (slínovec), deluviální hlína	kamenité úžlabiny	0–22	převážně stinná	(500–)540–1020(–1140)	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL 1–3, JS, JLH, OL
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis villosa*, *Circaea alpina*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

6V9	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	5,0	BK 26–36, JD 28–36, JS 30–36, KL 26–36, SM 30–38	GLmd'm'(o'), GLkd'm'(o')	hp–h; (k)	pískovec, jílovec, (slínovec), deluviální hlína	prameniště, úžlabiny, terénní sníženiny	0–22	stinná	820–1000	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL, OL, JS, JLH
	Bylinné patro ((30)50–70 %):	*Caltha palustris*, *Carex remota*, *Deschampsia cespitosa*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Petasites albus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

7V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
7V7	VLHKÁ BUKOVÁ SMRČINA **skeletnatější**	1,2	BK 20–26, JD 22–28, KL 16–24, SM 24–30	KPgs‘, KPsg‘	hp–h; k	písковec, deluviální hlína	kamenité úžlabiny	(22–30)	stinná	920–1220	SM 5–7, JD 1–3, BK 1–3, KL 1, JR, OL
	Bylinné patro (50–70 %):	*Aruncus dioicus*, *Athyrium distentifolium*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis villosa*, *Circaea alpina*, *Doronicum austriacum*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Gentiana asclepiadea*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Barbilophozia lycopodioides*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

4O

4O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	348,8	BK 28–34, JD 32–36, KL 28–34, SM 34–38	KAga‘, PGma‘, PGka‘, PGla‘	ph–h	jílovec, slínovec, písковec, sprašová hlína, překryv hlinitého sedimentu	mírné svahy, úžlabiny	0–15	různá	(300–)360–560(–620)	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5O

5O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ (BUKOVÁ) JEDLINA **modální**	1719,0	BK 28–32, JD 32–36, KL 28–32, SM 34–38	PGma‘, PGka‘, KAga‘	hp–ph	jílovec, slínovec, písковec, překryv hlinitého sedimentu	plošiny, úžlabiny, mírné svahy	0–15	různá	(500–)540–800(–900)	JD 5–7, BK 1–3, SM, OS, LP
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

6O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	13,6	BK 26–30, JD 32–36, KL 26–30, SM 34–38	PGmd‘m‘, PGkd‘m‘, KAgd‘m‘, KPg	hp–ph	jílovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	mírné svahy, úžlabiny	0–15	různá	(680–)720–980(–1020)	JD 3–5, BK 1–3, SM 1–3, OS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Luzula sylvatica*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

4P

4P1	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	66,9	BK 24–32, JD 32–36, SM 34–38	PGd, PGqd	ph–h	jílovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	mírné svahy, plošiny	0–15	různá	420–600	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1, SM, BR, OS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5P

5P1	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **modální**	0,4	BK 26–30, JD 32–36, SM 34–38	PGd, PGqd	hp–ph	jílovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	plošiny, úžlabiny, mírné svahy	0–10	stinná	640–740	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BR, OS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopodium annotinum*, *Maianthemum bifolium*, *Phegopteris connectilis*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum scoparium*, *Lepidozia reptans*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Tetraphis pellucida*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

6P

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6P1	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	275,5	BK 22–28, JD 30–36, SM 32–38	PGdu‘z‘, PGqdo‘z‘	hp–ph	jílovec, pískovec, překryv hlinitého sedimentu	mírné svahy, úžlabiny	0–10	různá	500–860 (–940)	JD 5–7, SM 3–5, BK 1, BR, OS
	Bylinné patro (30–50(70) %):	*Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopodium annotinum*, *Maianthemum bifolium*, *Phegopteris connectilis*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum scoparium*, *Lepidozia reptans*, *Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Tetraphis pellucida*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

4G

4G1	GLEJOVÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	9,1	JD 32–36, OL 24–30, SM 34–38	GLma‘	ph–h	pískovec, jílovec, slínovec, hlinitý sediment	terénní sníženiny, údolí, prameniště	0–15	stinná	440–580 (–620)	JD 5–7, DBL 3–5, OL 1, SM, OS, BR, BK
	Bylinné patro (50–70 %):	*Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5G

5G1	GLEJOVÁ JEDLINA **modální**	17,8	JD 32–36, OL 24–30, SM 34–38	GLma‘, SGma‘	hp–h	pískovec, jílovec, slínovec, hlinitý sediment	terénní sníženiny, prameniště	0–15	různá	(520–)580–840(–880)	JD 5–7, SM 1–3, OL 1, BK, OS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Mnium hornum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5G2	GLEJOVÁ JEDLINA **chudší**	8,2	JD 32–36, OL 24–28, SM 34–38	GLma‘(o‘), SGma‘(o‘)	hp–h	pískovec, jílovec, hlinitý sediment	terénní sníženiny, prameniště	0–15	převážně slunná	520–900	JD 5–7, SM 1–3, OL 1, BK, OS
	Bylinné patro (50–70 %):	*Calamagrostis villosa*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Lepidozia reptans*, *Mnium hornum*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Tetraphis pellucida*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

6G

6G1	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	96,5	JD 30–36, OL 24–28, SM 32–38	GLma‘(o‘), SGma‘(o‘)	hp–h	pískovec, jílovec, hlinitý sediment	terénní sníženiny, prameniště	0–15	různá	(500–)540–920(–980)	JD 3–5, SM 3–5, OLS 1, OL, OS, BK
	Bylinné patro (50–70 %):	*Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Mnium hornum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

6G2	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA **chudší**	7,3	JD 30–36, OL 22–26, SM 32–38	GLma‘(u‘)(o‘), SGma‘(u‘)(o‘)	hp–h	pískovec, jílovec, hlinitý sediment	terénní sníženiny, prameniště	0–15	různá	580–900	JD 3–5, SM 3–5, OLS 1, OL, OS, BK
	Bylinné patro (50–70 %):	*Calamagrostis villosa*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Lepidozia reptans*, *Mnium hornum*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Tetraphis pellucida*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

7G

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
7G2	GLEJOVÁ JEDLOVÁ SMRČINA **chudší**	0,3	JD 22–26, SM 24–30	GLod‘, GLmo‘(u‘), SGod‘, SGmo‘(u‘)	hp–h	pískovec, hlinitý sediment	terénní sníženiny, prameniště	0–15	slunná	1120–1160	SM 7–9, JD 1–3, OLS 1, JR, OL
	Bylinné patro (50–70 %):	*Calamagrostis villosa*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Lepidozia reptans*, *Mnium hornum*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Tetraphis pellucida*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

7T

7T1	GLEJOVÁ CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA **modální**	1,3	JD 20–24, SM 22–28	GLoz‘, GLmo‘	hp–h	pískovec, hlinitý sediment	terénní sníženiny	0–15	slunná	800–860	SM 7–9, JD 1–3, OLS, JR
	Bylinné patro (10–30 %):	*Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopodium annotinum*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Dicranum scoparium*, *Lepidozia reptans*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

6R

6R1	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ SMRČINA **modální**	9,1	SM 26–32	ORme, ORqmem‘	org, (hp–ph)	organický sediment	plošiny, úžlabiny	0–5	převážně plošina	500–980	SM 7–9, OLS 1, OS, OL, JD
	Bylinné patro (10–30 %):	*Blechnum spicant*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopodium annotinum*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Dicranum scoparium*, *Lepidozia reptans*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

POUŽITÉ ZKRATKY A JMÉNA DŘEVIN:

ZKRATKA	ČESKÉ JMÉNO	VĚDECKÉ JMÉNO
SM	smrk ztepilý	***Picea abies*** (L.) H. Karst.
JD	jedle bělokorá	***Abies alba*** Mill.
BO	borovice lesní	***Pinus sylvestris*** L.
BOR	borovice vystoupavá rašelinná	***Pinus ×ascendens*** Businský **nothosubsp. *skalickyi*** Businský
KOS	borovice kleč	***Pinus mugo*** Turra
BL	borovice pyrenejská blatka	***Pinus uncinata*** Ramond ex DC. **subsp. *uliginosa*** (G. E. Neumann) Businský
MD	modřín opadavý	***Larix decidua*** Mill**.**
TS	tis červený	***Taxus baccata*** L.
DB	dub letní a okruh dubu zimního	***Quercus robur*** L. + ***Q. petraea*** **agg.**
DBL	dub letní	***Quercus robur*** L.
DBZ	dub zimní, okruh blízce příbuzných druhů	***Quercus petraea*** **agg.**
DBP	dub pýřitý, okruh blízce příbuzných druhů	***Quercus pubescens*** **agg.**
CER	dub cer	***Quercus cerris*** L.
BK	buk lesní	***Fagus sylvatica*** L.
HB	habr obecný	***Carpinus betulus*** L.
JV	javor mléč a j. klen	***Acer platanoides*** L. + ***A. pseudoplatanus*** L.
JVM	javor mléč	***Acer platanoides*** L.
KL	javor klen	***Acer pseudoplatanus*** L.
BB	javor babyka	***Acer campestre*** L.
JS	jasan ztepilý	***Fraxinus excelsior*** L.
JSU	jasan úzkolistý podunajský	***Fraxinus angustifolia*** Vahl **subsp. *danubialis*** Pouzar
JL	jilm drsný, j. habrolistý a j. vaz	***Ulmus glabra*** Huds. + ***U. minor*** Mill. + ***Ulmus laevis*** Pall.
JLM	jilm habrolistý	***Ulmus minor*** Mill.
JLH	jilm drsný	***Ulmus glabra*** Huds.
JLV	jilm vaz	***Ulmus laevis*** Pall.
BR	bříza bělokorá	***Betula pendula*** Roth
BRP	bříza pýřitá nebo bříza karpatská	***Betula pubescens*** Ehrh**.** / ***Betula carpatica*** Waldst. et Kit. ex Willd.
JR	jeřáb ptačí	***Sorbus aucuparia*** L.
BRK	jeřáb břek	***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz
MK	jeřáb muk, okruh blízce příbuzných druhů	***Sorbus aria*** **agg.**
TR	třešeň ptačí	***Prunus avium*** (L.) L.
STR	střemcha obecná	***Prunus padus*** L.
LP	lípa srdčitá a l. velkolistá	***Tilia cordata*** Mill. + ***T. platyphyllos*** Scop.
LPM	lípa srdčitá (l. malolistá)	***Tilia cordata*** Mill.
OL	olše lepkavá	***Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn.
OLS	olše šedá	***Alnus incana*** (L.) Moench
OS	topol osika	***Populus tremula*** L.
TPB	topol bílý	***Populus alba*** L.
TPC	topol černý	***Populus nigra*** L.
JIV	vrba jíva	***Salix caprea*** L.

ZKRATKA	ČESKÉ JMÉNO	VĚDECKÉ JMÉNO
VR	vrba bílá, v. křehká a jejich kříženec	***Salix alba*** L. + ***S. euxina*** L. V. Belyaeva + ***S.*** ×***rubens*** Schrank
VRD	vrba dvoubarvá	***Salix bicolor*** Willd.
VRE	vrba šedá	***Salix elaeagnos*** Scop.
VRN	vrba nachová	***Salix purpurea*** L.
VRS	vrba slezská	***Salix silesiaca*** Willd.
VRT	vrba trojmužná	***Salix triandra*** L.

Česká a vědecká jména dřevin a vymezení druhových agregátů (agg.) odpovídá Seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka et al. 2012).

SYNUZIE PODROSTU

Synuzie podrostu představuje abecedně seřazený výpis druhů bylinného a mechového patra charakteristický pro konkrétní lesní typ. Výběr charakteristických druhů byl vytvořen na základě empirického rozboru lesnicko-typologických zápisů, které byly pořízeny v porostech s dřevinnou skladbou blízkou skladbě potenciálně přirozené, tj. přibližně odpovídající stupni přirozenosti 4–6 (Macků 2012). Většina synuzií podrostu byla převzata z charakteristik oblastních plánu rozvoje lesů I (1997–2001) a expertně revidována. V souvislosti s revizemi lesnicko-typologických map a úpravou Lesnicko-typologického klasifikačního sytému byl pro některé lesní typy vytvořen výpis charakteristických druhů synuzie podrostu zcela nový.

Taxonomické pojetí a nomenklatura druhů a poddruhů byla sjednocena podle národních seznamů cévnatých rostlin (Danihelka et al. 2012), mechorostů (Kučera et al. 2012) a lišejníků (Liška et al. 2008). Taxonomicky komplikované skupiny druhů nebo druhy, u kterých lze očekávat častější výskyt chyb při determinaci (např. Molinia arundinacea a M. caerulea), byly sloučeny do širších pojetí. V případě bylinného patra byly využity zejména agregáty (zkratka agg.) jednoznačně vymezené v Seznamu cévnatých rostlin České republiky (Danihlelka et al. 2012). Výjimku tvoří lesní ostružiníky, které nejsou řazeny pod Rubus fruticosus agg., ale přímo do vnitrorodového taxonu Rubus sect. Rubus. U mechorostů, lišejníků a v omezené míře také u cévnatých rostlin bylo využito obecnějšího vymezení druhových skupin s pomocí zkratky „s. l.“ (viz níže). Vymezení těchto druhových skupin bylo převzato z Vegetace České republiky 4: Lesní a křovinná vegetace (Chytrý 2013). Pokud bylo možné jednoznačně odvodit konkrétní druh z širšího pojetí (např. z Anthoxanthum odoratum agg. v nižších polohách Anthoxanthum odoratum s. str.) nebo se alespoň dal předpokládat jeho častější výskyt v daném lesním typu (např. specifikem přírodní lesní oblasti), byl druh uveden samostatně nebo v závorce za zmiňovanou šířeji pojatou skupinou. Zejména jedinci mechů z rodu rašeliník (Sphagnum) a lišejníků z rodu dutohlávka (Cladonia) jsou při fytocenologickém popisu vegetace často určovány pouze na úroveň rodu, přesto i nejednoznačná informace o jejich prezenci je indikačně významná. Proto, pokud nejsou zmiňovány konkrétní druhy, následuje v těchto případech za rodovým jménem zkratka „sp. div.“, tj. ve smyslu přítomnosti více možných druhů rodu (nikoliv všech).

Do mechového patra jsou kromě mechorostů tradičně řazeny také lišejníky. Ve výpisu charakteristických druhů jsou uvedeny vždy po mechorostech za středníkem. Ačkoliv je pokryvnost mechového patra u řady lesních typů významným determinačním znakem (vysokou pokryvnost mívají zejména kyselá, živinami chudá a jinou než srážkovou vodou ovlivněná stanoviště), nebyla v podkladových materiálech uváděna konzistentně, a tudíž není zmiňována. Nicméně u lesních typů, kde jsou jednotlivé druhy (taxony) mechového patra uváděny, lze pokryvnost předpokládat vyšší.

Zkratky používané v synuziích podrostu:

agg. ageregát (latinsky *aggregate*)

s. l. v širším smyslu, v širším pojetí (latinsky *sensu lato*)

s. str. v užším smyslu, v užším pojetí (latinsky *sensu stricto*)

sp. div. různé druhy rodu (latinsky *species diversae*)

subsp. poddruh (latinsky *subspecie*)

Literatura:

Danihelka, J., Chrtek, J. jun. & Kaplan, Z.: *Checklist of vascular plants of the Czech* Republic. Preslia 84, s. 647–811, 2012.

Kučera, J., Váňa, J. & Hradílek, Z.: *Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis.* Preslia 84, s. 813–850, 2012.

Liška, J., Palice, Z. & Slavíková, Š.: *Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic.* Preslia 80, s. 151–182, 2008.

Macků, J.: *Methodology for establishing the degree of naturalness of forest stands.* Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, 5, s. 161–166, 2012.

RELIÉF, SKLON, EXPOZICE A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Charakteristiky sklon, expozice a nadmořská výška byly získány analýzou aktuálních lesnicko-typologických map. Rozpětí hodnot představuje interval mezi 5. a 95. percentilem. V závorce jsou uvedeny revidované krajní hodnoty, které přesáhly mezipercentilové rozpětí o více než 20 m u nadmořské výšky a 5° u sklonu.

Svahy se sklonem 5–10° jsou v reliéfu označeny jako mírné, se sklonem 10–22° jako střední, se sklonem 22–45° jako příkré a se sklonem > 45° jako strmé (srázné). Roviny a plošiny mají sklon 0–5°.

PŮDY

PŮDNÍ TYP

(velkými písmeny)

LI	litozem
RN	ranker
RZ	rendzina
PR	pararendzina
RG	regozem
FL	fluvizem
KO	koluvizem
SM	smonice
CE	černozem
CC	černice
SE	šedozem
HN	hnědozem
LU	luvizem
KA	kambizem
PE	pelozem
AD	andozem
KP	kryptopodzol
PZ	podzol
PG	pseudoglej
SG	stagnoglej
GL	glej
SR	solončak
SC	slanec
OR	organozem
KU	kultizem
AN	antropozem

subtyp

(malými písmeny)

a	antropický
an	andický (KA)
c	karbonátový
d	dystrický
e	povrchový (GL)
f	fluvický
fi	fibrický (OR)
g	oglejený
h	humusový (PZ)
h	humolitový (OR)
hr	hořečnatý (LI)
i	stratifikovaný (FL)
j	chromický (rubifikovaný)
k	kambický
l	luvický
m	modální
me	mezický (OR)
n	melanický
o	histický
p	pelický
pl	planický
q	glejový
q	akvický (GL)
r	arenický
s	suťový
s	rankerový
sa	saprický (OR)
su	sulfidický
t	litický
u	umbrický
v	vyluhovaný
ve	vertický (CE)
w	hydroeluviovaný
x	černický (CE)
y	psefitický
z	podzolový (RN)

subtypy kultizemě KU:

ho	hortická
ky	kypřená
ri	rigolovaná

subtypy antropozemě AN:

g	oglejená
h	humózní
hh	hlubokohumózní
in	intoxikovaná
ko	kontaminovaná
p	pelická
pk	překrytá
q	glejová
r	arenická
re	redukovaná
sk	skeletovitá
sp	spolická
su	sulfidická
te	terasovaná
ur	urbická

varieta

(malými písmeny s apostrofem)

a‘	mezobazická
b‘	eutrofní
c‘	slabě karbonátová
d‘	oligobazická
e‘	eubazická
g‘	slabě (hluboko) oglejená
h‘	humózní
k‘	kaolinitická
l‘	slabě luvická (KA)
n‘	mělce melanická
o‘	zrašelinělá
q‘	hluboko glejová
s‘	silně skeletovitá
u‘	mělce umbrická
v‘	slabě vyluhovaná
w‘	slabě hydroeluviovaná
x‘	hořečnatá
y‘	ortštejnová (PZ)
z‘	podzolovaná
z‘	železitá (PZ)

subvarieta

d‘	oligotrofní
m‘	mezotrofní

akumulační fáze

i‘	akumulovaná
w‘	erodovaná
y‘	překrytá

půdní druh

p	písčitá (půda)
hp	hlinitopísčitá
ph	písčitohlinitá
h	hlinitá
jh	jílovitohlinitá
j	jílovitá, (jíl)
jp	jílnatý písek
jhp	jílnatohlinitý písek
org	organická

SKELET

hrp	hrubý písek (2–4 mm)
š	štěrk (4–30 mm)
k	kameny (30–300 mm)
b	balvany (> 300 mm)
kh	kompaktní hornina (skála)

SKELETNATOST (příklad zápisu)

hp–ph	hlinitopísčitá až písčitohlinitá, 0–10 % skeletu
hp, (k)	hlinitopísčitá, 10–50 % kamene
ph, k	písčitohlinitá, 50–80 % kamene
(ph), k	kamenitá (> 80 % kamene) s písčitohlinitou výplní

Nomenklatura půdních jednotek je uvedena podle:

Němeček, J. et al.: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha: ČZU, 2011;

Vokoun, J. et al.: Příručka pro průzkum lesních půd (Taxonomický klasifikační systém půd ČR v lesnické praxi). Interní text, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2003.