Příloha č. 4 Charakteristiky lesních typů

1X

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
1X0	BAZICKÁ ZAKRSLÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,3	DBZ -16	ANsk	ph; k, kh	terciérní bazaltoid (bazanit) (lom)	mírné – příkré svahy	0–45	slunná	360–400	DBZ 5–7, DBP 1–3, HB 1, LP 1, JVM 1, BB, BRK
	Bylinné patro (0–30 %):	*Astragalus glycyphyllos*, *Brachypodium pinnatum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Clinopodium vulgare*, *Fragaria moschata*, *Melampyrum nemorosum*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	—									
Poznámka											

4X

4X0	BAZICKÁ ZAKRSLÁ BUČINA **antropogenní**	2,8	BK 12–18, BO 12–18	LIca‘(e‘), RZt, RZs, ANsk	(ph–h); b–kh	krystalický vápenec, dolomitický krystalický vápenec (odval, lom)	skalnaté hrany lomů	0–45+	převážně slunná	500–700	BK 7–9, DB 1, LP 1, JV, JLM, JS, JD, MK, TS
	Bylinné patro (0–30 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Fragaria vesca*, *Galium odoratum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melica nutans*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	—									
Poznámka											

0Z

0Z0	ZAKRSLÝ BOR **antropogenní**	0,2	BO -12	LImd‘, ANsk	(p); kh	křídový křemenný pískovec (lom)	skalnaté hrany lomů	0–45+	převážně slunná	360–400	BO 7–9, DBZ 1–3, BR 1, BK, SM, JR
	Bylinné patro (0–30 %):	*Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l.; *Cetraria islandica*, *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
0Z2	ZAKRSLÝ BOR **modální (na pískovcích)**	29,2	BO -12	LImd‘, (RGy, RNtz)	(p); kh	křídový křemenný pískovec	skalnaté hřbety, příkré – strmé svahy	0–45+	převážně slunná	(260–)320–600(–660)	BO 7–9, DBZ 1–3, BR 1, BK, SM, JR
	Bylinné patro (0–30 %):	*Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l.; *Cetraria islandica*, *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

0Z4	ZAKRSLÝ BOR **„bonitnější“**	36,4	BO 14–18	LImd‘, RNtz, PZtr, (RGr)	(p–hp); b–kh	křemenný pískovec, fylit	balvanité a skalnaté hřbety, vrcholové plošiny	0–45	převážně slunná	(260–)320–600(–660)	BO 7–9, DBZ 1–3, BR 1, BK, SM, JR
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l.; *Cetraria islandica*, *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

3Z

3Z1	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	5,0	BK 16, DB 16, BO 18	KAsd, RNkd‘	hp–ph; k	fylit, svor, ryolit, ryolitový ignimbrit	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, svahy	0–45+	převážně slunná	340–520	BK 5–7, DB 3–5, BR 1, BO
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											

3Z2	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	10,5	BK 14, DB 14, BO 16	PZs, RNd, RNz	hp; k	fylit, svor	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, konvexní svahy	0–45+	převážně slunná	340–520	BK 5–7, DB 3–5, BR 1, BO
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3Z3	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	14,6	BK 18, DB 18, BO 18	KAsa‘, RNma‘, RNka‘	hp–ph; k	zelená břidlice, fylit, svor, bazaltandezit	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, svahy	0–45+	převážně slunná	340–520	BK 5–7, DB 3–5, BR 1, BO
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Euphorbia cyparissias*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*, *Veronica chamaedrys*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div.									
Poznámka											

4Z

4Z0	ZAKRSLÁ BUČINA **antropogenní**	2,8	BK 16–18, BO 18	LIma‘(e‘), ANsk	(ph); b–kh	terciérní bazaltoid (bazanit) (halda, odval, lom)	hrany lomů, odvaly	0–45+	převážně slunná	420–600	BK 5–7, DB 1, BR 1, JD, BO
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											

4Z2	ZAKRSLÁ BUČINA **chudší**	6,9	BK 16–18, BO 18	PZs, RNd, RNz	hp; k	fylit, svor	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, konvexní svahy	0–45+	převážně slunná	420–600	BK 5–7, DB 1, BR 1, JD, BO
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4Z3	ZAKRSLÁ BUČINA **bohatší**	26,9	BK 16–18, BO 18	KAsa‘, RNma‘, RNka‘	hp–ph; k	zelená břidlice, bazaltandezit, terciérní bazaltoid (bazanit), fylit	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, svahy	0–45+	převážně slunná	420–600	BK 5–7, DB 1, BR 1, JD, BO
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*, *Prenanthes purpurea*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div.									
Poznámka											

5Z

5Z1	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	2,2	BK 18, SM 16–20	KAsdz‘, RNkd‘z‘	hp; k	fylit, svor, kvarcit	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, svahy	0–45+	převážně slunná	500–720	BK 5–7, JD 1–3, BR 1, BO 1, SM
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Poa nemoralis*, *Solidago virgaurea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5Z2	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	10,7	BK 16, SM 18	PZs, RNd, RNz	hp; k	fylit, svor, kvarcit	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, konvexní svahy	0–45+	převážně slunná	500–720	BK 5–7, JD 1–3, BR 1, BO 1, SM
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5Z3	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	4,2	BK 18, SM 20	KAsa‘, RNma‘, RNka‘	hp–ph; k	zelená břidlice, bazaltandezit, pískovec	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, svahy	0–45+	převážně slunná	500–720	BK 6–8, JD 1–3, (BR, BO) 1
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Campanula rapunculoides*, *Euphorbia cyparissias*, *Hieracium murorum*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*, *Prenanthes purpurea*, *Silene nutans*, *Solidago virgaurea*, *Veronica chamaedrys*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div.									
Poznámka											

5Z7	ZAKRSLÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	12,4	BK 16, SM 18	LImd‘(a‘), RGy, RNtd‘(a‘), RNsd‘(a‘)	hp–ph; b–kh	fylit, svor, zelená břidlice, bazaltandezit	balvanité a skalnaté hřbety, vrcholy, konvexní svahy	0–45+	převážně slunná	500–720	BK 5–7, JD 1–3, BR 1, BO 1, SM
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Euphorbia cyparissias*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6Z

6Z1	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	7,3	BK 16–18, SM 18–20	KPs, PZs, RNz	hp; k	fylit, svor, kvarcit, granit	(skeletnaté) hřbety, vrcholy, svahy	0–45	převážně slunná	550–780 (–820)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR 1, BO 1, JR
	Bylinné patro (50–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Homogyne alpina*, *Prenanthes purpurea*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6Z6	ZAKRSLÁ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější**	15,6	BK 16–18, SM 18–20	LImd‘, RGy, RNtdz‘, RNsdz‘	(hp); b–kh	fylit, svor, kvarcit, rula	balvanité a skalnaté hřbety, vrcholy, konvexní svahy	0–45+	převážně slunná	550–780 (–820)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR 1, BO 1, JR
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Dicranum polysetum*, *Lepidozia reptans*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Plagiothecium undulatum*, *Sphagnum girgensohnii*									
Poznámka											

0Y

0Y1	SKELETOVÝ BOR **modální (dubo-bukový)**	0,2	BO 16–24	LImd‘, RGy, (RNtz, PZtr)	(p); b–kh	křídový křemenný pískovec	balvanité a skalnaté svahy, hřbety	5–45+	různá	420–600	BO 5–7, SM 1–3, BK 1–3, BRP 1–3, DBZ, BR, JR, SM, JD
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*, *Polytrichum juniperinum*; *Cetraria islandica*, *Cladonia rangiferina* s. l.									
Poznámka											

0Y2	SKELETOVÝ BOR **modální (bukový)**	0,1	BO 18–24	LImd‘, RGy, (RNtz, PZtr)	(p); b–kh	křídový křemenný pískovec	balvanité a skalnaté svahy, hřbety	5–45+	různá	420–600	BO 5–7, SM 1–3, BK 1–3, BRP 1–3, DBZ, BR, JR, SM, JD
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Melampyrum pratense*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*, *Polytrichum juniperinum*; *Cetraria islandica*, *Cladonia rangiferina* s. l.									
Poznámka											

3Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3Y0	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	2,5	DB 18–22, BK 18–22, SM, BO 22	LImd‘, LIma‘, RGy, ANsk	(hp); b–kh	pískovec (křemenný, arkózový), andezit (halda, odval, lom)	balvanité a skalnaté hrany lomů, odvaly	5–45+	různá	280–440 (–500)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3Y1	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	26,8	DB 18–22, BK 18–22, SM, BO 22	LImd‘, RGy, RNtd‘, RNsd‘	(p–ph); b–kh	pískovec, prachovec, fylit, svor	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	280–440 (–500)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4Y

4Y0	SKELETOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,9	BK 18–22, SM 22, BO 22	LImd‘, RGy, ANsk	(p); b–kh	pískovec (halda, odval, lom)	balvanité a skalnaté hrany lomů, odvaly	5–45+	různá	350–520 (–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4Y1	SKELETOVÁ BUČINA **modální**	59,5	BK 18–22, SM, BO 22	LImd‘, RGy, RNtd‘, RNsd‘	(p–ph); b–kh	pískovec, arkóza, fylit, svor	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	350–520 (–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4Y3	SKELETOVÁ BUČINA **bohatší**	3,6	DB 20–24, BK 20–24, SM 22–24, BO 22–24	LIma‘, RGy, RNta‘, RNsa‘	(hp–ph); b–kh	pískovec, slepenec, arkóza, prachovec	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	350–520 (–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, LPM, KL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Prenanthes purpurea*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div.									
Poznámka											

5Y

5Y1	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	49,2	SM 20–22, BK 18–22	LImd‘, RGy, RNtd‘, RNsd‘	(p–ph); b–kh	pískovec, fylit, svor, arkóza	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	500–620 (–720)	BK 5–7, JD 1–3, BR 1–3, SM 1–3, BO, KL, LPM
	Bylinné patro (0–30 %):	*Avenella flexuosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6Y1	SKELETOVÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	19,1	SM 20–22, BK 18–22	LImd‘, RGy, RNtdz‘, RNtz	(hp); b–kh	fylit, svor, kvarcit	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	600–800	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR 1, BO 1, JR
	Bylinné patro (0–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Homogyne alpina*, *Polypodium vulgare*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

0M

0M1	CHUDÝ BOR **modální**	185,8	BO 16–20	PZr, (RGrz‘)	p	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	(340–)380–520(–580)	BO 7–9, BR 1, DBZ, BK
	Bylinné patro (0–30 %):	*Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*; *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

0M2	CHUDÝ BOR **chudší**	12,2	BO 14–18	PZr, RGrz‘	p	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy, vypoukliny	0–22	převážně slunná	(340–)380–520(–580)	BO 9–10, BR 1, DBZ
	Bylinné patro (0–30 %):	*Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Pleurozium schreberi*; *Cetraria islandica*, *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

2M

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2M0	CHUDÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	1,2	BK, DBZ 18–20, BO 20–22	ANr	p; (š)	štěrkopísek (pískovna)	opuštěné pískovny	0–22	převážně slunná	260–380	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR 1, JR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											
2M1	CHUDÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	1,3	BK, DBZ 18–20, BO 20–22	KArdz‘, PZr	p; (š–k)	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	260–380	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR 1, JR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

3M

3M0	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	1,7	BK 18–20, DB 18–20, BO 20–22	ANr	p; (š)	křídový křemenný pískovec (navážka)	antropogenní plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	(300–)340–480	BK 5–7, DBZ 3–5, BO 1, BR 1, JD
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3M1	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	409,2	BK 18–20, DB 18–20, BO 20–22	KArdz‘, KAdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	pískovec, arkóza, štěrkopísek, fylit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	(300–)340–480	BK 5–7, DBZ 3–5, BO 1, BR 1, JD
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									
3M1e	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	1,6	"	KArdz‘, PZr	p; (š–k)	křídový křemenný pískovec	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (20–40 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

3M2	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	34,1	BK 18, DB 18, BO 20	KArdz‘, PZr	p; (š–k)	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy, hřbety, kupy	0–20	převážně slunná	(300–)340–480	BK 5–7, DBZ 3–5, BO 1, BR 1, JD
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

3M5	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	132,9	BK 18–20, DB 18–20, BO 20–22	KArdz‘(g‘), PZr(g‘)	p; (š)	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–20	různá	(300–)340–480	BK 5–7, DBZ 3–5, BO 1, BR 1, JD
	Bylinné patro (50–80 %):	*Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

4M

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4M1	CHUDÁ BUČINA **modální**	167,3	BK 20, BO 20–24	KArdz‘, KAdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	pískovec, arkóza, fylit, svor	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	(360–)420–540	BK 5–7, DBZ 1–3, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									
4M1e	CHUDÁ BUČINA **modální – exponovaná**	4,3	"	KArdz‘, PZr	p; (š–k)	pískovec, arkóza	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (20–40 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

4M2	CHUDÁ BUČINA **chudší**	14,5	BK 20, BO 20–22	KArdz‘, PZr	p; (š–k)	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy, hřbety, kupy	0–22	převážně slunná	(360–)420–540	BK 5–7, DBZ 1–3, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

4M5	CHUDÁ BUČINA **vlhčí**	205,1	BK 20, BO 20–24	KArdz‘(g‘), PZr(g‘)	p; (š)	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–20	převážně slunná	(360–)420–540	BK 5–7, DBZ 1–3, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (50–80 %):	*Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

5M

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5M1	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	160,3	BK 20–22, SM 20–22, JD 20–22, BO 22–24	KAdz‘, KArdz‘, PZr	p–hp; (š–k)	fylit, svor, pískovec, arkóza	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	480–680	BK 5–7, JD 3–5, BO 1–3, JD 1, SM 1, BR, JR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5M5	CHUDÁ JEDLOVÁ BUČINA **vlhčí**	1,5	BK 20–22, SM 20–22, JD 20–22, BO 22–24	KArdz‘(g‘), PZr(g‘)	p; (š)	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–20	různá	480–680	BK 5–7, JD 3–5, BO 1–3, JD 1, SM 1, BR, JR
	Bylinné patro (50–80 %):	*Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									

0K

0K0	KYSELÝ BOR **antropogenní**	0,5	BO 18–22	ANr	p	křídový křemenný pískovec (pískovna)	antropogenní plošiny, opuštěné pískovny	0–22	různá	(280–)340–500(–640)	BO 7–9, DBZ 1–3, BK 1–3, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
0K2	KYSELÝ BOR **modální (dubo–bukový)**	178,7	BO 18–22	PZr	p; (k)	křídový křemenný pískovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	(280–)340–500(–640)	BO 7–9, DBZ 1–3, BK 1–3, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

2K

2K1	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	61,1	DBZ 20–22, BO 20–24	KArd, KAd, (KAmd‘)	p–hp; (š–k)	štěrkopísek, pískovec, (odvápněný písčitý slínovec)	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2K2	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	25,8	DBZ 18–22, BO 20–22	KArd(z‘)	p; (š–k)	štěrkopísek, pískovec, spongilit	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2K4	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	15,9	DBZ 18–22, BO 20–22	KArd, KAd, KAmd‘	p–hp; (š–k)	štěrkopísek, pískovec, (odvápněný písčitý slínovec)	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3K

3K0	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	2,2	BK 22–24, DB 20–24, SM 22–26	AN, KAad	p–hp; (š)	pískovec, arkóza, štěrkopísek (navážka)	antropogenní plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3K1	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	3115,7	BK 22–24, DB 20–24, SM 22–26	KArd, KAd, (KAmd', KArd')	p–ph; (š–k)	pískovec, štěrkopísek, fylit, (odvápněný písčitý slínovec)	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
3K1e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	58,2	"	KAd, (KAmd')	hp–ph; (š–k)	fylit, svor	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

3K2	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	1273,0	DB, BK 22, BO 20–24	KArd(z'), KAd(z')	p–hp; (š–k)	pískovec, arkóza, štěrkopísek, fylit	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	320–460	BK 5–7, JD 1–3, BO 1–3, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3K3	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	571,6	BK 22–26, DB 22–24, SM 22–26	KAmd‘, KArd‘, (KArd, KAd)	p–ph; (š–k)	pískovec, štěrkopísek, fylit, (odvápněný písčitý slínovec)	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Athyrium filix-femina*, *Mycelis muralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*)										
3K4	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	39,8	BK 22–24, DB 22–24, BO, SM 22–24	KArd, KAd, KAmd‘, KArd‘	p–ph; (š–k)	pískovec, štěrkopísek, fylit, (odvápněný písčitý slínovec)	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3K7e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	109,2	BK 22–24, DB 22–24, BO, SM 22–24	KArd(s‘), KAd(s‘), (KAmd‘(s‘))	p–ph; (k)	pískovec, arkóza, fylit, (odvápněný písčitý slínovec)	příkré svahy	22+	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K0	KYSELÁ BUČINA **antropogenní**	1,2	BK 22–26, SM 24–26	AN, KAad	p; (š)	pískovec (navážka)	antropogenní plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K1	KYSELÁ BUČINA **modální**	4400,5	BK 22–26, SM 24–26	KArd, KAd, (KAmd‘, KArd‘)	p–ph; (š–k)	pískovec, arkóza, fylit, svor, (odvápněný písčitý slínovec)	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
4K1e	KYSELÁ BUČINA **modální – exponovaná**	176,4	"	KAd, KArd, (KAmd‘, KArd‘)	p–ph; (š–k)	fylit, svor, porfyroid, pískovec, (odvápněný písčitý slínovec)	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (10–60 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K2	KYSELÁ BUČINA **chudší**	664,1	BK 22, BO 22–24, SM 20–22	KArd(z'), KAd(z')	p–ph; (š–k)	pískovec, arkóza, fylit, svor	pošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	380–560	BK 7–9, DB 1–3, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K3	KYSELÁ BUČINA **bohatší**	1677,8	BK 24–26, SM 24–28	KAmd', (KAd)	hp–ph; (š–k)	pískovec, prachovec, fylit, (odvápněný písčitý slínovec)	pošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*									
4K3e	KYSELÁ BUČINA **bohatší – exponovaná**	0,3	"	"	"	pískovec, prachovec	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Athyrium filix-femina*, *Mycelis muralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*)										

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4K4	KYSELÁ BUČINA **sušší**	19,4	BK 20–22, BO, SM 22–24	KArd, KAd, KAmd‘, KArd‘	p–ph; (š–k)	pískovec, prachovec, fylit, (odvápněný písčitý slínovec)	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K7	KYSELÁ BUČINA **skeletnatější**	16,4	BK 22–26, SM 24–26	KArd(s‘), KAd(s‘), (KAmd‘(s‘))	p–ph; (k)	pískovec, slepenec, prachovec, fylit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
4K7e	KYSELÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	86,3	"	"	"	pískovec, arkóza, fylit, (odvápněný písčitý slínovec)	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

5K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5K1	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	3511,9	BK 24–26, SM 24–26, JD 22–24	KAd, (KAmd')	hp–ph; (š–k)	fylit, svor, pískovec, odvápněný písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
5K1e	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	186,0	"	"	hp–ph; (š–k)	fylit, rula, porfyroid, pískovec	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

5K2	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	773,0	BK, JD 20–22, SM, BO 22–24	KAd(z'), KArd(z')	p–ph; (š–k)	fylit, svor, pískovec, kvarcit	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5K3	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	1105,0	BK 24–26, SM 26–28, JD 24–26	KAmd‘, (KAd)	hp–ph; (š–k)	fylit, svor, pískovec, odvápněný písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Athyrium filix-femina*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*)										
5K4	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **sušší**	51,0	BK 22–26, SM 22–24, BO 22–24, JD 22–24	KAd, KArd, KAmd‘, KArd‘	p–ph; (š–k)	fylit, svor, pískovec, odvápněný písčitý slínovec	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp / varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5K7	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	0,8	BK 24–26, SM 24–26, JD 22–24	KAd(s'), KArd(s'), (KAmd'(s'))	p–ph; (k)	fylit, metadroba, kvarcit, pískovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	500–680(–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
5K7e	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	45,6	"	"	"	pískovec, odvápněný písčitý slínovec, kvarcit, fylit	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (10–60 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

6K

6K1	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	666,9	BK 22–24, SM 24–26, JD 22–24	KPm, KAdz'	hp–ph; (š–k)	fylit, svor, kvarcit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	580–800(–860)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Galium saxatile*, *Homogyne alpina*, *Melampyrum sylvaticum*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6K2	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	15,0	BK 20–22, SM 22–24, JD 20–22	KPm, (PZm)	hp; (š–k)	fylit, svor, rula, kvarcit	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	580–800 (–860)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BO 1, BR, JR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Hieracium murorum*, *Homogyne alpina*, *Melampyrum pratense*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6K3	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **bohatší**	241,8	BK 24–26, SM 26–28, JD 24–26	KAd(z'), KPm	hp–ph; (š–k)	fylit, svor, porfyroid, kvarcit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	580–800 (–860)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Homogyne alpina*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*)										

6K5	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **vlhčí**	82,7	BK 24–26, SM 26–28, JD 24–26	KPm(g'), KAdz'(g')	hp–ph; (š)	fylit, svor, porfyroid, kvarcit	plošiny, mírné – střední svahy	0–20	různá	580–800 (–860)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium saxatile*, *Hieracium murorum*, *Homogyne alpina*, *Maianthemum bifolium*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6K7	KYSELÁ SMRKOVÁ BUČINA **skeletnatější**	5,3	BK 22–24, SM 24–26, JD 22–24	KPm(s'), KAdz'(s')	hp–ph; (k)	fylit, svor	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	580–800 (–860)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium saxatile*, *Homogyne alpina*, *Maianthemum bifolium*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

0N

0N1	KYSELÝ KAMENITÝ BOR **modální**	28,6	BO 18–22	PZrs, RNz	p; k–b	křídový křemenný pískovec	balvanité plošiny a svahy	0–45+	různá	360–560	BO 7–9, DBZ 1–3, BK 1–3, SM 1, BR, BRP, JR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3N

3N0	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	29,4	BK 20–24, DB 20–22, SM 20–26	ANsk, KAasd	hp; k–b	pískovec, fylit (halda, odval, lom)	kamenité antropogenní tvary	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3N1	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	216,5	BK 20–24, DB 20–22, SM 20–26	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	p–ph; k–b	pískovec, arkóza, fylit, svor	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3N2	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	39,5	DB 18–20, BK 18–20, BO 20–22	KAsd(z'), RNd(z'), RNz	p–hp; k–b	pískovec, arkóza, fylit, svor	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3N3	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	27,9	BK 22–24, DB 22–24, SM 22–26	KAsd', RNkd', (KAsd, RNd)	hp–ph; k–b	pískovec, arkóza	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Athyrium filix-femina*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*)										

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3N4	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	8,2	BK, DB 22, SM, BO 22	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	p–ph; k–b	pískovec, arkóza	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	převážně slunná	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4N

4N0	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **antropogenní**	5,9	BK 22–24, SM 22–24	ANsk, KAasd	hp; k–b	ryolit (halda, odval, lom)	kamenité antropogenní tvary	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4N1	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **modální**	316,7	BK 22–24, SM 22–24	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	p–ph; k–b	pískovec, arkóza, fylit, svor	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4N2	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **chudší**	105,8	BK 18–22, BO 22–24, SM 20–22	KAsd(z'), RNd(z'), RNz	p–hp; k–b	pískovec, arkóza, fylit, porfyroid	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, DB 1–3, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4N3	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **bohatší**	33,0	BK 22–26, SM 24–26	KAsd', RNkd', (KAsd, RNd)	hp–ph; k–b	pískovec, arkóza	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Athyrium filix-femina*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*)										

4N4	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **sušší**	9,6	BK 22–24, SM 22–24	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	p–hp; k–b	pískovec, arkóza, granit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	převážně slunná	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4N7	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **skeletnatější**	2,9	BK 18–22, BO 22–24, SM 20–22	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	p–ph; k–b	pískovec, slepenec, arkóza	silně kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5N

5N1	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	174,1	BK 22–26, SM 24–26, JD 22–24	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	hp–ph; k–b	fylit, svor, pískovec, arkóza	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5N2	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	49,3	BK 20–22, JD 20–22, SM, BO 22–24	KAsd(z'), RNd(z'), RNz	hp; k–b	fylit, svor, pískovec	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5N3	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	11,0	BK 24–26, SM 26–28, JD 24–26	KAsd‘, RNkd‘, (KAsd, RNd)	hp–ph; k–b	fylit, svor, pískovec, arkóza	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Oxalis acetosella*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Athyrium filix-femina*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*)										
5N4	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **sušší**	24,8	BK 22–26, SM 24–26, JD 22–24	KAsd, RNd, (KAsd‘, RNkd‘)	hp–ph; k–b	fylit, pískovec, granit, kvarcit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	převážně slunná	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6N

6N1	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	38,0	BK 22–24, SM 24–26, JD 22–24	KPs, RNdz‘	hp–ph; k–b	fylit, svor, rula, kvarcit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	580–800 (–860)	BK 3–5, SM 3–5, SM 1–3, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium saxatile*, *Homogyne alpina*, *Melampyrum sylvaticum*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium undulatum*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
6N2	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	53,2	BK 20–22, SM 22–24, JD 20–22	KPs, RNz, (PZs)	hp; k–b	fylit, svor, kvarcit, granit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	různá	580–800 (–860)	BK 3–5, SM 3–5, JD 1–3, BO 1, BR, JR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Homogyne alpina*, *Melampyrum pratense*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6N3	KYSELÁ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **bohatší**	0,7	BK 24–26, SM 26–28, JD 24–26	KAsd(z'), KPs, RNkd', RNd	hp–ph; k–b	fylit, svor	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	580–800 (–860)	BK 3–5, SM 3–5, SM 1–3, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Homogyne alpina*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*)										

2I

2I1	KYSELÁ HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	149,1	DBZ 20–24, BO 22–24	LUd(g'), KAld(g'), (KAld')	ph–h	zahliněný štěrkopísek, odvápněný písčitý slínovec, hlinitý překryv	plošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1–3, BR, JR, JD
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2I3	KYSELÁ HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	50,4	DBZ 22–24, BO 22–26	LUmd‘(g‘), KAld‘(g‘)	ph–h	zahliněný štěrkopísek, odvápněný písčitý slínovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1–3, BR, JR, JD
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Fragaria vesca*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Rubus sect. Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3I

3I1	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	1257,2	BK 22–24, DB 22–24, SM 22–26	LUd(g‘), KAld(g‘), (KAld‘(g‘))	ph–h	pískovec, prachovec, odvápněný písčitý slínovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3I2	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	20,6	BK 20–22, DB 20–24, SM 22–24	LUd(z')(g'), KAld(z')(g')	hp–h	pískovec, prachovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3I3	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	44,1	BK 22–24, DB 22–24, SM 22–26	LUmd'(g'), KAld'(g')	ph–h	pískovec, prachovec, odvápněný písčitý slínovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Fragaria vesca*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3I9	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – písčitá**	118,6	BK 22–24, DB 22–24, SM 22–26	KArd(g'), LUrd(g')	p (hp)	křídový pískovec	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4I

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4I1	KYSELÁ HLINITÁ BUČINA **modální**	890,1	BK 24–26, SM 24–28	LUd, KAld, (KAld')	ph–h	pískovec, prachovec, odvápněný písčitý slínovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4I2	KYSELÁ HLINITÁ BUČINA **chudší**	91,3	BK 22–24, SM 22–26	LUd(z'), KAld(z')	hp–h	pískovec, prachovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4I5	KYSELÁ HLINITÁ BUČINA **vlhčí**	3,5	BK 24–28, SM 24–30	LUdg‘, KAldg‘, (KAlg‘d‘)	ph–h	pískovec, prachovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné svahy)	0–10	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5I

5I1	KYSELÁ HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	820,6	BK 24–26, SM 26–28, JD 26–28	KAld, (LUd, KAld‘)	ph–h	pískovec, prachovec, odvápněný písčitý slínovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6I

6I1	KYSELÁ HLINITÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	49,7	BK 24–26, SM 26–28, JD 26–28	KAld(z‘), KPm	ph	kvarcit, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	540–750	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Galium saxatile*, *Homogyne alpina*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6I5	KYSELÁ HLINITÁ SMRKOVÁ BUČINA **vlhčí**	35,0	BK 24–26, SM 26–30, JD 26–30	KAldg‘(z‘), KPmg‘	ph–h	pískovec, prachovec, odvápněný písčitý slínovec, hlinitý překryv	plošiny, (mírné svahy)	0–10	různá	540–750	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, BR, JR, BO
	Bylinné patro (40–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Galium saxatile*, *Homogyne alpina*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

1S

1S0	SVĚŽÍ DOUBRAVA **antropogenní**	0,6	DBZ 20–26, BO 24–26	AN, KAaa‘	hp–ph	terciérní bazaltoid (bazanit) (navážka)	antropogenní plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	310–330	DBZ 7–9, HB 1–3, LP 1–3, BO, BR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis epigejos*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2S0	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	1,8	DBZ 20–26, BO 24–26	AN(r), KAaa‘	hp; (š)	zahliněný štěrkopísek, pískovec (navážka)	antropogenní plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis epigejos*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2S1	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	249,8	DBZ 22–26, BO 24–26	KAma‘, KAva‘, (KAra‘)	hp–ph; (š–k)	štěrkopísek, pískovec, písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2S2	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	44,6	DBZ 20–24, BO 22–24	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	štěrkopísek, pískovec, odvápněný písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, LPM, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2S4	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	93,6	DBZ 20–24, BO 22–24	KAma‘, (KAra‘)	hp–ph; (š–k)	pískovec, písčitý slínovec, štěrkopísek	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	250–350	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3S

3S0	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	7,2	BK 22–28, DB 22–26, SM 24–28	AN, KAaa‘	hp–ph; (š–k)	pískovec, arkóza, bazaltandezit (navážka)	antropogenní plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Fragaria vesca*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3S1	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **modální**	1050,2	BK 22–28, DB 22–26, SM 24–28	KAma‘, KAva‘, (KAra‘)	hp–ph; (š–k)	pískovec, písčitý slínovec, fylit, bazaltandezit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex sylvatica*, *Galium rotundifolium*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*									
3S1e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	13,8	"	KAma‘	"	bazaltandezit, fylit, ryolit, zelená břidlice	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

3S2	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	1313,7	BK 22–26, DB 22–24, SM 24–26	KAmd‘m‘, (KArd‘m‘)	hp–ph; (š–k)	pískovec, odvápněný písčitý slínovec, arkóza, fylit	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, LPM, KL, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3S3	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	28,0	BK 24–28, DB 24–26, SM 24–28	KAma‘, KAva‘	ph; (š–k)	písčitý slínovec, pískovec, fylit, zelená břidlice	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Brachypodium sylvaticum, Bromus benekenii, Galium odoratum, Melica nutans*)										
3S6	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **hlinitější**	4,6	BK 24–28, DB 24–26, SM 24–28	KAma‘(l‘)	ph–h; (š)	prachovitý pískovec, prachovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–20	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex sylvatica*, *Galium rotundifolium*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
3S7e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	114,3	BK 22–28, DB 22–26, SM 24–28	KAma‘(s‘), KAva‘(s‘), (KAra‘(s‘))	hp–ph; (k)	pískovec, písčitý slínovec, arkóza, fylit	příkré svahy	22+	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium rotundifolium*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

4S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4S0	SVĚŽÍ BUČINA **antropogenní**	13,7	BK 24–28, SM 26–28	AN, KAaa‘	hp–ph; (š–k)	pískovec, písčitý slínovec, terciérní bazaltoid (bazanit) (navážka)	antropogenní plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Galium rotundifolium*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
4S1	SVĚŽÍ BUČINA **modální**	3464,1	BK 24–28, SM 26–28	KAma‘, KAva‘, (KAra‘)	hp–ph; (š–k)	pískovec, písčitý slínovec, bazaltandezit, fylit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Galium rotundifolium*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
4S1e	SVĚŽÍ BUČINA **modální – exponovaná**	157,8	"	KAma‘, (KAra‘)	"	bazaltandezit, pískovec, fylit, zelená břidlice	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4S2	SVĚŽÍ BUČINA **chudší**	4978,4	BK 24–26, SM 24–26	KAmd'm', (KArd'm')	hp–ph; (š–k)	pískovec, odvápněný písčitý slínovec, bazaltandezit, fylit	pošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, LPM, KL, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
4S2e	SVĚŽÍ BUČINA **chudší – exponovaná**	45,1	"	"	"	pískovec, odvápněný písčitý slínovec, prachovec, bazaltandezit	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4S3	SVĚŽÍ BUČINA **bohatší**	21,4	BK 24–30, SM 26–30	KAma‘, KAva‘	ph; (š–k)	pískovec, prachovec, písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas, Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
4S3e	SVĚŽÍ BUČINA **bohatší – exponovaná**	0,5	"	"	"	"	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Brachypodium sylvaticum, Bromus benekenii, Galium odoratum, Melica nutans*)										

4S4	SVĚŽÍ BUČINA **sušší**	56,8	BK 24–26, SM 24–26	KAma‘, KAva‘, (KAra‘)	hp–ph; (š–k)	pískovec, prachovec, písčitý slínovec	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
4S4e	SVĚŽÍ BUČINA **sušší – exponovaná**	2,5	"	"	"	"	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4S5	SVĚŽÍ BUČINA **vlhčí**	6,9	BK 24–30, SM 26–30	KAma‘(g‘), KAva‘(g‘)	ph; (š–k)	pískovec, prachovec, písčitý slínovec	pošiny, mírné – střední svahy	0–20	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Equisetum sylvaticum*)										

4S6	SVĚŽÍ BUČINA **hlinitější**	24,2	BK 24–30, SM 26–30	KAma‘(l‘)	ph–h; (š)	prachovitý pískovec, prachovec	pošiny, mírné – střední svahy	0–20	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4S7	SVĚŽÍ BUČINA **skeletnatější**	1,0	BK 24–28, SM 26–28	KAma‘(s‘), KAva‘(s‘), (KAra‘(s‘))	hp–ph; (k)	fylit, kvarcit, pískovec	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium rotundifolium*, *Maianthemum bifolium*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
4S7e	SVĚŽÍ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	233,4	"	"	"	pískovec, písčitý slínovec, arkóza, fylit	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

5S

5S0	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,3	BK 24–28, SM 26–30, JD 24–28	AN, KAaa‘	hp–ph; (š–k)	pískovec (navážka)	antropogenní plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Galium rotundifolium*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5S1	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	1328,4	BK 24–28, SM 26–30, JD 24–28	KAma‘, (KAva‘, KAra‘)	hp–ph; (š–k)	fylit, bazaltandezit, pískovec, písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	500–680(–750)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Galium rotundifolium*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
5S1e	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	154,4	"	KAma‘, (KAra‘)	"	fylit, bazaltandezit, zelená břidice, pískovec	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5S2	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	2453,0	BK 24–26, SM 26–28, JD 24–26	KAmd‘m‘, (KArd‘m‘)	hp–ph; (š–k)	fylit, svor, bazaltandezit, pískovec	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, SM, LPM, KL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
5S2e	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	3,6	"	KAmd‘m‘	"	bazaltandezit	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

5S7	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	43,2	BK 24–28, SM 26–30, JD 24–28	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	fylit, alkalický bazalt, dacit, pískovec	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium rotundifolium*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
5S7e	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	45,5	"	KAma‘(s‘), KAva‘(s‘), (KAra‘(s‘))	"	pískovec, písčitý slínovec, rula, fylit	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

6S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6S1	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	97,8	SM 26–30, BK 24–28, JD 24–26	KAmd'm', KPm	hp–ph; (š–k)	fylit, svor, rula, granit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	600–860	BK 3–5,SM 1–3, JD 1–3, KL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Homogyne alpina*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6S2	SVĚŽÍ SMRKOVÁ BUČINA **chudší**	443,6	BK 24–26, SM 26–28, JD 24–26	KPm, KAmd'm'	hp; (š–k)	fylit, svor, rula, granit	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	600–860	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL, JR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Hieracium murorum*, *Homogyne alpina*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Streptopus amplexifolius*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3F

3F0	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	4,0	BK 22–28, DB 22–26, SM 24–28	AN(sk), KAasa'	hp; k–b	pískovec, arkóza (halda, lom)	kamenité antropogenní tvary	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	126,3	BK 22–28, DB 22–26, SM 24–28	KAsa‘, KAvs‘a‘, RNka‘	hp–ph; k–b	pískovec, písčitý slínovec, fylit, zelená břidlice	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

3F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	0,5	BK 24–30, DB 24–28, SM 24–30	KAsa‘, RNka‘, KAvs‘a‘	ph; k–b	pískovec, písčitý slínovec	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galium odoratum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

3F9	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	24,6	BK 24–30, DB 24–28, SM 24–30	KAsa‘, KAvs‘a‘, RNka‘	ph; k	pískovec, písčitý slínovec, fylit	kamenité rokle	22–45+	stinná	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

4F

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4F0	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **antropogenní**	0,5	BK 24–28, SM 26–28	AN(sk), KAasa‘	hp–ph; k–b	metaarkóza, pískovec, prachovec (halda, odval, lom)	kamenité antropogenní tvary	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
4F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **modální**	300,6	BK 24–28, SM 26–28	KAsa‘, KAvs‘a‘, RNka‘	hp–ph; k–b	pískovec, písčitý slínovec, bazaltandezit, zelená břidlice	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
4F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **bohatší**	6,0	BK 24–30, SM 26–30	KAsa‘, RNka‘	ph; k–b	bazaltandezit, tuf bazaltandezitu	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galium odoratum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4F4	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **sušší**	1,4	BK 24–26, SM 24–26	KAsa‘, KAms‘a‘, RNka‘	hp–ph; k–b	pískovec, prachovec	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
4F9	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **specifická – roklinová**	70,8	BK 24–30, SM 26–30	KAsa‘, KAvs‘a‘, RNka‘	ph; k	pískovec, písčitý slínovec, bazaltandezit, fylit	kamenité rokle	22–45+	stinná	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

5F

5F0	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,5	BK 24–28, SM 26–30, JD 24–28	AN(sk), KAasa‘	hp–ph; k–b	fylit, fylitická břidlice, pískovec (halda, odval, lom)	kamenité antropogenní tvary	0–45+	různá	500–650	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	275,5	BK 24–28, SM 26–30, JD 24–28	KAsa‘, RNka‘	hp–ph; k–b	fylit, pískovec, bazaltandezit, zelená břidlice	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
5F9	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	14,4	BK 24–30, SM 26–30, JD 24–30	KAsa‘, KAvs‘a‘, RNka‘	ph; k	fylit, pískovec, písčitý slínovec, prachovec	kamenité rokle	22–45+	stinná	500–680 (–750)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

6F

6F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	12,1	SM 26–30, BK 24–28, JD 24–28	KAsa‘, RNka‘, (KPs)	hp–ph; k–b	fylit, svor	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	600–860	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Homogyne alpina*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

2C

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2C0	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	1,3	DBZ 20–22, BO 20–24	AN(sk), KAad‘m‘	h; (š)	slínovec, vápnitý jílovec (halda)	(kamenité) antropogenní tvary	0–45+	slunná	240–380	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula persicifolia*, *Campanula rotundifolia*, *Convallaria majalis*, *Fragaria vesca*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2C1	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	44,8	DBZ 20–22, BO 20–24	KAva‘, KAvs‘a‘, PRka‘	hp–ph; š–k	písčitý slínovec, slínovec, vápnitý pískovec	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	240–380	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula persicifolia*, *Campanula rotundifolia*, *Convallaria majalis*, *Fragaria vesca*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2C3	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	47,8	DBZ 20–24, BO 20–24	KAva‘(e‘), KAvs‘a‘(e‘), PRv, PRk	ph–h; š–k	slínovec, písčitý slínovec, vápnitý jílovec	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	240–380	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Astragalus glycyphyllos*, *Brachypodium pinnatum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula persicifolia*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Fragaria moschata*, *Melampyrum nemorosum*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3C

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3C0	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	2,0	DB 22, BK 22, BO 24, SM 22	AN(sk), KAad‘m‘	hp–ph; š–k	pískovec, terciérní bazaltoid (halda)	antropogenní tvary	0–45+	slunná	380–500	BK 5–7, DB 1–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula persicifolia*, *Campanula rotundifolia*, *Convallaria majalis*, *Fragaria vesca*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3C1	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	116,5	DB 22, BK 22, BO 24, SM 22	KAsa‘, KAva‘(s‘), RNka‘, PRka‘	hp–ph; š–k	bazaltandezit, slínovec, (vápnitý) pískovec, fylit	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	380–500	BK 5–7, DB 1–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula persicifolia*, *Campanula rotundifolia*, *Convallaria majalis*, *Fragaria vesca*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3C2	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	17,9	DB 22, BK 22, BO 24, SM 22	KAsa‘, KAsd‘m‘, RNka‘, RNkd‘m‘	hp–ph; š–k	bazaltandezit, pískovec, odvápněný písčitý slínovec, fylit	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	380–500	BK 5–7, DB 1–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Campanula rotundifolia*, *Festuca ovina*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica chamaedrys*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3C3	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	12,5	DB 22, BK 22, BO 24, SM 22	KAva‘(e‘), KAvs‘a‘(e‘), PRv, PRk	hp–h; š–k	slínovec, písčitý slínovec, vápnitý pískovec	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	380–500	BK 5–7, DB 1–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula persicifolia*, *Campanula trachelium*, *Convallaria majalis*, *Fragaria moschata*, *Melampyrum nemorosum*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4C

4C0	VYSÝCHAVÁ BUČINA **antropogenní**	0,1	BK 22–24, BO 24, SM 24	AN(sk), KAad‘m‘	h; (š)	prachovec, slínovec (halda)	antropogenní tvary	0–45+	slunná	400–620	BK 7–9, DB 1–3, JD, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula persicifolia*, *Campanula rotundifolia*, *Convallaria majalis*, *Fragaria vesca*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4C1	VYSÝCHAVÁ BUČINA **modální**	216,2	BK 22–24, BO 24, SM 24	KAsa‘, KAva‘(s‘), RNka‘, PRka‘	hp–ph; š–k	bazaltandezit, slínovec, pískovec, fylit	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	400–620	BK 7–9, DB 1–3, JD, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula persicifolia*, *Campanula rotundifolia*, *Convallaria majalis*, *Fragaria vesca*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4C2	VYSÝCHAVÁ BUČINA **chudší**	23,6	BK 22–24, BO 24, SM 24	KAsa‘, KAsd‘m‘, RNka‘, RNkd‘m‘	hp–ph; š–k	bazaltandezit, pískovec, prachovec, arkóza	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	400–620	BK 7–9, DB 1–3, JD, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Campanula rotundifolia*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica chamaedrys*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4C8	VYSÝCHAVÁ BUČINA **specifická – vápnitá**	8,7	BK 22–24, BO 24, SM 24	PRm, PRv, PRk	ph–h; š–k	slínovec, vápnitý kalovec s vložkami vápence	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	400–550	BK 7–9, DB 1–3, JD, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Alliaria petiolata*, *Astragalus glycyphyllos*, *Brachypodium pinnatum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula persicifolia*, *Carex digitata*, *Carex flacca*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Fragaria moschata*, *Melampyrum nemorosum*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*										
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4C9	VYSÝCHAVÁ BUČINA **specifická – vápencová**	0,9	BK 22–24, BO 24, SM 24	RZk, KAvs‘e‘	ph–h; š–k	(dolomitický) krystalický vápenec, krystalický dolomit, sladkovodní vápenec	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	400–620	BK 9–10, DB, LP, HB, JS, JV, TR, MK, BRK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aquilegia vulgaris*, *Astragalus glycyphyllos*, *Brachypodium pinnatum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula persicifolia*, *Carex digitata*, *Carex flacca*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Fragaria moschata*, *Melampyrum nemorosum*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*										
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5C

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5C0	VYSÝCHAVÁ JEDLOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,9	BK 24, SM 24, JD 24	AN(sk), KAad‘m‘	hp–ph; š–k	fylit, fylitická břidlice, pískovec (halda, odval, lom)	antropogenní tvary	0–45+	0,0	500–600	BK 5–7, JD 1–3, LP, JV, JR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula rotundifolia*, *Fragaria vesca*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5C1	VYSÝCHAVÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	31,5	BK 24, SM 24, JD 24	KAsa‘, KAva‘(s‘), RNka‘	hp–ph; š–k	bazaltandezit, fylit, alkalický bazalt, písčitý slínovec	(kamenité) konvexní střední – příkré (strmé) svahy, hřbety, kupy	0–45+	slunná	500–750	BK 5–7, JD 1–3, LP, JV, JR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula rotundifolia*, *Fragaria vesca*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Bryum* sp. div., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

1B

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
1B4	BOHATÁ HABROVÁ DOUBRAVA **sušší**	1,7	DB 22–26	KAmb‘	ph; (š–k)	terciérní bazaltoid (bazanit)	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	převážně slunná	240–300	DB 7–9, HB 1–3, LP 1–3, JVM, BB, BRK, TR, JS, JLM, MK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula trachelium*, *Dactylis polygama*, *Festuca heterophylla*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

2B

2B1	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	580,5	DB 24–28	KAva‘, KAve‘, PRka‘, PRk	ph–h; (š–k)	písčitý slínovec, slínovec, vápnitý jílovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex sylvatica*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2B4	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	46,1	DB 22–26	KAva‘, KAve‘, PRka‘, PRk	ph–h; (š–k)	písčitý slínovec, slínovec, vápnitý jílovec	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula trachelium*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
2B4e	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší – exponovaná**	2,1	"	"	"	"	příkré svahy	22+	"	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

3B

3B1	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	712,6	BK 24–28, DB 24–28, SM 26–28	KAva‘(e‘), KAma‘(e‘), PRka‘, PRk	ph–h; (š–k)	slínovec, vápnitý pískovec, fylit, bazaltandezit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD 1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
3B1e	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	2,5	"	KAva‘(e‘), PRka‘, PRk	"	písčitý slínovec	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3B4	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	83,7	BK 24–28, DB 24–28, SM 26–28	KAva‘(e‘), KAma‘(e‘), PRka‘, PRk	ph–h; (š–k)	písčitý slínovec, slínovec, vápnitý pískovec, bazaltandezit	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	320–460	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD 1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mycelis muralis*, *Paris quadrifolia*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

3B7	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější**	12,3	BK 24–28, DB 24–28, SM 26–28	KAva‘(e‘)(s‘), KAma‘(e‘)(s‘), PRka‘, PRk	ph–h; (k)	písčitý slínovec, vápnitý pískovec, fylit, dacit	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD 1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
3B7e	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	52,1	"	"	"	písčitý slínovec, vápnitý pískovec, fylit, bazaltandezit	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4B

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4B1	BOHATÁ BUČINA **modální**	898,6	BK 26–30, SM 26–30	KAma‘(e‘), KAva‘(e‘), PRka‘, PRk	ph–h; (š–k)	bazaltandezit, písčitý slínovec, vápnitý pískovec, fylit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
4B1e	BOHATÁ BUČINA **modální – exponovaná**	18,9	"	"	"	bazaltandezit, písčitý slínovec, vápnitý pískovec, slínovec	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4B2	BOHATÁ BUČINA **chudší**	44,3	BK 24–28, SM 24–28	KAma‘, KAva‘, PRka‘	ph–h; (š–k)	prachovec, vápnitý pískovec, písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
4B2e	BOHATÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	0,6	"	"	"	"	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

4B3	BOHATÁ BUČINA **nitrofilnější**	7,6	BK 26–30, SM 26–30	KAme‘, KAve‘, PRk	ph–h; (š–k)	vápnitý prachovec, vápnitý pískovec, písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
4B3e	BOHATÁ BUČINA **nitrofilnější – exponovaná**	0,6	"	"	"	"	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4B4	BOHATÁ BUČINA **sušší**	25,4	BK 24–28, SM 24–28	KAma‘, KAme‘, PRka‘, PRk	ph; (š–k)	vápnitý prachovec, vápnitý pískovec, písčitý slínovec	mírné – střední svahy (konvexní)	5–22	převážně slunná	380–600	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
4B4e	BOHATÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	4,9	"	KAma‘, KAme‘	"	bazaltandezit	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4B7	BOHATÁ BUČINA **skeletnatější**	233,8	BK 26–30, SM 26–30	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘), KAmb‘(s‘)	ph; (k)	bazaltandezit, alkalický bazalt, dacit, zelená břidlice	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
4B7e	BOHATÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	122,4	"	KAma‘(e‘)(s‘), KAva‘(e‘)(s‘), PRka‘, PRk	ph–h; (k)	bazaltandezit, slínovec, dacit, zelená břidlice	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

5B

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5B1	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	322,8	BK 26–30, SM 28–32, JD 26–30	KAma‘(e‘), KAva‘(e‘)	ph–h; (š–k)	fylit, bazaltandezit, písčitý slínovec, prachovec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	550–700	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
5B1e	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	4,1	"	"	"	bazaltandezit, písčitý slínovec	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5B2	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	40,6	BK 26–28, SM 28–30, JD 26–28	KAma‘, KAva‘	ph; (š–k)	fylit, zelená břidlice, bazaltandezit, písčitý slínovec	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	550–700	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
5B2e	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	1,4	"	KAma‘	"	bazaltandezit, tuf bazaltandezitu	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5B7	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	48,9	BK 26–30, SM 28–32, JD 26–30	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘), KAmb‘(s‘)	ph; (k)	fylit, alkalický bazalt, bazaltandezit, zelená břidlice	plošiny, mírné – střední svahy (konvexní)	0–22	různá	550–700	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Sanicula europaea*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
5B7e	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	48,9	"	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	"	fylit, zelená břidlice, svor, bazaltandezit	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

4W

4W3	VÁPENCOVÁ BUČINA **bohatší**	20,0	BK 26–30, SM 28–32, JD 26–30	KAve‘, (RZk)	ph–h; (š–k)	(dolomitický) krystalický vápenec, krystalický dolomit, sladkovodní vápenec	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	520–660	BK 9–10, DB, JD, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Cephalanthera damasonium*, *Corallorhiza trifida*, *Daphne mezereum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium odoratum*, *Listera ovata*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Neottia nidus-avis*, *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4W4e	VÁPENCOVÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	5,7	BK 26–30, SM 28–32, JD 26–30	KAve‘, RZk	ph–h; (š–k)	(dolomitický) krystalický vápenec, krystalický dolomit	příkré svahy	22+	různá	520–660	BK 9–10, DB, JD, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Aquilegia vulgaris*, *Asarum europaeum*, *Carex flacca*, *Cephalanthera damasonium*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium odoratum*, *Listera ovata*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Sanicula europaea*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5W

5W1	VÁPENCOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	46,1	BK 26–30, SM 28–32, JD 26–30	KAve‘, (RZk)	ph–h; (š–k)	(dolomitický) krystalický vápenec, krystalický dolomit	plošiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	600–720	BK 7–9, JD 1–3, JV, JLH, JS, LP
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Cephalanthera damasonium*, *Daphne mezereum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium odoratum*, *Listera ovata*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Sanicula europaea*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine*									
Poznámka											

2H

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2H1	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	526,7	DB 24–26, BK 24–26	LUma‘, KAlva‘, HNm, HNl	h–jh	písčitý slínovec, slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	plošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex sylvatica*, *Glechoma hederacea*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Rubus caesius*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

2H3	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	155,1	DB 24–28, BK 24–28	HNm, HNl, LUma‘(e‘), PRk	h–jh	slínovec, písčitý slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	plošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex montana*, *Carex sylvatica*, *Dactylis glomerata* agg., *Fragaria moschata*, *Fragaria vesca*, *Hepatica nobilis*, *Melampyrum nemorosum*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus* sect. *Rubus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2H4	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	222,8	DB 22–26, BK 22–24	HNm, HNl, LUma‘, KAlva‘	h–jh	písčitý slínovec, slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	plošiny, mírné (střední) svahy	0–15	převážně slunná	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Betonica officinalis*, *Brachypodium sylvaticum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula trachelium*, *Carex montana*, *Convallaria majalis*, *Dactylis glomerata* agg., *Fragaria moschata*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melampyrum nemorosum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus* sect. *Rubus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											
2H5	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **vlhčí**	141,5	DB 24–28, BK 24–28	LUmg‘a‘, KAlvg‘a‘, HNmg‘, HNlg‘	h–jh	písčitý slínovec, slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	plošiny, ploché úžlabiny	0–10	různá	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Juncus effusus*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia arundinacea*), *Rubus idaeus*, *Rubus sect. Rubus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

3H

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3H1	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	781,5	BK 24–28, DB 24–28, SM 26–28	LUma‘, KAlva‘, KAla‘, HNl	h–jh	písčitý slínovec, slínovec, jílovec, (sprašová) hlína	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

3H3	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	54,9	BK 24–30, DB 24–30, SM 26–30	HNl, LUma‘(e‘), PRk	h–jh	slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dactylis glomerata* agg., *Fragaria moschata*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum multiflorum*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

4H

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4H1	HLINITÁ BUČINA **modální**	538,6	BK 24–28, SM 26–28	LUma‘, KAlva‘, KAla‘	h–jh	písčitý slínovec, slínovec, prachovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

4H3	HLINITÁ BUČINA **bohatší**	82,5	BK 24–30, SM 24–32	LUma‘(e‘), KAlva‘(e‘), KAla‘(e‘), (HNl)	h–jh	písčitý slínovec, slínovec, prachovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dactylis glomerata* agg., *Fragaria moschata*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum multiflorum*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4H5	HLINITÁ BUČINA **vlhčí**	24,5	BK 24–30, SM 24–32	LUmg‘a‘, KAlg‘a‘, KAlvg‘a‘	h–jh	slínovec, prachovec, jílovec, hlinitý překryv	plošiny, ploché úžlabiny	0–10	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

5H

5H1	HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	445,7	BK 24–28, SM 26–30, JD 26–30	KAla‘, KAlva‘, KAml‘a‘, (LUma‘)	ph–jh	prachovec, písčitý slínovec, fylit, hlinitý překryv	plošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	500–680	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, JS, JLH, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

5H3	HLINITÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	15,0	BK 26–30, SM 26–30, JD 26–30	KAla‘(e‘), KAlva‘(e‘), KAml‘a‘(e‘), (LUma‘(e‘))	h–jh	prachovec, písčitý slínovec, fylit, hlinitý překryv	plošiny, (mírné – střední svahy)	0–15	různá	500–680	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, JS, JLH, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Fragaria moschata*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum multiflorum*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*									
Poznámka											

1D

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1D4	OBOHACENÁ HABROVÁ DOUBRAVA **sušší**	12,9	DB 24–28, JS 26–30	PRk, PRn, HNm	h	slínovec, sprašová hlína	deluvia spodních částí svahů	0–20	převážně slunná	240–280	DB 5–7, HB 1–3, LP 1–3, JVM 1, JS, JLM, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula trachelium*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum multiflorum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

1D5	OBOHACENÁ HABROVÁ DOUBRAVA **vlhčí**	3,5	DB 26–30, JS 26–32	PRk(g'), PRp(g'), HNm(g')	h–jh	slínovec, sprašová hlína	deluvia spodních částí svahů	0–20	různá	240–280	DB 5–7, HB 1–3, LP 1–3, JVM 1, JS, JLM, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nummularia*, *Primula veris*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

2D

2D0	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,3	DB 26–30, LP 26–28	ANhh	h	písčitý slínovec (navážka)	deluvia spodních částí svahů	0–20	různá	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Mercurialis perennis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2D1	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	174,0	DB 26–30, LP 26–28	PRk, PRn, HNm, HNl	h–jh	slínovec, písčitý slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	deluvia spodních částí svahů, úžlabiny	0–20	různá	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Mercurialis perennis*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

2D2	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	24,5	DB 22–28, LP 26–28	PRka‘, HNl	h	písčitý slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	deluvia spodních částí svahů, úžlabiny	0–20	různá	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Lamium maculatum*, *Oxalis acetosella, Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2D4	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	30,7	DB 22–28, LP 26–28	PRk, PRn, HNm	h	slínovec, písčitý slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	deluvia spodních částí svahů	0–20	převážně slunná	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula trachelium*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum multiflorum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

2D5	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **vlhčí**	251,8	DB 26–30, LP 26–28	PRkg‘, PRpg‘, HNlg‘	h–jh	slínovec, písčitý slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	deluvia spodních částí svahů, ploché úžlabiny	0–20	různá	250–350	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nummularia*, *Primula elatior*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*									
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

3D

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3D0	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	2,0	BK 26–30, DB 26–30, SM 26–30	ANh, ANpk	h	sprašová hlína (navážka)	deluvia	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Mercurialis perennis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
3D1	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	225,5	BK 26–30, DB 26–30, SM 26–30	PRk(n), KAv(n)e‘, KAm(n)e‘, HNl	ph–jh; (š)	slínovec, písčitý slínovec, bazaltandezit, sprašová a deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, úžlabiny	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Daphne mezereum*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Oxalis acetosella*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
3D1e	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	0,1	"	KAme‘, KAne‘	ph–h; (š)	bazaltandezit, (tuf a aglomerát bazaltandezitu), deluviální hlína	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3D2	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	62,3	BK 26–28, DB 24–26, SM 26–30	KAma‘, KAva‘	ph–h; (š)	pískovec (vápnitý), písčitý slínovec, deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, úžlabiny	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Luzula pilosa*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

3D4	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	1,1	BK 26–28, DB 24–26, SM 26–30	KAve‘, PRk, HNl	h; (š)	písčitý slínovec, slínovec, deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů	0–22	převážně slunná	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula trachelium*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Paris quadrifolia*, *Polygonatum multiflorum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3D5	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	84,2	BK 26–30, DB 26–30, SM 26–30	KAv(n)e‘g‘, PRkg‘, PRpg‘, HNlg‘	h–jh	písčitý slínovec, slínovec, pískovec, sprašová a deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, ploché úžlabiny	0–20	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum temulum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nummularia*, *Primula elatior*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

4D

4D0	OBOHACENÁ BUČINA **antropogenní**	0,5	BK 28–30, SM 28–30	ANh, ANpk	h	prachovec, pískovec (navážka)	deluvia	0–22	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Luzula pilosa*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4D1	OBOHACENÁ BUČINA **modální**	231,4	BK 28–30, SM 28–30	KAm(n)e‘, KAv(n)e‘, PRk(n), HNl	ph–h; (š)	bazaltandezit, slínovec, písčitý slínovec, deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, úžlabiny	0–22	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Mercurialis perennis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
4D1e	OBOHACENÁ BUČINA **modální – exponovaná**	1,4	"	"	"	vápnitý prachovec, písčitý slínovec, deluviální hlína	příkré svahy	22+	"	"	"
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

4D2	OBOHACENÁ BUČINA **chudší**	145,7	BK 26–30, SM 26–30	KAma‘, KAva‘	ph–h; (š)	pískovec (vápnitý), písčitý slínovec, bazaltandezit, deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, úžlabiny	0–22	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Luzula pilosa*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4D5	OBOHACENÁ BUČINA **vlhčí**	235,6	BK 28–30, SM 28–30	KAv(n)e‘g‘, KAm(n)e‘g‘, PRk(p)g‘, HNlg‘	ph–jh	písčitý slínovec, slínovec, bazaltandezit, deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, ploché úžlabiny	0–20	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chaerophyllum temulum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nummularia*, *Primula elatior*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
4D8	OBOHACENÁ BUČINA **specifická – terasová**	0,9	BK 28–32, SM 28–32	KAfe‘, KAfe‘n‘	ph–h	holocénní fluviální hlína na prachovci a pískovci	vyvýšené nezaplavované terasy potoků a říček	0–5	—	380–600	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chaerophyllum temulum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nummularia*, *Primula elatior*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
4D9	OBOHACENÁ BUČINA **specifická – roklinová**	3,5	BK 28–32, SM 28–32	KAm(n)e‘, KAv(n)e‘, PRk(n)	ph–h	vápnitý prachovec, písčitý slínovec, deluviální hlína	neskeletnaté rokle, strže	22–45+	stinná	380–600	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chaerophyllum temulum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nummularia*, *Primula elatior*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5D

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5D1	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	32,1	BK 26–32, JD 26–32, SM 28–32	KAme‘, KAne‘, KAv(n)e‘	ph–h; (š)	fylit, bazaltandezit, písčitý slínovec, deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, úžlabiny	0–22	různá	520–700	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Mercurialis perennis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5D2	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	143,3	BK 26–30, JD 26–30, SM 28–32	KAma‘, KAva‘	ph–h; (š)	fylit, bazaltandezit, písčitý slínovec, deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, úžlabiny	0–22	různá	520–700	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Luzula pilosa*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5D5	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **vlhčí**	301,7	BK 26–32, JD 26–32, SM 28–32	KAme‘g‘, KAne‘g‘, KAv(n)e‘g‘	ph–jh	fylit, bazaltandezit, písčitý slínovec, deluviální hlína	deluvia spodních částí svahů, ploché úžlabiny	0–20	různá	520–700	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chaerophyllum temulum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nummularia*, *Petasites albus*, *Primula elatior*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

2A

2A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	20,5	DB 22–24, JV 22–24	PRm, PRk, PRn, KAv(n)s‘e‘	ph–h; k–b	písčitý slínovec	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	240–350	DB 5–7, HB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, BK 1–3, JS, JLM, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Alliaria petiolata*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Convallaria majalis*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

3A

3A0	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	3,4	BK 24–28, LP 24–28, DB 24–28, SM 24–28	AN(sk), KAasa‘(e‘)	ph; k–b	pískovec, písčitý slínovec (halda, odval, lom)	hrany lomů, odvaly	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **modální**	78,9	BK 24–28, LP 24–28, DB 24–28, SM 24–28	PRk(n), KAv(n)s'e', KAse', RNk(n)e'	ph–h; k–b	slínovec, vápnitý pískovec, bazaltandezit, fylit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
3A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **chudší**	24,4	BK 24–26, LP 24–26, DB 24–26, SM 24–26	KAvs'a', PRka', KAsa', RNka'	ph–h; k–b	písčitý slínovec, pískovec, zelená břidice, fylit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety	0–45+	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
3A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **sušší**	16,9	BK 24–26, LP 24–26, DB 24–26, SM 24–26	KAse', RNke', PRk, KAvs'e'	ph; k–b	fylit, granit, bazaltandezit, vápnitý pískovec	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety	0–45+	převážně slunná	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Campanula persicifolia*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca altissima*, *Fragaria moschata*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

4A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4A0	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,3	BK, JV, LP 26–30, SM 26–30	AN(sk), KAasa‘(e‘)	ph; k–b	(vápnitý) pískovec, prachovec (halda, odval, lom)	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	380–500	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

4A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **modální**	153,7	BK, JV, LP 26–30, SM 26–30	KAse‘, RNk(n)e‘, PRk(n), KAv(n)s‘e‘	ph; k–b	bazaltandezit, bazalt, vápnitý pískovec, zelená břidlice	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	380–600	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus sect*. *Rubus*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **chudší**	114,6	BK, JV, LP 24–28, SM 24–28	KAsa‘, RNka‘, KAvs‘a‘, PRka‘	ph; k–b	zelená břidlice, písčitý slínovec, vápnitý pískovec, fylit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety	0–45+	různá	380–600	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Mycelis muralis*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

4A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **sušší**	36,8	BK, JV, LP 24–28, SM 24–28	KAse‘, RNke‘, PRk, KAvs‘e‘	ph; k–b	bazaltandezit, slínovec, fylit, dacit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety	0–45+	převážně slunná	380–600	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Campanula persicifolia*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca altissima*, *Fragaria moschata*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

4A9	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **specifická – vápencová**	6,9	BK, JV, LP 24–28, SM 24–28	RZm, RZk, RZn	ph–h; k–b	(dolomitický) krystalický vápenec, krystalický dolomit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	420–660	BK 7–9, LP 1–3, JV 1–3, JS, JLH, DB, JD, HB, TR, MK, TS, BRK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Cephalanthera damasonium*, *Corallorhiza trifida*, *Daphne mezereum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Listera ovata*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Neottia nidus-avis*, *Platanthera bifolia*, *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **modální**	205,0	BK, JV, JD 26–30, SM 26–30	KAse‘, RNk(n)e‘, RNme‘, KAv(n)s‘e‘	ph; k–b	fylit, zelená břidlice, bazaltandezit, písčitý slínovec	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	480–700	BK 5–7, JD 1–3, KL 1–3, JLH, LP, JS, JVM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
5A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **chudší**	34,4	BK, JV, JD 26, SM 26–28	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	ph; k–b	fylit, svor, zelená břidlice, bazaltandezit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety	0–45+	různá	480–700	BK 5–7, JD 1–3, KL 1–3, JLH, LP, JS, JVM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
5A9	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **specifická – vápencová**	16,3	BK, JV 26, SM, JD 24–26	RZm, RZk, RZn	ph–h; k–b	(dolomitický) krystalický vápenec, krystalický dolomit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	500–700	BK 5–7, KL 1–3, JD 1–3, JLH, LP, JS, JVM, TR, TS
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Cephalanthera damasonium*, *Daphne mezereum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Listera ovata*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Neottia nidus-avis*, *Platanthera bifolia*, *Polystichum aculeatum*, *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

6A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
6A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOSMRKOVÁ BUČINA **modální**	10,6	BK 24–28, KL 24–28, SM 26–30, JD 24–30	KAsa‘(e‘), RNka‘(e‘), RNma‘(e‘)	ph; k–b	fylit, svor	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy	0–45+	různá	600–860	BK 3–5, JD 1–3, SM 1–3, KL 1–3, JS, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Cicerbita alpina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca altissima*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Homogyne alpina*, *Mercurialis perennis*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Streptopus amplexifolius*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
6A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOSMRKOVÁ BUČINA **chudší**	16,7	BK 24–26, KL 24–26, SM 26–28, JD 24–26	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp–ph; k–b	fylit, svor, granodiorit	kamenité plošiny až příkré (strmé) svahy, hřbety	0–45+	různá	600–860	BK 3–5, JD 1–3, SM 1–3, KL 1–3, JS, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Homogyne alpina*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Streptopus amplexifolius*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka	(ojedinělý výskyt *Cicerbita alpina*)										

3J

3J0	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **antropogenní**	3,4	BK 22–26, LP, JV 22–26, DB 22–26	ANsk, LIma‘(e‘)	hp–ph; k–kh	dacit, bazaltoid (bazanit), pískovec (halda, odval, lom)	hrany lomů, odvaly	5–45+	různá	260–480	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Polypodium vulgare*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **modální**	19,3	BK 22–26, LP, JV 22–26, DB 22–26	PRs(n), PRte‘, RNs(n)e‘, (LIme‘)	ph–h; k–kh	písčitý slínovec, slínovec, vápnitý pískovec, fylit	suťové a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	260–480	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula trachelium*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Polypodium vulgare*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus idaeus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
3J2	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **chudší**	10,5	BK 22–24, LP 20–24, JV 22, DB 20–24	RNsa‘, RNta‘, RNma‘, (LIma‘)	ph; k–kh	zelená břidlice, fylit, pískovec, prachovec	suťové a skalnaté svahy, vrcholy, hřebeny	5–45+	různá	260–480	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Polypodium vulgare*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											
3J4	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **sušší**	18,6	BK 22–24, LP 20–24, JV 22, DB 20–24	RNs(n)e‘, RNte‘, PRs(n), (LIme‘)	ph; k–kh	bazaltandezit, zelená břidlice, fylit, písčitý slínovec	suťové a skalnaté svahy, vrcholy, hřebeny	5–45+	převážně slunná	260–500	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca altissima*, *Fragaria moschata*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3J8	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **specifická – vápencová**	0,3	BK 22–26, LP, JV 22–26, DB 22–26	RZs, RZt, RZn, LIce‘	ph–h; k–kh	sladkovodní vápenec	suťové a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	260–480	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Cephalanthera damasonium*, *Daphne mezereum*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3J9	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **specifická – roklinová**	49,6	BK 24–30, LP, JV, DB 24–30	PRn, RNne‘, RNke‘, KAsne'	ph–h; k–b	písčitý slínovec, pískovec, fylit, bazaltandezit	skeletnaté rokle	5–45+	stinná	260–480	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Impatiens noli-tangere*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5J

5J0	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **antropogenní**	1,4	BK 24–28, JV, JS, JL 24–28	ANsk, LIma‘(e‘)	ph; k–kh	bazaltandezit (odval, lom)	hrany lomů, odvaly	5–45+	různá	400–620 (–760)	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JL 1–3, JLH, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*, *Prenanthes purpurea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **modální**	57,3	BK 24–28, JV, JS, JL 24–28	RNs(n)e‘, RNte‘, RNme‘, (LIme‘)	ph; k–kh	fylit, svor, zelená břidlice, bazaltandezit	suťové a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	400–620 (–760)	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH 1, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Polystichum aculeatum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5J2	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **chudší**	12,7	BK 22–26, JV, JS, JL 22–26	RNsa‘, RNta‘, RNma‘, (LIma‘)	ph; k–kh	fylit, zelená břidlice	suťové a skalnaté svahy, vrcholy, hřebeny	5–45+	různá	400–620 (–760)	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH 1, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Melica nutans*, *Poa nemoralis*, *Prenanthes purpurea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5J5	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **vlhčí**	4,9	BK 24–30, JV, JS, JL 24–30	RNne‘, RNse‘, RNme‘	ph; k–b	fylit, zelená břidlice	suťové a skalnaté konkávní svahy	5–45+	různá	400–620 (–760)	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH 1, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Polystichum aculeatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5J7	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **specifická – vrcholový fenomén**	2,1	BK 20–24, JV 22–24	RNse‘, RNte‘, LIme‘	ph; k–kh	bazaltandezit, tuf bazaltandezitu	suťové a skalnaté vrcholy, hřebeny	5–45+	různá	400–620 (–760)	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH 1, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Senecio ovatus*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5J8	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **specifická – vápencová**	1,5	BK 24–28, JV, JS, JL 24–28	RZs, RZt, RZn, LIce‘	ph–h; k–kh	(dolomitický) krystalický vápenec, krystalický dolomit	suťové a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	500–760	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH 1, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Cephalanthera damasonium*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Dryopteris filix-mas*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Polystichum aculeatum*, *Sanicula europaea*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

5J9	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **specifická – roklinová**	101,1	JS 26–30, JV 26–28, BK 26–30	PRn, RNne‘, RNke‘, KAsne'	ph–h; k–b	písčitý slínovec, fylit, bazaltandezit, zelená břidlice	skeletnaté rokle	22–45+	stinná	350–620 (–760)	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH 1, JS, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine*									
Poznámka											

1L

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
1L1	NÍŽINNÝ LUH **modální**	0,2	DBL 28–34, JS 28–34	FLme‘, FLke‘, FLge‘	h–jh	holocénní fluviální hlína na slínovci	říční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	240–260	DBL 3–5, JLM 1–3, JLV 1–3, JS 1–3, LP, HB, JVM, BB, JSÚ
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Brachypodium sylvaticum*, *Circaea lutetiana*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Gagea lutea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Impatiens noli-tangere*, *Lamium maculatum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus caesius*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

2L

2L1	PAHORKATINNÝ LUH **modální**	3,7	DBL 26–30, JS 26–34	FLme‘, FLke‘, FLge‘	ph–jh	holocénní fluviální hlína na slínovci	nivy větších potoků a říček (fluviální roviny)	0–5	—	260–360	DBL 3–5, JS 1–3, JLM 1, JLV 1, JVM, OLL, LP, HB, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Ficaria verna*, *Gagea lutea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Glechoma hederacea*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nummularia*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

2L5	PAHORKATINNÝ LUH **vlhčí**	102,8	DBL 26–30, JS 26–34	FLge‘, FLqe‘, GLfe‘	h–jh	holocénní fluviální hlína na slínovci	nivy větších potoků a říček (fluviální roviny)	0–5	—	260–360	DBL 3–5, JS 1–3, JLM 1, JLV 1, JVM, OLL, LP, HB, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cirsium oleraceum*, *Filipendula ulmaria*, *Gagea lutea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geum rivale*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Petasites hybridus*, *Phalaris arundinacea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3L

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3L1	JASANOOLŠOVÝ LUH **modální**	485,6	OLL 24–28, JS 24–30	FLme‘(g‘), FLke‘(g‘), FLge‘	ph–h	holocénní fluviální hlína	potoční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	300–500 (–600)	OLL 5–7, JS 1–3, JV, DBL, JLH, JLV, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cirsium oleraceum*, *Ficaria verna*, *Filipendula ulmaria*, *Gagea lutea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geum rivale*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Leucojum vernum*, *Lycopus europaeus*, *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Primula elatior*, *Ranunculus lanuginosus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3L5	JASANOOLŠOVÝ LUH **vlhčí**	30,7	OLL 26–28, JS 26–30	FLqe‘, GLfe‘	h–jh	holocénní fluviální hlína	potoční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	300–500 (–600)	OLL 5–7, JS 1–3, JV, DBL, JLH, JLV, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Carex acuta*, *Carex brizoides*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum arvense*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Leucojum vernum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Primula elatior*, *Ranunculus lanuginosus*, *Scirpus sylvaticus*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3L9	JASANOOLŠOVÝ LUH **specifický – prameništní**	119,7	OLL 22–26, JS 24–26	GLme‘, GLqe‘	ph–jh	slínovec, pískovec, fylit, deluviální hlína	prameniště ve sníženinách plošin a mírných (středních) svahů	0–15	různá	300–500 (–600)	OLL 5–7, JS 1–3, JV, DBL, JLH, JLV, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum palustre*, *Equisetum sylvaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Leucojum vernum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis palustris* agg., *Phalaris arundinacea*, *Primula elatior*, *Ranunculus lanuginosus*, *Scirpus sylvaticus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

5L

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5L1	MONTÁNNÍ (JASANO)OLŠOVÝ LUH **modální**	34,7	OLL/OLS 24–26, JS 24–26	FLma‘(g‘), FLka‘(g‘), FLga‘	ph–h; (š)	holocénní fluviální hlína	potoční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	450–640 (–740)	OLL 7–9, JS 1–3, SM, KL, JD, JLH
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cirsium oleraceum*, *Ficaria verna*, *Filipendula ulmaria*, *Gagea lutea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geum rivale*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Leucojum vernum*, *Lycopus europaeus*, *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Primula elatior*, *Ranunculus lanuginosus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

5L9	MONTÁNNÍ (JASANO)OLŠOVÝ LUH **specifický – prameništní**	32,2	OLL/OLS 22–26, JS 24	GLma‘, GLqa‘	ph–h	fylit, pískovec, jílovec, deluviální hlína	prameniště ve sníženinách plošin a mírných (středních) svahů	0–15	různá	450–640 (–740)	OLL 7–9, JS 1–3, SM, KL, JD, JLH
	Bylinné patro (80–100 %):	*Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum palustre*, *Equisetum sylvaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Leucojum vernum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis palustris* agg., *Phalaris arundinacea*, *Primula elatior*, *Ranunculus lanuginosus*, *Scirpus sylvaticus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3U

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3U1	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **modální**	339,6	JS, JV 28–32, BK 26–30	KAm(v)g'e', KAge', FLke', (GLfke')	ph–h; (š–k)	pískovec, jílovec, písčitý slínovec, fluviálně-deluviální hlína	úžlabiny vodotečí	0–22	převážně stinná	260–480	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JD, OLL, JLM, JLH, JLV, LP, HB, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3U5	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **vlhčí**	41,7	JS, JV 28–32, BK 26–30, OLL 26–28	FLke', FLge', GLfke', KAfge'	ph–jh	deluviálně-fluviální hlína, (pískovec, slínovec, sprašová hlína)	širší úžlabiny s aluvii	0–15	různá	260–480	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JD, OLL, JLM, JLH, JLV, LP, HB, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Leucojum vernum*, *Lycopus europaeus*, *Petasites albus*, *Phalaris arundinacea*, *Primula elatior*, *Ranunculus lanuginosus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3U7	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **skeletnatější**	0,5	JS, JV 28–32, BK 26–30	KAm(v)s'e', KAse', (FLye')	ph–h; š–k	pískovec, jílovec, vápnitý prachovec, (fluviálně-deluviální hlína)	kamenité úžlabiny vodotečí	15–45+	převážně stinná	260–480	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JLH, JLM, JLV, JD, LP, HB, BB, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

5U

5U1	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **modální**	681,7	SM 30–32, JV, BK 26–32, JS 28–32	KAmg'a'(e'), KAga'(e'), FLka'(e'), (GLfka'(e'))	ph–h; (š–k)	fylit, bazaltandezit, zelená břidlice, fluviálně-deluviální hlína	zaříznutá koryta potoků	0–22	převážně stinná	400–700 (–860)	JV 1–3, JS 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH, SM, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5U5	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **vlhčí**	103,9	SM 30–32, JV, BK 26–32, JS 28–32	FLka‘(e‘), FLga‘(e‘), GLfka‘(e‘), KAfga‘(e‘)	ph–jh; (š)	deluviálně-fluviální hlína, (fylit, písčitý slínovec)	širší úžlabiny s aluvii	0–15	různá	400–700 (–860)	JV 1–3, JS 1–3, OLL 1–3, BK, JLH, LP, JD, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Carex sylvatica*, *Crepis paludosa*, *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Leucojum vernum*, *Lycopus europaeus*, *Petasites albus*, *Primula elatior*, *Ranunculus lanuginosus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*, *Valeriana officinalis*									
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

5U7	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **skeletnatější**	6,3	SM 30–32, JV, BK 26–32, JS 28–32	KAm(v)s‘e‘, KAse‘, (FLye‘)	ph–h; š–k	pískovec, jílovec, vápnitý prachovec, (fluviálně-deluviální hlína)	kamenité zaříznuté úžlabiny potoků	15–45+	převážně stinná	400–700 (–860)	JV 1–3, JS 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH, SM, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*									
	Mechové patro:	*Mnium* sp. div.									
Poznámka											

1V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
1V1	VLHKÁ HABROVÁ DOUBRAVA **modální**	18,5	DBL 28–32, LP 28–30, JS 30–32	PRkg, PRpg, HNg, (GLke‘)	h–jh	slínovec, sprašová hlína	plošiny, roviny, úžlabiny	0–15	různá	240–300	DB 3–5, JS 1–3, HB 1–3, LP 1, HB 1, JLM, JLV, JVM, OLL, BB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Geum urbanum*, *Impatiens noli-tangere*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

2V

2V3	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	80,1	DBL 28–32, LP 28–30, JS 30–32	PRkg, PRpg, HNg, (GLke‘)	h–jh	slínovec, písčitý slínovec, vápnitý jílovec, sprašová hlína	plošiny, úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	260–340 (–380)	DB 3–5, BK 1–3, JV 1, JS 1, JD 1, HB, LP, JLM, JLV, OLL, BB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Filipendula ulmaria*, *Geum urbanum*, *Lycopus europaeus*, *Myosotis palustris* agg., *Pulmonaria officinalis* agg., *Ranunculus repens*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

2V9	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **specifická – podmáčená**	0,2	DBL 28–32, LP 28–30, JS 30–32	GLke‘, GLme‘, (PGqve‘)	h–jh	slínovec, sprašová hlína	plošiny, svahová prameniště	0–22	různá	260–340 (–380)	DB 3–5, BK 1–3, JV 1, JS 1, JD 1, HB, LP, JLM, JLV, OLL, BB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Filipendula ulmaria*, *Geum urbanum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Lycopus europaeus*, *Myosotis palustris* agg., *Pulmonaria officinalis* agg., *Ranunculus repens*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

3V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3V1	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	137,9	JS, JV, BK 28, SM 28–30	KA(v)ga‘(e‘), KA(v)qa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph–h; (š–k)	pískovec, písčitý slínovec, fylit, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum sylvaticum*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Petasites albus*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

3V2	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	170,4	JS, JV, BK 26, SM 28–30	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	pískovec, arkóza, fylit, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Galeobdolon luteum* agg., *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula pilosa*, *Mycelis muralis*, *Petasites albus*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Stellaria nemorum*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3V3	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	41,2	JS, JV, BK 28–32, SM 28–32	KA(v)ge‘, KA(v)qe‘, HNg, (GLke‘)	ph–jh; (š–k)	slínovec, pískovec, sprašová a deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Galeobdolon luteum* agg., *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

3V9	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	19,6	JS, JV 26–30, SM 28–30	GLka‘(e‘), GLma‘(e‘), (KAqa‘(e‘))	ph–jh; (š)	pískovec, písčitý slínovec, fylit, deluviální hlína	plošiny, svahová prameniště	0–22	různá	320–460	BK 3–5, DBL 1–3, JD 1–3, OLL, JS, JV, LP, JLH, JLM, JLV, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rivulare*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

4V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4V1	VLHKÁ BUČINA **modální**	330,9	BK 28–30, SM 28–30, JD 26–30	KA(v)ga‘(e‘), KA(v)qa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph–h; (š–k)	pískovec, písčitý slínovec, bazaltandezit, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	360–540	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Petasites albus*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

4V2	VLHKÁ BUČINA **chudší**	192,8	BK 26–30, SM 28–30, JD 26–28	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	pískovec, odvápněný písčitý slínovec, arkóza, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	360–540	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum sylvaticum*, *Galeobdolon luteum* agg., *Glechoma hederacea*, *Luzula pilosa*, *Mycelis muralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Stellaria nemorum*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4V3	VLHKÁ BUČINA **bohatší**	14,9	BK 28–30, SM 28–30, JD 26–30	KA(v)ge‘, KA(v)qe‘, (GLke‘)	ph–h; (š–k)	pískovec, písčitý slínovec, dacit, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	360–540	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

4V7	VLHKÁ BUČINA **skeletnatější**	4,7	BK 28–30, SM 28–30, JD 26–30	KA(v)ga‘(e‘), KA(v)qa‘(e‘)(s‘)	ph–h; (š–k)	prachovec, pískovec, písčitý slínovec, (deluviální hlína)	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	360–540	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Athyrium filix-femina*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Petasites albus*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4V9	VLHKÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	8,5	BK 28–30, SM 28–30, JD 26–30	GLka‘(e‘), GLma‘(e‘), (KAqa‘(e‘))	ph–h; (š)	pískovec, písčitý slínovec, bazaltandezit, deluviální hlína	plošiny, svahová prameniště	0–22	různá	360–540	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1–3, OLL, JS, JV, JLH, LP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lycopus europaeus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rivulare*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

5V

5V1	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	271,3	SM 30–32, JV 26–30, BK 26–30, JD 26–32	KA(v)ga‘(e‘), KA(v)qa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph–h; (š–k)	pískovec, písčitý slínovec, fylit, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	400–640	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OLL, OLS, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5V2	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	350,8	SM 30–32, JV 26–30, BK 26–30, JD 26–32	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	fylit, pískovec, odvápněný písčitý slínovec, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	400–640	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OLL, OLS, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Galeobdolon luteum* agg., *Luzula pilosa*, *Mycelis muralis*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Stellaria nemorum*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

5V3	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	89,0	SM 30–32, JV 26–30, BK 26–30, JD 26–32	KAge‘(a‘), KAqe‘(a‘), (GLke‘(a‘))	ph–h; (š–k)	fylit, svor, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	400–640	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OLL, OLS, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5V9	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	81,7	SM 30–32, JV 26–30, JS 26–30, JD 26–32	GLka‘(e‘), GLma‘(e‘), (KAqa‘(e‘))	ph–h; (š)	fylit, pískovec, písčitý slínovec, deluviální hlína	pošiny, svahová prameniště	0–22	různá	400–640	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, OLL 1, SM, JS, OLS, JLH, LP, JVM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum sylvaticum*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lycopus europaeus*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rivulare*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

6V

6V1	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **modální**	18,8	BK 26–30, KL 26–30, SM 28–32, JD 26–32	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘, KPg)	hp–ph; (š–k)	fylit, svor, pískovec, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	460–860	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL 1–3, JS, JLH, OLL, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Cicerbita alpina*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Luzula pilosa*, *Petasites albus*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Stellaria nemorum*, *Streptopus amplexifolius*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

6V3	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **bohatší**	16,9	BK 26–30, KL 26–30, SM 28–32, JD 26–32	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLke‘a‘(e‘))	ph; (š–k)	fylit, deluviální hlína	svahové úžlabiny, mírné – střední svahy	0–22	různá	460–860	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL 1–3, JS, JLH, OLL, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Cicerbita alpina*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Homogyne alpina*, *Impatiens noli-tangere*, *Mercurialis perennis*, *Petasites albus*, *Ranunculus platanifolius*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Streptopus amplexifolius*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
6V9	VLHKÁ SMRKOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	10,3	BK 26–30, KL 26–30, SM 28–32, JD 26–32	GLka‘, GLma‘, (KAqa‘)	ph; (š)	fylit, deluviální hlína	plošiny, svahová prameniště	0–22	různá	460–860	BK 3–5, SM 1–3, JD 1–3, KL, OLL, OLS, JS, JLH
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Carex remota*, *Cicerbita alpina*, *Crepis paludosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Homogyne alpina*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*, *Ranunculus platanifolius*, *Senecio ovatus*, *Streptopus amplexifolius*, *Veratrum album* subsp. *lobelianum*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rivulare*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

2O

2O0	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLO(BUKOVÁ) DOUBRAVA **antropogenní**	14,3	DB 26–28, JD 24–28	ANg, ANpg, KAag	h–jh	slínovec, hlína (navážka)	plošiny	0–10	různá	240–340 (–380)	DB 7–9, JD 1–3, BK 1–3, LP 1, HB 1, JV, JS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Festuca gigantea*, *Fragaria vesca*, *Galium odoratum*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Oxalis acetosella*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Ranunculus repens*, *Sanicula europaea*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

2O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLO(BUKOVÁ) DOUBRAVA **modální**	81,1	DB 24–28, JD 24–28	PRkg, PGva‘, HNlg, LUga‘	h–jh	slínovec, vápnitý jílovec, písčitý slínovec, sprašová hlína	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	240–340 (–380)	DB 7–9, JD 1–3, BK 1–3, LP 1, HB 1, JV, JS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Fragaria vesca*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nummularia*, *Oxalis acetosella*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Ranunculus repens*, *Rubus* sect. *Rubus*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2O2	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLO(BUKOVÁ) DOUBRAVA **chudší**	1,7	DB 24–26, JD 24–28	PRkg, PGva‘	h–jh	písčitý slínovec	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	240–340 (–380)	DB 7–9, JD 1–3, BK 1–3, LP 1, HB 1, JV, JS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Fragaria vesca*, *Juncus effusus*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nummularia*, *Oxalis acetosella*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Ranunculus repens*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											
2O3	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLO(BUKOVÁ) DOUBRAVA **bohatší**	266,6	DB 26–28, JD 24–28	PRkg, PGve‘(a‘), HNlg, LUge‘(a‘)	h–jh	slínovec, vápnitý jílovec, písčitý slínovec, sprašová hlína	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	240–340 (–380)	DB 7–9, JD 1–3, BK 1–3, LP 1, HB 1, JV, JS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Juncus effusus*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Ranunculus repens*, *Sanicula europaea*, *Stachys sylvatica*									
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											
2O5	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLO(BUKOVÁ) DOUBRAVA **vlhčí**	2,1	DB 26–28, JD 24–28	PGva‘(e‘), PGpa‘(e‘), (PRpg)	h–jh	slínovec, vápnitý jílovec, písčitý slínovec	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	240–340 (–380)	DB 7–9, JD 1–3, BK 1–3, LP 1, HB 1, JV, JS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Fragaria vesca*, *Juncus effusus*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nummularia*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia arundinacea*), *Oxalis acetosella*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Ranunculus repens*, *Rubus* sect. *Rubus*									
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

3O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **modální**	106,4	DB 24–28, BK 24–28, JD 24–28	PGk(v)a‘, PGla‘, KA(v)ga‘, LUga‘, (PRkg)	ph–jh	pískovec, vápnitý jílovec, písčitý slínovec, (sprašová) hlína	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	320–480	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex brizoides*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Ranunculus repens*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

3O3	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **bohatší**	69,6	DB 26–28, BK 24–28, JD 24–28	PGk(v)a‘(e‘), KA(v)ga‘(e‘), LUga‘(e‘), PRkg	ph–jh	slínovec, vápnitý jílovec, písčitý slínovec, (sprašová) hlína	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	320–480	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Melica nutans*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

4O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	145,9	JD 24–28, DBL 24–26, SM 28	PGk(v)a‘, PGma‘, KA(v)ga‘, (LUga‘)	ph–jh	pískovec, prachovec, písčitý slínovec, hlinitý překryv	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	380–500	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia arundinacea*), *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Ranunculus repens*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

4O3	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **bohatší**	2,5	JD 26–30, DBL 26–28, SM 30	PGk(v)a‘(e‘), PGma‘(e‘), KA(v)ga‘(e‘), (LUga‘(e‘))	ph–jh	prachovec, vápnitý jílovec, hlinitý překryv	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	380–500	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Melica nutans*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Sanicula europaea*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

5O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ (BUKOVÁ) JEDLINA **modální**	319,4	JD 26–30, SM 26–30	PGka‘, PGma‘, KAga‘	ph–jh	pískovec, prachovec, písčitý slínovec, hlinitý překryv	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	420–560 (–600)	JD 5–7, BK 1–3, SM, OS, LP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Carex brizoides*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus effusus*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia arundinacea*), *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

6O

6O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	54,5	SM, BK 26–30, JD 26–30	PGka‘, PGma‘, KAga‘, (KPg)	ph–h; (š)	fylit, svor, prachovec, hlinitý překryv	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	500–700	JD 3–5, BK 1–3, SM 1–3, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calamagrostis villosa*, *Cicerbita alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Juncus effusus*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg., *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio ovatus*, *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Eurhynchium striatum*, *Mnium* sp. div.									
Poznámka											

2P

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2P0	OGLEJENÁ KYSELÁ DOUBRAVA S JEDLÍ **antropogenní**	2,0	DB 22–24, JD 22–24, BO, SM 24	ANg, ANrg, KAagd, KAargd	hp; (š)	zahliněný štěrkopísek (navážka)	plošiny	0–5	různá	260–360	DB 5–7, JD 1–3, BK, BO, BR, OS, SM
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2P1	OGLEJENÁ KYSELÁ DOUBRAVA S JEDLÍ **modální**	7,9	DB 22–24, JD 22–24, BO, SM 24	PGkd, KAgd	hp–h; (š)	zahliněný štěrkopísek, hlinitý překryv	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	260–360	DB 5–7, JD 1–3, BK, BO, BR, OS, SM
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3P

3P0	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	1,0	DB 22–26, JD 22–26, BO, SM 24–26	ANg, ANrg, KAagd, KAargd	ph–h; (š)	zahliněný štěrkopísek (navážka)	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–5	různá	320–440	DB 3–5, JD 1–3, BK 1–3, SM, BR, OS, BO
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3P1	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **modální**	3,2	DB 22–26, JD 22–26, BO, SM 24–26	PGkd, KAgd	hp–h; (š)	pískovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	320–440	DB 3–5, JD 1–3, BK 1–3, SM, BR, OS, BO
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4P

4P1	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	384,2	JD 22–26, DB 22, SM 26	PGd, PGkd, KAgd(l), LUgd	ph–jh; (š)	pískovec, prachovec, jílovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	340–480	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1, BO 1, SM, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg., *Pteridium aquilinum*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

4P2	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA **chudší**	0,9	JD 22–24, DB 22, SM 24	PGd(z'), PGkd(z'), KAgd(z')	ph–h; (š)	pískovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	340–480	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1, BO 1, SM, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5P

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5P0	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **antropogenní**	2,0	JD 24–28, SM 26–28	ANg, ANpg, KAagd, KAapgd	jhp	písčitý jíl (navážka)	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–5	různá	420–560	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO 1, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Pteridium aquilinum*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiothecium curvifolium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5P1	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **modální**	807,3	JD 24–28, SM 26–28	PGd, PGkd, KAgd, KAgld	ph–h; (š)	pískovec, prachovec, jílovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	420–560	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO 1, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Pteridium aquilinum*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum capillifolium* s. l.									
Poznámka											
5P2	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **chudší**	132,8	JD 22–24, SM 22–26	PGd(z'), PGkd(z'), KAgd(z')	ph–h; (š)	pískovec, arkóza, hlinitý překryv	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	420–560	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO 1, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6P

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
6P1	OGLEJENÁ KYSELÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	251,1	SM 24–28, JD 24–28	PGd, KPg	ph–h; (š)	pískovec, prachovec, fylit, hlinitý překryv	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	500–700	JD 5–7, SM 3–5, BK 1, BO 1, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Luzula pilosa*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum capillifolium* s. l.									
Poznámka											

0Q

0Q1	OGLEJENÝ CHUDÝ BOR **modální**	14,3	BO 20–22, SM 18–20	PZrg, PGdz‘	p–jhp	křídový křemenný pískovec (zahliněný)	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	360–420	BO 7–9, BR 1–3, DB 1–3, JD 1, SM, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* s. str., *Nardus stricta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

2Q

2Q4	OGLEJENÁ CHUDÁ DOUBRAVA S JEDLÍ **sušší**	20,4	DB 18–20, JD 18–20, BO 20	PGdz‘, PZg, PZrg, KAgdz‘	hp–jhp; (š)	zahliněný štěrkopísek, jílovec	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	260–360	DB 5–7, JD 1–3, BO 1, BR, OS, BK, SM
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4Q

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	44,6	DB 18–20, JD 20–22, BO, SM 20–22	PGdz', PZg, PZrg	hp–h; (š)	křídový křemenný pískovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	340–480	JD 5–7, DB 3–5, BO 1, BR 1, SM 1, BK, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Nardus stricta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5Q

5Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ JEDLINA **modální**	13,2	JD 20–22, BO, SM 20–24	PGdz', PZg, PZrg	hp–h; (š)	křídový křemenný pískovec, hlinitý překryv	pošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	420–560	JD 5–7, SM 1–3, BO 1, BK 1, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Nardus stricta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

6Q

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	45,5	SM 22–24, JD 22–24	PGdz‘, PZg, PZq, KPg	ph; (š)	křídový křemenný pískovec, fylit, hlinitý překryv	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	500–700	JD 5–7,SM 3–5, BO 1, BK, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* s. str., *Nardus stricta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

6Q5	OGLEJENÁ CHUDÁ SMRKOVÁ JEDLINA **vlhčí**	12,7	SM 22–24, JD 22–24	PGqdz‘, PZq, KPq	ph–jhp; (š)	křídový křemenný pískovec, hlinitý překryv	plošiny, (mírné konkávní svahy)	0–10	různá	500–700	JD 5–7,SM 3–5, BO 1, BK, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Calluna vulgaris*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* s. str., *Nardus stricta*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum capillifolium* s. l., *Sphagnum recurvum* s. l.									
Poznámka											

1G

1G1	MOKŘADNÍ OLŠINA **modální**	13,5	OLL 26–28	GLqe‘(a‘), GLme‘(a‘), GLoe‘(a‘)	h–jh	slínovec, vápnitý jílovec, hlína	plošiny, roviny (v okolí rybníků)	0–5	—	240–500	OLL 7–9, VR 1–3, JS, TPC, TPB, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (90–100 %):	*Caltha palustris*, *Carex acuta*, *Carex acutiformis*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Carex riparia*, *Carex vesicaria*, *Cirsium oleraceum*, *Deschampsia cespitosa*, *Filipendula ulmaria*, *Iris pseudacorus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Phalaris arundinacea*, *Phragmites australis*, *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1G4	MOKŘADNÍ OLŠINA **sušší**	0,6	OLL 24–26	GLme‘(a‘), (GLke‘(a‘))	h–jh	slínovec, vápnitý jílovec, hlína	pošiny, roviny (v okolí rybníků)	0–5	různá	240–500	OLL 7–9, JS 1–3, JV, KL, VR, TPC, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (90–100 %):	*Caltha palustris*, *Carex acuta*, *Carex acutiformis*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Deschampsia cespitosa*, *Filipendula ulmaria*, *Iris pseudacorus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Phalaris arundinacea*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

4G

4G1	GLEJOVÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	12,4	SM, JD 26, DBL 24	GLma‘, SGma‘	ph–jh	pískovec, prachovec, slínovec, hlinitý sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	(340–)380–480	JD 5–7, DBL 3–5, OLL 1, SM, OS, BR, OLS, BK
	Bylinné patro (70–90 %):	*Caltha palustris*, *Carex canescens*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Crepis paludosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha aquatica*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia arundinacea*), *Ranunculus repens*, *Valeriana dioica*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

5G

5G1	GLEJOVÁ JEDLINA **modální**	81,8	JD 26–30, SM 26–30	GLma‘(o‘), SGma‘(o‘)	ph–jh	pískovec, prachovec, písčitý slínovec, hlinitý sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	420–560 (–600)	JD 5–7, SM 1–3, OLL 1, BK, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex canescens*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Crepis paludosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha aquatica*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia arundinacea*), *Ranunculus repens*, *Valeriana dioica*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

6G

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6G1	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	29,7	SM 28–32, JD 28–32	GLma‘(o‘), GLoa‘, SGma‘(o‘)	ph–jh	pískovec, prachovec, fylit, hlinitý sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	500–700	JD 3–5, SM 3–5, OLS 1, OLL, OS, BK, BR, BRP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *Carex canescens*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Cicerbita alpina*, *Crepis paludosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Homogyne alpina*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha aquatica*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Ranunculus repens*, *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*, *Valeriana dioica*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											
6G2	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA **chudší**	40,7	SM 26–30, JD 26–30	GLmd‘m‘(o‘), GLod‘m‘, SGmd‘m‘(o‘)	ph–jh; (š)	pískovec, prachovec, fylit, hlinitý sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	500–700	JD 3–5, SM 3–5, OLS 1, OLL, OS, BK, BR, BRP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

7G

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
7G1	GLEJOVÁ JEDLOVÁ SMRČINA **modální**	9,2	SM 24–28, JD 22–26	GLod'm', GLmd'm'o', SGod'm'	ph–h; (š)	fylit, svor, hlinitý sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	650–780	SM 7–9, JD 1–3, OLS 1, BRP, JR, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Athyrium filix-femina*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cicerbita alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* s. str., *Oxalis acetosella*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

7G2	GLEJOVÁ JEDLOVÁ SMRČINA **chudší**	4,7	SM 24–28, JD 22–26	GLod', GLmd'o', SGod'	ph–h; (š)	fylit, svor, hlinitý sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	650–780	SM 7–9, JD 1–3, OLS 1, BRP, JR, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Carex canescens*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Homogyne alpina*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* s. str., *Oxalis acetosella*, *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

0T

0T1	GLEJOVÝ CHUDÝ BŘEZOVÝ BOR **modální**	2,6	BO 18–22, SM 20–22	PZqo', PZqro', GLoz', GLorz'	p–jhp; (hrp)	křídový křemenný pískovec, hlína	poklesliny na plošinách	0–5	—	380–520	BO 7–9, BRP 1–3, BR 1–3, SM 1, DBL, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Eriophorum vaginatum*, *Molinia caerulea* s. str., *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Polytrichum commune*, *Sphagnum capillifolium* s. l., *Sphagnum palustre*									
Poznámka											

1T

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1T8	MOKŘADNÍ BŘEZOVÁ OLŠINA **specifická – slatinná**	1,4	OLL 20–24	GLod‘	hp–jhp	pískovec, hlína	poklesliny, plochá údolní dna, okolí rybníků	0–5	—	380–440	OLL 7–9, BR 1–3, BRP 1–3, SM 1, OS, JR, OLS
	Bylinné patro (90–100 %):	*Calamagrostis canescens*, *Carex acuta*, *Carex acutiformis*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Carex rostrata*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Lysimachia vulgaris*, *Peucedanum palustre*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

1T9	MOKŘADNÍ BŘEZOVÁ OLŠINA **specifická – se smrkem**	0,4	OLL/OLS 20–22, SM 22–26	GLqd‘, GLmd‘o‘	hp–jhp	pískovec, hlína	poklesliny, plochá údolní dna, ploché úžlabiny	0–5	—	400–650	OLL(OLS) 6–8, SM 2–3, BRP 1–3, BR 1–3, OS, JR
	Bylinné patro (90–100 %):	*Calamagrostis canescens*, *Carex acutiformis*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Carex rostrata*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Lysimachia vulgaris*, *Peucedanum palustre*, *Viola palustris*									
	Mechové patro:	*Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

5T

5T5	GLEJOVÁ CHUDÁ JEDLINA **vlhčí**	0,7	JD 22–24, BO, SM 22–24	GLoz‘, GLmo‘z‘, SGod‘u‘	ph–jhp; (š)	prachovitý pískovec, hlinitý sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	450–500	JD 5–7, SM 1–3, BR 1, BRP 1, BO, OLL, OLS, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg. (převážně *Molinia caerulea* s. str.), *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

6T

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6T1	GLEJOVÁ CHUDÁ JEDLOVÁ SMRČINA **modální**	3,6	SM 24–26, JD 20–24	GLoz‘, GLmo‘z‘, SGod‘u‘	ph–h	fylit, hlinitý sediment	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	650–780	SM 7–9, JD 1–3, BRP 1, OLS, JR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* s. str., *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

1R

1R3	RAŠELINNÁ OLŠINA **bohatší**	0,9	OLL 20–24	ORsam‘, ORqm‘	org, (h)	organický sediment	poklesliny na rovinách s prameništi, úžlabiny	0–5	různá	240–500	OLL 7–9, BRP 1–3, SM 1, BR, OS, OLS, VR
	Bylinné patro (90–100 %):	*Calamagrostis canescens*, *Caltha palustris*, *Carex acuta*, *Carex brizoides*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Iris pseudacorus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Peucedanum palustre*, *Phalaris arundinacea*, *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*										
	Mechové patro:	*Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

5R

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5R1	KYSELÁ RAŠELINNÁ BOROVÁ SMRČINA **modální**	2,3	SM 22–26, BO 22–26	ORfid‘, ORqd‘	org, (hp)	organický sediment na křídovém křemenném pískovci	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	440–500	SM 5–7, BO 1–3, BRP 1, OLS, OLL, OS
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex canescens*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

6R

6R1	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ SMRČINA **modální**	0,4	SM 28–32	ORmem‘, ORqm‘	org, (ph)	organický sediment na křídovém křemenném pískovci	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích), ploché úžlabiny	0–10	různá	500–720	SM 7–9, OLS 1, BRP, OS, OLL, JD
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex canescens*, *Carex remota*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lysimachia vulgaris*, *Oxalis acetosella*, *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6R9	SVĚŽÍ RAŠELINNÁ SMRČINA **specifická – zbahnělá**	1,2	SM 28–32, OLL/OLS 24–26	ORmem‘	org	organický sediment (na fylitu)	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích) a rovinách s prameništi	0–10	různá	500–720	SM 7–9, OLL(OLS) 1–3, BRP, OS, JD
	Bylinné patro (60–80 %):	*Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Cirsium palustre*, *Crepis paludosa*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Juncus conglomeratus*, *Streptopus amplexifolius*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

7R

7R1	KYSELÁ RAŠELINNÁ SMRČINA **modální**	1,1	SM 22–26	ORfid‘, ORqd‘	org, (hp)	organický sediment na křídovém křemenném pískovci	poklesliny na plošinách (mírných konkávních svazích)	0–10	různá	500–720	SM 9–10, BRP 1, JR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis villosa*, *Carex canescens*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Homogyne alpina*, *Streptopus amplexifolius*, *Trientalis europaea*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Plagiothecium* sp. div., *Polytrichum commune*, *Sphagnum capillifolium* s. l., *Sphagnum palustre*									
Poznámka											

POUŽITÉ ZKRATKY A JMÉNA DŘEVIN:

ZKRATKA	ČESKÉ JMÉNO	VĚDECKÉ JMÉNO
SM	smrk ztepilý	***Picea abies*** (L.) H. Karst.
JD	jedle bělokorá	***Abies alba*** Mill.
BO	borovice lesní	***Pinus sylvestris*** L.
BOR	borovice vystoupavá rašelinná	***Pinus ×ascendens*** Businský **nothosubsp.** ***skalickyi*** Businský
KOS	borovice kleč	***Pinus mugo*** Turra
BL	borovice pyrenejská blatka	***Pinus uncinata*** Ramond ex DC. **subsp.** ***uliginosa*** (G. E. Neumann) Businský
MD	modřín opadavý	***Larix decidua*** Mill**.**
TS	tis červený	***Taxus baccata*** L.
DB	dub letní a okruh dubu zimního	***Quercus robur*** L. + ***Q***. ***petraea*** **agg.**
DBL	dub letní	***Quercus robur*** L.
DBZ	dub zimní, okruh blízce příbuzných druhů	***Quercus petraea*** **agg.**
DBP	dub pýřitý, okruh blízce příbuzných druhů	***Quercus pubescens*** **agg.**
CER	dub cer	***Quercus cerris*** L.
BK	buk lesní	***Fagus sylvatica*** L.
HB	habr obecný	***Carpinus betulus*** L.
JV	javor mléč a j. klen	***Acer platanoides*** L. + ***A***. ***pseudoplatanus*** L.
JVM	javor mléč	***Acer platanoides*** L.
KL	javor klen	***Acer pseudoplatanus*** L.
BB	javor babyka	***Acer campestre*** L.
JS	jasan ztepilý	***Fraxinus excelsior*** L.
JSU	jasan úzkolistý podunajský	***Fraxinus angustifolia*** Vahl **subsp.** ***danubialis*** Pouzar
JL	jilm drsný, j. habrolistý a j. vaz	***Ulmus glabra*** Huds. + ***U***. ***minor*** Mill. + ***Ulmus laevis*** Pall.
JLM	jilm habrolistý	***Ulmus minor*** Mill.
JLH	jilm drsný	***Ulmus glabra*** Huds.
JLV	jilm vaz	***Ulmus laevis*** Pall.
BR	bříza bělokorá	***Betula pendula*** Roth
BRP	bříza pýřitá nebo bříza karpatská	***Betula pubescens*** Ehrh**.** / ***Betula carpatica*** Waldst. et Kit. ex Willd.
JR	jeřáb ptačí	***Sorbus aucuparia*** L.
BRK	jeřáb břek	***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz
MK	jeřáb muk, okruh blízce příbuzných druhů	***Sorbus aria*** **agg.**
TR	třešeň ptačí	***Prunus avium*** (L.) L.
STR	střemcha obecná	***Prunus padus*** L.
LP	lípa srdčitá a l. velkolistá	***Tilia cordata*** Mill. + ***T***. ***platyphyllos*** Scop.
LPM	lípa srdčitá (l. malolistá)	***Tilia cordata*** Mill.
OLL	olše lepkavá	***Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn.
OLS	olše šedá	***Alnus incana*** (L.) Moench
OS	topol osika	***Populus tremula*** L.
TPB	topol bílý	***Populus alba*** L.
TPC	topol černý	***Populus nigra*** L.
JIV	vrba jíva	***Salix caprea*** L.

ZKRATKA	ČESKÉ JMÉNO	VĚDECKÉ JMÉNO
VR	vrba bílá, v. křehká a jejich kříženec	***Salix alba*** L. + ***S. euxina*** L. V. Belyaeva + ***S.*** ×***rubens*** Schrank
VRD	vrba dvoubarvá	***Salix bicolor*** Willd.
VRE	vrba šedá	***Salix elaeagnos*** Scop.
VRN	vrba nachová	***Salix purpurea*** L.
VRS	vrba slezská	***Salix silesiaca*** Willd.
VRT	vrba trojmužná	***Salix triandra*** L.

Česká a vědecká jména dřevin a vymezení druhových agregátů (agg.) odpovídá Seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka et al. 2012).

SYNUZIE PODROSTU

Synuzie podrostu představuje abecedně seřazený výpis druhů bylinného a mechového patra charakteristický pro konkrétní lesní typ. Výběr charakteristických druhů byl vytvořen na základě empirického rozboru lesnicko-typologických zápisů, které byly pořízeny v porostech s dřevinnou skladbou blízkou skladbě potenciálně přirozené, tj. přibližně odpovídající stupni přirozenosti 4–6 (Macků 2012). Většina synuzií podrostu byla převzata z charakteristik oblastních plánu rozvoje lesů I (1997–2001) a expertně revidována. V souvislosti s revizemi lesnicko-typologických map a úpravou Lesnicko-typologického klasifikačního sytému byl pro některé lesní typy vytvořen výpis charakteristických druhů synuzie podrostu zcela nový.

Taxonomické pojetí a nomenklatura druhů a poddruhů byla sjednocena podle národních seznamů cévnatých rostlin (Danihelka et al. 2012), mechorostů (Kučera et al. 2012) a lišejníků (Liška et al. 2008). Taxonomicky komplikované skupiny druhů nebo druhy, u kterých lze očekávat častější výskyt chyb při determinaci (např. *Molinia arundinacea* a *M. caerulea*), byly sloučeny do širších pojetí. V případě bylinného patra byly využity zejména agregáty (zkratka agg.) jednoznačně vymezené v Seznamu cévnatých rostlin České republiky (Danihelka et al. 2012). Výjimku tvoří lesní ostružiníky, které nejsou řazeny pod *Rubus fruticosus* agg., ale přímo do vnitrorodového taxonu *Rubus* sect. *Rubus*. U mechorostů, lišejníků a v omezené míře také u cévnatých rostlin bylo využito obecnějšího vymezení druhových skupin s pomocí zkratky „s. l.“ (viz níže). Vymezení těchto druhových skupin bylo převzato z Vegetace České republiky 4: Lesní a křovinná vegetace (Chytrý 2013). Pokud bylo možné jednoznačně odvodit konkrétní druh z širšího pojetí (např. z *Anthoxanthum odoratum* agg. v nižších polohách *Anthoxanthum odoratum* s. str.) nebo se alespoň dal předpokládat jeho častější výskyt v daném lesním typu (např. specifikem přírodní lesní oblasti), byl druh uveden samostatně nebo v závorce za zmiňovanou šířeji pojatou skupinou. Zejména jedinci mechů z rodu rašeliník (*Sphagnum*) a lišejníků z rodu dutohlávka (*Cladonia*) jsou při fytocenologickém popisu vegetace často určovány pouze na úroveň rodu, přesto i nejednoznačná informace o jejich prezenci je indikačně významná. Proto, pokud nejsou zmiňovány konkrétní druhy, následuje v těchto případech za rodovým jménem zkratka „sp. div.“, tj. ve smyslu přítomnosti více možných druhů rodu (nikoliv všech).

Do mechového patra jsou kromě mechorostů tradičně řazeny také lišejníky. Ve výpisu charakteristických druhů jsou uvedeny vždy po mechorostech za středníkem. Ačkoliv je pokryvnost mechového patra u řady lesních typů významným determinačním znakem (vysokou pokryvnost mívají zejména kyselá, živinami chudá a jinou než srážkovou vodou ovlivněná stanoviště), nebyla v podkladových materiálech uváděna konzistentně, a tudíž není zmiňována. Nicméně u lesních typů, kde jsou jednotlivé druhy (taxony) mechového patra uváděny, lze pokryvnost předpokládat vyšší.

Zkratky používané v synuziích podrostu:

agg. agregát (latinsky *aggregate*)
sect. sekce (latinsky *sectio*)
s. l. v širším smyslu, v širším pojetí (latinsky *sensu lato*)
s. str. v užším smyslu, v užším pojetí (latinsky *sensu stricto*)
sp. div. různé druhy rodu (latinsky *species diversae*)
subsp. poddruh (latinsky *subspecies*)

Literatura:

Danihelka, J., Chrtek, J. jun. & Kaplan, Z.: *Checklist of vascular plants of the Czech* Republic. Preslia 84, s. 647–811, 2012.

Kučera, J., Váňa, J. & Hradílek, Z.: *Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis*. Preslia 84, s. 813–850, 2012.

Liška, J., Palice, Z. & Slavíková, Š.: *Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic*. Preslia 80, s. 151–182, 2008.

Macků, J.: *Methodology for establishing the degree of naturalness of forest stands*. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, 5, s. 161–166, 2012.

RELIÉF, SKLON, EXPOZICE A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Charakteristiky sklon, expozice a nadmořská výška byly získány analýzou aktuálních lesnicko-typologických map. Rozpětí hodnot představuje interval mezi 5. a 95. percentilem. V závorce jsou uvedeny revidované krajní hodnoty, které přesáhly mezipercentilové rozpětí o více než 20 m u nadmořské výšky a 5° u sklonu.

Svahy se sklonem 5–10° jsou v reliéfu označeny jako mírné, se sklonem 10–22° jako střední, se sklonem 22–45° jako příkré a se sklonem > 45° jako strmé (srázné). Roviny a plošiny mají sklon 0–5°.

PŮDY

PŮDNÍ TYP

(velkými písmeny)

LI	litozem
RN	ranker
RZ	rendzina
PR	pararendzina
RG	regozem
FL	fluvizem
KO	koluvizem
SM	smonice
CE	černozem
CC	černice
SE	šedozem
HN	hnědozem
LU	luvizem
KA	kambizem
PE	pelozem
AD	andozem
KP	kryptopodzol
PZ	podzol
PG	pseudoglej
SG	stagnoglej
GL	glej
SR	solončak
SC	slanec
OR	organozem
KU	kultizem
AN	antropozem

subtyp

(malými písmeny)

a	antropický
an	andický (KA)
c	karbonátový
d	dystrický
e	povrchový (GL)
f	fluvický
fi	fibrický (OR)
g	oglejený
h	humusový (PZ)
h	humolitový (OR)
hr	hořečnatý (LI)
i	stratifikovaný (FL)
j	chromický (rubifikovaný)
k	kambický
l	luvický
m	modální
me	mezický (OR)
n	melanický
o	histický
p	pelický
pl	planický
q	glejový
q	akvický (GL)
r	arenický
s	suťový
s	rankerový
sa	saprický (OR)
su	sulfidický
t	litický
u	umbrický
v	vyluhovaný
ve	vertický (CE)
w	hydroeluviovaný
x	černický (CE)
y	psefitický
z	podzolový (RN)

subtypy kultizemě KU:

ho	hortická
ky	kypřená
ri	rigolovaná

subtypy antropozemě AN:

g	oglejená
h	humózní
hh	hlubokohumózní
in	intoxikovaná
ko	kontaminovaná
p	pelická
pk	překrytá
q	glejová
r	arenická
re	redukovaná
sk	skeletovitá
sp	spolická
su	sulfidická
te	terasovaná
ur	urbická

varieta

(malými písmeny s apostrofem)

a‘	mezobazická
b‘	eutrofní
c‘	slabě karbonátová
d‘	oligobazická (LI)
e‘	eubazická
g‘	slabě (hluboko) oglejená
h‘	humózní
k‘	kaolinitická
l‘	slabě luvická (KA)
n‘	mělce melanická
o‘	zrašelinělá
q‘	hluboko glejová
s‘	silně skeletovitá
u‘	mělce umbrická
v‘	slabě vyluhovaná
w‘	slabě hydroeluviovaná
x‘	hořečnatá
y‘	ortštejnová (PZ)
z‘	podzolovaná
z‘	železitá (PZ)

subvarieta

d‘	oligotrofní
m‘	mezotrofní
d‘m‘	oligomezotrofní

akumulační fáze

i‘	akumulovaná
w‘	erodovaná
y‘	překrytá

půdní druh

p	písčitá (půda)
hp	hlinitopísčitá
ph	písčitohlinitá
h	hlinitá
jh	jílovitohlinitá
j	jílovitá, (jíl)
jp	jílnatý písek
jhp	jílnatohlinitý písek
org	organická

SKELET

hrp	hrubý písek (2–4 mm)
š	štěrk (4–30 mm)
k	kameny (30–300 mm)
b	balvany (> 300 mm)
kh	kompaktní hornina (skála)

SKELETNATOST (příklad zápisu)

hp–ph	hlinitopísčitá až písčitohlinitá, 0–10 % skeletu
hp, (k)	hlinitopísčitá, 10–50 % kamene
ph, k	písčitohlinitá, 50–80 % kamene
(ph), k	kamenitá (> 80 % kamene) s písčitohlinitou výplní

Nomenklatura půdních jednotek je uvedena podle:

Němeček, J. et al.: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha: ČZU, 2011;

Vokoun, J. et al.: Příručka pro průzkum lesních půd (Taxonomický klasifikační systém půd ČR v lesnické praxi). Interní text, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2003