PŘÍLOHA Č. 4 CHARAKTERISTIKY LESNÍCH TYPŮ

1X

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1X1	BAZICKÁ ZAKRSLÁ DOUBRAVA **karbonátová**	33,7	DBZ 12–16; HB 12–16	RZm, RZt, RZs	ph–h; k–kh	vápenec, dolomit, vápencová a dolomitová brekcie	(skeletnaté) hřbety, vypouklé střední až srázné svahy	0–45+	slunná	220–440 (–520)	DBZ 5–7, DBP 1–3, HB 1, BB, BRK, LP, JVM
	Bylinné patro (±70 %):	*Anemone sylvestris*, *Anthericum ramosum*, *Asperula tinctoria*, *Aster amellus*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula bononiensis*, *Carex humilis*, *Carex michelii*, *Clinopodium vulgare*, *Dictamnus albus*, *Euphorbia epithymoides*, *Galium glaucum*, *Galium verum*, *Geranium sanguineum*, *Inula ensifolia*, *Linum flavum*, *Melittis melissophyllum*, *Peucedanum cervaria*, *Stachys recta*, *Tanacetum corymbosum*, *Teucrium chamaedrys*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

1X3	BAZICKÁ ZAKRSLÁ DOUBRAVA **acerózní**	24,0	DBZ 12–16; HB 12–16	RZm, RZt, RZs	ph–h; k–kh	vápenec, dolomit, vápencová a dolomitová brekcie	(skeletnaté) hřbety, vypouklé střední až srázné svahy	0–45+	slunná	220–480 (–520)	DBZ 5–7, DBP 1–2, HB 1, LP 1, JVM 1, BB, BRK
	Bylinné patro (±70 %):	*Asplenium trichomanes*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula persicifolia*, *Campanula rapunculoides*, *Carex montana*, *Clinopodium vulgare*, *Dictamnus albus*, *Euphorbia cyparissias*, *Genista pilosa*, *Geum urbanum*, *Pimpinella saxifraga*, *Primula veris*, *Sesleria caerulea*, *Veronica chamaedrys* agg. (převážně *Veronica vindobonensis*), *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1X7	BAZICKÁ ZAKRSLÁ DOUBRAVA **specifická – na spraši**	4,7	DBZ 12–16; HB 12–16	HNm, CEm, (RGc)	h	spraš	hřbety, kupy, vypouklé střední až srázné svahy	0–45+	slunná	220–460	DBZ 5–7, DBP 1–3, HB 1, LP, JVM, BB, BRK
	Bylinné patro (±80 %):	*Ajuga genevensis*, *Brachypodium pinnatum*, *Bupleurum falcatum*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Clematis recta*, *Convallaria majalis*, *Dictamnus albus*, *Galium verum*, *Geranium sanguineum*, *Iris variegata*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Peucedanum cervaria*, *Poa nemoralis*, *Salvia pratensis*, *Silene nutans*, *Stachys recta*, *Tanacetum corymbosum*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola mirabilis*									
Poznámka											

1X9	BAZICKÁ ZAKRSLÁ DOUBRAVA **extrémní – skeletnatější**	18,6	DBZ 12–14; HB 12	LIce‘, RZt	(ph); kh	vápenec, dolomit	skalnaté hřbety, vypouklé střední až srázné skalnaté svahy	0–45+	slunná	220–440	DBZ 5–8, DBP 2–5, HB, BRK
	Bylinné patro (±80 %):	*Adonis vernalis*, *Allium flavum*, *Asplenium trichomanes*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula bononiensis*, *Carex humilis*, *Dictamnus albus*, *Euphorbia cyparissias*, *Euphorbia epithymoides*, *Festuca rupicola*, *Geranium sanguineum*, *Inula ensifolia*, *Iris pumila*, *Melica ciliata*, *Peucedanum cervaria*, *Sesleria caerulea*, *Stipa capillata*, *Tanacetum corymbosum*, *Teucrium chamaedrys*, *Veronica spicata*, *Vincetoxicum hirundinaria*									
Poznámka											

2X

2X0	BAZICKÁ ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	19,3	DB 14–18	ANsk, LIce‘	(ph–h); k–kh	vápenec (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	0–45+	slunná	380–440	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBP, BRK, MK, BB, JVM, JS, JLM
	Bylinné patro (±70 %):	*Anthericum ramosum*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Carex humilis*, *Dictamnus albus*, *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Teucrium chamaedrys*, *Vincetoxicum hirundinaria*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2X1	BAZICKÁ ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **karbonátová**	53,0	DB 14–18	RZm, RZt, RZs, LIce‘	ph–h; k–kh	vápenec, dolomit, vápencová a dolomitová brekcie	(skeletnaté) hřbety, vypouklé střední až srázné svahy	0–45+	slunná	(300–)360–520	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBP, BRK, MK, BB, JVM, JS, JLM
	Bylinné patro (±70 %):	*Anemone sylvestris*, *Anthericum ramosum*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Carex humilis*, *Dictamnus albus*, *Galium verum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Securigera varia*, *Teucrium chamaedrys*, *Vincetoxicum hirundinaria*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3X

3X1	BAZICKÁ ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **karbonátová**	66,1	BK 20–22; DB 18–20	RZm, RZt, RZs, LIce‘	ph–h; k–kh	vápenec, dolomit, vápencová a dolomitová brekcie	(skeletnaté) hřbety, vypouklé mírné až srázné svahy	0–45+	slunná	(260–)320–520(–560)	BK 7–9, DB 1–3, LP 1, JV, BB, HB, BRK, MK, JS, JLM
	Bylinné patro (30–50 %):	*Anthericum ramosum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula trachelium*, *Galium verum*, *Hepatica nobilis*, *Melittis melissophyllum*, *Securigera varia*, *Stellaria holostea*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola mirabilis*										
Poznámka											

4X

4X9	BAZICKÁ ZAKRSLÁ BUČINA **specifická – dealpínská**	32,1	BK 16–20; DB 16–20	RZm, RZt, RZs, LIce‘	ph–h; k–kh	vápenec, dolomit	skalnaté hřbety, vypouklé střední až srázné svahy	(0–)15–45+	různá	(300–)360–500	BK 7–9, DB 1, LP 1, JV, JLM, JS, JD, MK, TS
	Bylinné patro (0–30 %):	*Anthericum ramosum*, *Asplenium viride*, *Biscutella laevigata*, *Bupleurum falcatum*, *Cypripedium calceolus*, *Pulmonaria mollis*, *Saxifraga paniculata*, *Seseli osseum*, *Sesleria caerulea*, *Teucrium chamaedrys*										
Poznámka											

0Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
0Z1	ZAKRSLÝ BOR **modální**	14,6	BO 12–14	LImd‘, (RGyd‘, RNt(z))	(p–hp); kh	granodiorit, tonalit, droba	skalnaté hřbety, vypouklé střední až srázné skalnaté svahy	(0–)10–45+	převážně slunná	(240–)280–520	BO 7–9, DBZ 1–3, BR 1, BK, SM, JR
	Bylinné patro (5–30 %):	*Asplenium septentrionale*, *Calluna vulgaris*, *Dianthus carthusianorum* agg., *Genista pilosa*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium umbellatum*, *Jasione montana*, *Pilosella officinarum*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Leucobryum glaucum* s. l.									
Poznámka											

1Z

1Z1	ZAKRSLÁ DOUBRAVA **modální**	42,5	DBZ 12–14; BO 12–14	RNmd‘m‘, RNsd‘m‘, RNtd‘m‘, KAsd‘m‘, LImd‘m‘	hp–ph; k–kh	granodiorit, prachovec, droba, slepenec	(skeletnaté) hřbety, střední až srázné svahy	(0–)10–45+	převážně slunná	220–420	DBZ 7–9, HB 1, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (±70 %):	*Anthericum ramosum*, *Asplenium septentrionale*, *Carex humilis*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Festuca pallens*, *Galium verum*, *Genista pilosa*, *Hieracium lachenalii*, *Hylotelephium telephium* agg., *Jasione montana*, *Linaria genistifolia*, *Pilosella officinarum*, *Potentilla argentea*, *Verbascum chaixii* subsp. *austriacum*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l.; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1Z2	ZAKRSLÁ DOUBRAVA **chudší**	12,7	DBZ 12; BO 12–14	RNtd', RNkd', KAsd, KAtd, LImd'	p–hp; k–kh	granodiorit, prachovec, droba, slepenec	(skeletnaté) hřbety, střední až srázné svahy	(0–)10–45+	převážně slunná	220–440	DBZ 7–9, HB 1, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (±70 %):	*Agrostis vinealis*, *Asplenium septentrionale*, *Festuca ovina*, *Genista pilosa*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium umbellatum*, *Jasione montana*, *Pilosella officinarum*, *Potentilla argentea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*									
Poznámka											

1Z3	ZAKRSLÁ DOUBRAVA **bohatší**	1,5	DBZ 12–16; BO 12–16	RNma', RNka', KAsa', LIma'	hp; k–kh	slepenec, granodiorit	(skeletnaté) hřbety, střední až srázné svahy	10–45+	převážně slunná	220–320	DBZ 7–9, HB 1, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (±70 %):	*Ajuga genevensis*, *Anthericum ramosum*, *Brachypodium pinnatum*, *Carex humilis*, *Digitalis grandiflora*, *Euphorbia cyparissias*, *Galium verum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Tanacetum corymbosum*, *Verbascum chaixii* subsp. *austriacum*, *Veronica verna*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l.; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

1Z9	ZAKRSLÁ DOUBRAVA **specifická – extrémní**	0,6	DBZ 12; BO 12	LImd', LImd'm', LIma'	(p–hp); kh	slepenec, granodiorit	skalnaté hřbety, vypouklé střední až srázné skalnaté svahy	5–45+	slunná	220–260	DBZ 7–9, HB 1, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (±50 %):	*Anthericum ramosum*, *Carex humilis*, *Digitalis grandiflora*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Jasione montana*, *Pilosella officinarum*, *Potentilla argentea*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l.; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

2Z

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2Z0	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,2	DBZ 12–14; BO 12–16	ANsk, LImd‘, LIma‘	(hp–ph); k–kh	metaryolit (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	0–45+	různá	300–400	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, HB, LPM
	Bylinné patro (10–30 %):	*Agrostis vinealis*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Euphorbia cyparissias*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium umbellatum*, *Jasione montana*, *Melampyrum pratense*, *Pilosella officinarum*, *Potentilla argentea*, *Veronica verna*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											
2Z1	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	121,6	DBZ 12–14; BO 12–16	RNmd‘m‘, RNsd‘m‘, RNtd‘m‘, KAsd‘m‘, LImd‘m‘	hp–ph; k–kh	droba, prachovec, granodiorit, slepenec, metabazalt	(skeletnaté) hřbety, střední až srázné svahy	0–45+	převážně slunná	220–500 (–540)	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, HB, LPM
	Bylinné patro (10–30 %):	*Agrostis vinealis*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Euphorbia cyparissias*, *Galium verum*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium umbellatum*, *Jasione montana*, *Melampyrum pratense*, *Pilosella officinarum*, *Potentilla argentea*, *Veronica verna*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											
2Z2	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	2,8	DBZ 12–14; BO 12–16	RNkd, RNtd, KAsd(z‘), KAtd(z‘), LImd‘	p–hp; k–kh	slepenec	(skeletnaté) hřbety, střední až srázné svahy	15–45+	převážně slunná	400–460	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, HB, LPM
	Bylinné patro (10–30 %):	*Agrostis vinealis*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Hieracium lachenalii*, *Jasione montana*, *Melampyrum pratense*, *Pilosella officinarum*, *Potentilla argentea*, *Veronica verna*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2Z3	ZAKRSLÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	1,6	DBZ 12–16; BO 14–16	RNka‘, RNta‘, KAsa‘, LIma‘	hp–ph; k–kh	granodiorit, slepenec, metabazalt, metaryolit	(skeletnaté) hřbety, střední až srázné svahy	0–45+	převážně slunná	220–400	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, HB, LPM
	Bylinné patro (10–30 %):	*Campanula persicifolia*, *Carex digitata*, *Carex montana*, *Galium intermedium*, *Galium verum*, *Hieracium lachenalii*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Hieracium umbellatum*, *Jasione montana*, *Potentilla argentea*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3Z

3Z1	ZAKRSLÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	65,7	DBZ 14–16; BK 14–16; BO 14–18	RNmd‘m‘, RNsd‘m‘, RNtd‘m‘, KAsd‘m‘	hp–ph; k–b	droba, prachovec, granodiorit, tonalit, slepenec	(skeletnaté) hřbety, střední až srázné svahy	0–45+	převážně slunná	240–560(–600)	BK 5–7, DB 3–5, BR 1, BO
	Bylinné patro (± 25 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Galium verum*, *Hieracium murorum*, *Jasione montana*, *Potentilla argentea*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica verna*, *Vincetoxicum hirundinaria*										
	Mechové patro:	*Cladonia bellidiflora*, *Dicranum scoparium*, *Leucobryum glaucum* s. l.									
Poznámka											

4Z

4Z3	ZAKRSLÁ BUČINA **bohatší**	0,4	DBZ 14; BK 14–16; BO 14–18	RNka‘, RNma‘, RNsa‘, KAsa‘	hp–ph; k–b	droba, dolerit, metadolerit	(skeletnaté) hřbety, střední až srázné svahy	0–45+	převážně slunná	520–640	BK 5–7, DB 1, BR 1, JD, BO
	Bylinné patro (0–30 %):	*Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Galium verum*, *Hieracium umbellatum*, *Jasione montana*, *Poa nemoralis*, *Potentilla argentea*, *Veronica verna*, *Vincetoxicum hirundinaria*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum juniperinum*									
Poznámka											

2Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2Y0	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,3	BO 16–20; DBZ 16–20	ANsk, LImd‘, (LIma‘)	(hp–ph); b–kh	diorit, tonalit, metabazalt (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	0–45	různá	320–400	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (10–20 %):	*Allium senescens*, *Antennaria dioica*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Pilosella officinarum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2Y1	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	0,2	BO 16–20; DBZ 16–20	LImd‘, RGyd‘, RNtd‘, RNsd‘	(hp–ph); b–kh	droba, slepenec	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	260–380	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (10–20 %):	*Allium senescens*, *Antennaria dioica*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Pilosella officinarum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2Y3	SKELETOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	1,2	BO 16–20; DBZ 16–20	LIma‘, RGya‘, RNta‘, RNsa‘	(hp–ph); b–kh	metabazalt (zelená břidlice), metaryolit	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	260–460	DBZ 5–7, BK 1–3, BR 1, BO, LPM
	Bylinné patro (10–30 %):	*Allium senescens*, *Antennaria dioica*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Pilosella officinarum*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3Y0	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	2,9	BK 18–22; DBZ 18–22; BO 18–22	ANsk, LImd‘	(p–ph); b–kh	arkóza, slepenec, prachovec, droba (halda, odval, lom)	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	340–420	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (10–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
3Y1	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	104,3	BK 18–22; DBZ 18–22; BO 18–22	LImd‘, RGyd‘, RNtd‘, RNsd‘	(hp–ph); b–kh	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	320–540 (–580)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (10–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca ovina*, *Hylotelephium telephium* agg., *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
3Y3	SKELETOVÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	8,7	BK 18–22; DBZ 18–22; BO 18–22	LIma‘, RGya‘, RNta‘, RNsa‘	(hp–ph); b–kh	arkóza, slepenec, droba, granodiorit	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	320–540	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (30–70 %):	*Asplenium septentrionale*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Galium odoratum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4Y0	SKELETOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,3	BK 22–26; SM 22–26	ANsk, LImd‘	(hp); b–kh	droba (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	5–45+	různá	500–580	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (10–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4Y1	SKELETOVÁ BUČINA **modální**	8,6	BK 22–26; SM 22–26	LImd‘, RGyd‘, RNtd‘, RNsd‘	(hp–ph); b–kh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, fylit	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	380–600	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (10–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4Y3	SKELETOVÁ BUČINA **bohatší**	1,5	BK 22–26; SM 22–26	LIma‘, RGya‘, RNta‘, RNsa‘	(hp–ph); b–kh	droba, prachovec, jílovitá břidlice	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	460–620	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO, LPM, KL
	Bylinné patro (30–70 %):	*Asplenium septentrionale*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Dryopteris filix-mas* agg., *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Luzula luzuloides*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5Y

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5Y1	SKELETOVÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	2,3	BK 22–28; SM 24–30	LImd‘, RGyd‘, RNtd(z‘), RNsd(z‘)	(hp–ph); b–kh	droba	balvanité a skalnaté svahy, hřebeny	5–45+	různá	540–620	BK 5–7, JD 1–3, BR 1–3, SM 1–3, BO, KL, LPM
	Bylinné patro (10–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana* agg., *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3M

3M2	CHUDÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	22,1	BK 16–20; BO 18–22	KArdz‘, KAdz‘, (PZr)	p–ph; (hrp–k)	droba, pískovec, štěrkopísek, granodiorit	plošiny, mírné až střední (vypouklé) svahy, ploché hřbety	0–22	různá	280–500(–540)	BK 5–7, DBZ 3–5, BO 1, BR 1, JD
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Festuca ovina*, *Jasione montana*, *Melampyrum pratense*, *Pilosella officinarum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*; *Cladonia arbuscula*									
Poznámka											

4M

4M2	CHUDÁ BUČINA **chudší**	2,5	BK 18–20; BO 18–24	KArdz‘, KAdz‘, (PZr)	p–ph; (š–k)	granodiorit, droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední (vypouklé) svahy, ploché hřbety	0–22	různá	500–640	BK 5–7, DBZ 1–3, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (20–40 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Hieracium murorum*, *Jasione montana*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Prenanthes purpurea*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

0K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
0K2	KYSELÝ BOR **modální (dubo–bukový)**	0,8	BK 18–20; BO 18–24	PZr(y')	p; (š–k)	křídový křemenný pískovec, granodiorit	pošiny, mírné až střední (vypouklé) svahy, vrcholy	0–22	převážně slunná	(280–)420–520	BO 7–9, DBZ 1–3, BK 1–3, BR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Campanula rotundifolia*, *Luzula luzuloides*, *Rumex acetosella*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Dicranum undulatum*, *Leucobryum glaucum* s. l., *Pleurozium schreberi*; *Cetraria islandica*, *Cladonia rangiferina* s. l.									
Poznámka											

1K

1K1	KYSELÁ DOUBRAVA **modální**	0,1	DBZ 16–20; BO 18–22	KAmd', KAd	hp; (š–k)	granodiorit	pošiny, hřbety, vypouklé mírné až střední svahy	0–22	převážně slunná	240–280	DBZ 7–9, BR 1–3, BO 1
	Bylinné patro (±60 %):	*Agrostis capillaris*, *Calluna vulgaris*, *Campanula rotundifolia*, *Cytisus nigricans*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Hieracium murorum*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Rumex acetosella*, *Silene nutans*, *Veronica officinalis*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											
1K1e	KYSELÁ DOUBRAVA **modální – exponovaná**	0,7	DBZ 16–20; BO 18–22	KAmd', KAd	hp; (š–k)	slepenec, droba	vypouklé příkré svahy	22–35	převážně slunná	240–360	DBZ 7–9, BR 1–3, BO 1
	Bylinné patro (±60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

2K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2K1	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	0,7	DBZ 18–22; BO 20–24	KAmd‘, KAd	hp; (š–k)	slepenec, droba	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	280–340	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Campanula rotundifolia*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Rumex acetosella*, *Vaccinium myrtillus*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2K1e	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální – exponovaná**	6,0	DBZ 18–22; BO 20–24	KAmd‘, KAd‘	hp; (š–k)	slepenec, droba, granodiorit	příkré svahy	22–35	různá	280–380	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (30–70 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											
2K2	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	13,5	DBZ 18–22; BO 20–24	KAd(z‘), KArd(z‘)	p–hp; (š–k)	arkóza, slepenec, droba, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy, vrcholy	0–22	různá	(280–)360–440	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2K4	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	539,4	DBZ 18–22; BO 20–24	KAmd‘, KAd, KArd‘, KArd	p–hp; (š–k)	slepenec, droba, granodiorit, arkóza	mírné až střední svahy (horní části), vypouklé vrcholy	5–22	převážně slunná	(260–)300–500	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Carex pilulifera*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melampyrum pratense*, *Rumex acetosella*, *Vaccinium myrtillus*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2K4e	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší – exponovaná**	218,2	DBZ 18–22; BO 20–24	KAmd‘, KAd, KArd‘, KArd	p–hp; (š–k)	slepenec, droba, granodiorit, pískovec	(vypouklé) příkré svahy	22–35(–45)	převážně slunná	260–440 (–500)	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

2K7	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější**	0,6	DBZ 18–22; BO 20–24	KAmd‘(s‘), KAd(s‘)	hp; (k)	arkóza, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	340–380	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Campanula rotundifolia*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2K7e	KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější – exponovaná**	1,4	DBZ 18–22; BO 20–24	KAmd‘(s‘), KAd(s‘)	hp; (k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–40	různá	340–440	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (30–70 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

3K

3K1	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	206,3	BK 22–24; DBZ 20–24; SM 22–26	KAd, KAmd‘	hp–ph; (š–k)	slepenec, droba, prachovec, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(320–)360–540	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dianthus deltoides*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3K1e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	214,8	BK 22–24; DBZ 20–24; SM 22–26	KAd, KAmd‘	hp–ph; (š–k)	granodiorit, slepenec, droba, pararula	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(280–)320–520(–560)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3K2	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	425,6	BK 20–22; DBZ 18–22; BO 20–24	KAd(z'), KArd(z')	p–hp; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy, vrcholy	0–22	různá	(280–)320–520(–560)	BK 5–7, JD 1–3, BO 1–3, BR
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3K2e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	6,9	BK 20–22; DBZ 18–22; BO 20–24	KAd(z'), KArd(z')	p–hp; (š–k)	slepenec, droba, granodiorit	příkré svahy	0–40	různá	380–520	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											
3K3	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	37,4	BK 22–24; DBZ 20–24; SM 22–26	KAmd', (KAd)	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	320–460 (–520)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Euphorbia cyparissias*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Oxalis acetosella*, *Veronica officinalis*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3K4	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	3467,6	BK 20–22; DBZ 18–22; BO 20–24	KAd, KAmd‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	mírné až střední svahy (horní části), vypouklé vrcholy	5–22	převážně slunná	(260–)300–540(–580)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	*Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3K4e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	197,4	BK 20–22; DBZ 18–22; BO 20–24	KAd, KAmd‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	(vypouklé) příkré svahy	22–35(–45)	převážně slunná	260–500(–560)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											
3K5	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	1,9	BK 22–24; DBZ 20–24; SM 22–26	KAmd‘(g‘), KAd(g‘)	ph; (š)	slepenec, droba	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	380–420	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Pyrola minor*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3K7	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější**	8,4	BK 22–24; DBZ 20–24; SM 22–26	KAd(s‘), KAmd‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, prachovec, slepenec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	340–500	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3K7e	KYSELÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	8,6	BK 22–24; DBZ 20–24; SM 22–26	KAd(s‘), KAmd‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	340–520	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4K

4K1	KYSELÁ BUČINA **modální**	2302,2	BK 24–28; SM 24–30	KAd, KAmd‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, granodiorit, fylit, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(380–)460–620(–660)	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K1e	KYSELÁ BUČINA **modální – exponovaná**	146,5	BK 24–28; SM 24–30	KAd, KAmd‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, granodiorit, slepenec	příkré svahy	22–35(–45)	různá	(340–)420–600(–640)	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4K2	KYSELÁ BUČINA **chudší**	181,5	BK 24–26; SM 24–30	KAd(z‘), KArd(z‘), (PZr)	p–hp; (š–k)	droba, písek, prachovec, slepenec, ortorula	plošiny, mírné až střední svahy, vrcholy	0–22	různá	(400–)440–580	BK 7–9, DB 1–3, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K2e	KYSELÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	4,4	BK 24–26; SM 24–30	KAd(z‘)	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–40	různá	380–540	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K3	KYSELÁ BUČINA **bohatší**	1,3	BK 24–28; SM 24–30	KAmd‘, (KAd)	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	480–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (30–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Euphorbia cyparissias*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Oxalis acetosella*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K4	KYSELÁ BUČINA **sušší**	1531,6	BK 24–26; SM 24–28	KAd, KArd, KAmd‘, KArd‘	p–hp; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, ortorula, pískovec	mírné až střední svahy (horní části), vypouklé vrcholy	5–22	převážně slunná	(360–)420–580(–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–30(50) %):	*Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4K4e	KYSELÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	15,4	BK 24–26; SM 24–28	KAd, KAmd‘	hp–ph; (š–k)	slepenec, droba	(vypouklé) příkré svahy	22–35(–45)	převážně slunná	420–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4K5	KYSELÁ BUČINA **vlhčí**	1,2	BK 24–28; SM 24–30	KAmd‘(g‘), KAd(g‘)	ph; (š)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	500–600	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (20–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Monotropa hypopitys*, *Pyrola minor*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K7	KYSELÁ BUČINA **skeletnatější**	5,4	BK 24–28; SM 24–30	KAd(s‘), KAmd‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	520–600	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4K7e	KYSELÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	48,9	BK 24–28; SM 24–30	KAd(s‘), KAmd‘(s‘)	hp–ph; (k)	ortorula, slepenec, droba, fylit, svor	příkré svahy	22–35(–45)	různá	380–560	BK 7–9, JD 1–3, DB 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											

5K

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5K1	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	1726,7	BK 26–30; SM 28–32	KAd(z'), (KAmd')	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, granodiorit, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(500–)540–740	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Agrostis capillaris*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Euphorbia cyparissias*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Moneses uniflora*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5K1e	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	1,3	BK 26–30; SM 28–32	KAd(z'), (KAmd')	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec	příkré svahy	22–40	různá	560–600	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											
5K2	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	15,7	BO 26–28; SM 26–30	KAd(z')	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy, vrcholy	0–22	různá	540–680	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Euphorbia cyparissias*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Moneses uniflora*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5K4	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **sušší**	389,6	BK 26–28; SM 26–30	KAd(z'), (KAmd')	hp–ph; (š–k)	droba, granodiorit, slepenec, prachovec	mírné až střední svahy (horní části), vypouklé vrcholy	5–22	převážně slunná	(520–)540–700(–740)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	*Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Euphorbia cyparissias*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

5K7	KYSELÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	32,3	BK 26–30; SM 28–32	KAd(s'), (KAmd'(s'))	hp–ph; (k)	droba, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy, vrcholy	0–22	různá	640–720	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Euphorbia cyparissias*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum sylvaticum*, *Moneses uniflora*, *Prenanthes purpurea*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Dicranum scoparium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2N

2N1	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	51,7	DBZ 18–20; BO 20–24	KAsd', KAsd, RNkd', RNd	hp–ph; k–b	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	kamenité hřbety, střední až příkré kamenité svahy	(0–)5–45	různá	260–440 (–500)	DBZ 5–7, BK 1–3, BO, BR
	Bylinné patro (20–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica verna*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2N2	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	0,7	DBZ 18–20; BO 20–24	KAsd(z'), RNd(z'), RNkd(z')	hp–ph; k–b	droba, prachovec, jílovitá břidlice	kamenité hřbety, střední až příkré kamenité svahy	(0–)15–45	různá	320–400	DBZ 5–7, BK 1–3, BO, BR
	Bylinné patro (20–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

2N3	KYSELÁ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	12,7	DBZ 18–22; BO 20–24	KAsd', RNkd', (KAsd, RNd)	hp–ph; k–b	droba, prachovec, arkóza, granodiorit	kamenité hřbety, střední až příkré kamenité svahy	(0–)10–45	různá	300–420	DBZ 5–7, BK 1–3, BO, BR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Luzula luzuloides*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*; *Cladonia* sp. div.									
Poznámka											

3N

3N1	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	76,2	BK 24–26; SM 26–28	KAsd', KAsd, RNkd', RNd	hp–ph; k–b	droba, prachovec, granodiorit, slepenec	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy	0–35 (–45)	různá	280–520 (–560)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Hylotelephium telephium* agg., *Hypericum hirsutum*, *Pilosella officinarum*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3N2	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	65,3	DBZ 18–24; BO 22–28	KAsd(z'), RNd(z'), RNkd(z')	hp–ph; k–b	droba, prachovec, slepenec, fylit	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy, hřbety	0–45	různá	(260–)300–500	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (30–50 %):	*Antennaria dioica*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Dryopteris carthusiana*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Hypericum hirsutum*, *Pilosella officinarum*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Plagiothecium curvifolium*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3N3	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	193,4	BK 24–28; SM 26–28	KAsd', RNkd', (KAsd, RNd)	hp–ph; k–b	droba, prachovec, granodiorit, slepenec	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy	0–45	různá	(260–)320–520(–560)	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula rotundifolia*, *Dryopteris carthusiana*, *Hylotelephium telephium* agg., *Hypericum hirsutum*, *Pilosella officinarum*, *Polypodium vulgare*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:	*Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3N4	KYSELÁ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	2,8	DBZ 18–24; BO 22–28	KAsd', KAsd, RNkd', RNd	hp–ph; k–b	droba, prachovec	kamenité hřbety, vrcholy, střední až příkré kamenité svahy	5–45	převážně slunná	380–580	BK 5–7, DB 3–5, JD 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Festuca ovina*, *Hylotelephium telephium* agg., *Hypericum hirsutum*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

4N

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4N0	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **antropogenní**	1,3	BK 24–28; SM 26–28	AN(sk), KAasd	hp–ph; k–b	droba, prachovec (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	0–15 (–45)	různá	580–600	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4N1	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **modální**	41,3	BK 24–28; SM 26–28	KAsd‘, KAsd, RNkd‘, RNd	hp–ph; k–b	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy	0–35 (–45)	různá	400–620	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4N2	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **chudší**	17,0	BK 24–28; SM 26–28	KAsd(z‘), RNd(z‘), RNkd(z‘)	hp–ph; k–b	droba, prachovec, jílovitá břidlice	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy, hřbety	0–22 (–45)	různá	460–540	BK 7–9, DB 1–3, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (10–30 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4N3	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **bohatší**	123,5	BK 24–28; SM 26–28	KAsd‘, RNkd‘, (KAsd, RNd)	hp–ph; k–b	droba, prachovec, ortorula, svor, slepenec	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy	0–35 (–45)	různá	(340–)380–620	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–50 %):	*Asplenium septentrionale*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula rotundifolia*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4N4	KYSELÁ KAMENITÁ BUČINA **sušší**	15,1	BK 24–28; SM 26–28	KAsd‘, KAsd, RNkd‘, RNd	hp–ph; k–b	droba, prachovec, jílovitá břidlice	kamenité hřbety, vrcholy, střední až příkré kamenité svahy	0–35 (–45)	převážně slunná	440–600	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (10–50 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

5N

5N1	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	6,6	BK 26–28; SM 26–30	KAsd, RNd, (KAsd‘, RNkd‘)	ph–hp; š–k	droba, prachovec	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy	0–30 (–45)	různá	540–640	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (20–75 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Polygonatum verticillatum*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5N2	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	26,6	BK 26–28; SM 26–30	KAsd(z'), RNd(z'), RNkd(z')	ph–hp; š–k	droba, prachovec, granodiorit	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy, hřbety	0–35 (–45)	různá	460–700	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BO 1, BR
	Bylinné patro (20–60 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Polypodium vulgare*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5N3	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	1,8	BK 26–28; SM 26–30	KAsd', RNkd', (KAsd, RNd)	ph–hp; š–k	droba, prachovec	kamenité plošiny, mírné až příkré kamenité svahy	0–30 (–45)	různá	600–700	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–75 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5N4	KYSELÁ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **sušší**	46,0	BK 26–28; SM 26–30	KAsd, RNd, (KAsd', RNkd')	ph–hp; š–k	droba, prachovec, jílovitá břidlice	kamenité hřbety, vrcholy, střední až příkré kamenité svahy	0–35 (–45)	převážně slunná	460–660 (–700)	BK 5–7, JD 3–5, SM 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–55 %):	*Asplenium septentrionale*, *Avenella flexuosa*, *Luzula luzuloides*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2I

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2I1	KYSELÁ HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	166,6	DBZ 20–24; BO 22–26	LUmd‘(g‘), LUd(g‘), KAld‘(g‘), KAld(g‘)	ph–jh	droba, slepenec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	plošiny, spodní části mírných (až středních) svahů	0–15	různá	300–480	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1–3, BR, JR, JD
	Bylinné patro (30–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Convallaria majalis*, *Hieracium murorum*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Pyrola minor*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2I3	KYSELÁ HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	141,5	DBZ 20–24; BO 22–26	LUmd‘(g‘), KAld‘(g‘)	ph–jh	droba, slepenec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	plošiny, spodní části mírných (až středních) svahů	0–15	různá	(280–)320–460	DBZ 5–7, BK 1–3, BO 1–3, BR, JR, JD
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex montana*, *Convallaria majalis*, *Festuca heterophylla*, *Luzula pilosa*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Pyrola minor*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3I

3I1	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	281,0	DB 22–24; SM 24–28	LUd(g‘), LUmd‘(g‘), KAld(g‘), KAld‘(g‘)	ph–jh	droba, slepenec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	plošiny, spodní části mírných (až středních) svahů	0–15	různá	(260–)320–520	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (30–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Dryopteris dilatata*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Polygonatum multiflorum*, *Pyrola minor*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3I2	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	509,8	DB 22–24; SM 24–28	KAld(g'), LUd(g')	ph–h	droba, slepenec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	plošiny, spodní části mírných (až středních) svahů	0–15	různá	(280–)340–540	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, BO 1, BR
	Bylinné patro (30–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Dryopteris dilatata*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Pyrola minor*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3I3	KYSELÁ HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	4,4	DB 22–24; SM 24–28	LUmd'(g'), KAld'(g')	ph–jh	droba, slepenec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	plošiny, spodní části mírných (až středních) svahů	0–15	různá	440–500	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, BR, BO
	Bylinné patro (40–80 %):	*Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Dryopteris dilatata*, *Festuca heterophylla*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Polygonatum multiflorum*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4I

4I1	KYSELÁ HLINITÁ BUČINA **modální**	184,1	BK 24–26; SM 26–30	LUd, LUmd', KAld, KAld'	ph–jh	droba, slepenec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	plošiny, spodní části mírných (až středních) svahů	0–15	různá	400–600	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, BR, BO
	Bylinné patro (30–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex leporina*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Dryopteris dilatata*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Potentilla erecta*, *Pyrola minor*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Hylocomium splendens*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

2S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2S0	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	2,0	DBZ 20–24; BO 22–26	AN, KAaa‘	hp–ph; (š–k)	halda, odval, navážka	navážky, haldy, antropogenní tvary	0–22	různá	260–300	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Carex digitata*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Senecio nemorensis* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2S1	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	680,0	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	granodiorit, slepenec, arkóza, droba	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)300–480(–520)	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Carex digitata*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2S1e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální – exponovaná**	84,2	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	granodiorit, slepenec, arkóza, droba	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(240–)260–420(–500)	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (30–50 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2S2	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	183,2	DBZ 18–24; BO 22–26	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	slepenec, droba, arkóza, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)320–500	DBZ 5–7, BK 1–3, LPM, HB
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Convallaria majalis*, *Festuca ovina*, *Fragaria vesca*, *Genista tinctoria*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											
2S2e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší – exponovaná**	13,0	DBZ 18–24; BO 22–26	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	droba, slepenec, granodiorit, tonalit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	240–460	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (60–80 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											
2S3	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	296,1	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	granodiorit, droba, slepenec, diorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)280–460(–500)	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex digitata*, *Galium rotundifolium*, *Hepatica nobilis*, *Luzula luzuloides*, *Poa nemoralis*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2S3e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší – exponovaná**	59,2	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	granodiorit, diorit, droba, slepenec	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	240–440 (–480)	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (70–80 %):	–„–									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2S4	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	1012,0	DBZ 18–24; BO 22–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, granodiorit, slepenec, diorit	mírné až střední svahy (horní části), vrcholy	5–22	převážně slunná	(240–)280–440(–500)	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (60–80 %):	*Festuca ovina*, *Fragaria viridis*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Tanacetum corymbosum*, *Veronica chamaedrys* agg., *Veronica officinalis*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2S4e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší – exponovaná**	586,6	DBZ 18–24; BO 22–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	granodiorit, droba, slepenec, diorit	(vypouklé) příkré svahy	22–35 (–45)	převážně slunná	240–460	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (60–80 %):	–„–									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2S6	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **hlinitější**	35,1	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘(l‘)	ph–h; (š–k)	granodiorit, metabazalt, droba, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	240–440	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex digitata*, *Dactylis polygama*, *Galium rotundifolium*, *Poa nemoralis*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio nemorensis* agg., *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2S6e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **hlinitější – exponovaná**	5,3	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘(l‘)	ph–h; (š–k)	granodiorit, slepenec, droba	příkré svahy	22–30	různá	240–360	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2S7	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější**	10,4	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	metabazalt (zelená břidlice), droba, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	320–440	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (30–50 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Carex digitata*, *Hepatica nobilis*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Senecio nemorensis* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2S7e	SVĚŽÍ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější – exponovaná**	111,2	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, metabazalt, granodiorit, prachovec	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(280–)320–440	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL
	Bylinné patro (30–50 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3S0	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	1,3	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	AN, KAaa‘	hp–ph; (š–k)	halda, odval, navážka	navážky, haldy, antropogenní tvary	0–22	různá	280–300 (–500)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Avenella flexuosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rotundifolia*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Galium sylvaticum*, *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3S1	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **modální**	4083,5	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, granodiorit, diorit, fylit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(260–)300–540(–580)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Avenella flexuosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rotundifolia*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3S1e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	134,2	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, granodiorit, slepenec, prachovec	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	280–520	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*– „ –*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3S2	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	137,9	BK 24–28; BO 26–30; SM 26–30	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	320–500	BK 5–7, DB 3–5, JD 1–3, LPM, KL, HB
	Bylinné patro (60–80 %):	*Ajuga reptans*, *Avenella flexuosa*, *Campanula rotundifolia*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Galium rotundifolium*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3S2e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	12,0	BK 24–28; BO 26–30; SM 26–30	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	droba, granodiorit, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(260–)320–500	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3S3	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	1898,2	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, slepenec, granodiorit, metabazalt	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(280–)340–540	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–90 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rotundifolia*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3S3e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **bohatší – exponovaná**	188,4	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	granodiorit, slepenec, droba, diorit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(260–)300–460(–520)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3S4	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	5909,3	BK 24–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, granodiorit, diorit, metabazalt	mírné až střední svahy (horní části), vrcholy	5–22	převážně slunná	(260–)320–520(–600)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Campanula rotundifolia*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Fragaria viridis*, *Galium rotundifolium*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Poa nemoralis*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3S4e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	1556,2	BK 24–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, slepenec, granodiorit, diorit, metabazalt	(vypouklé) příkré svahy	22–35(–45)	převážně slunná	(260–)300–500(–600)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3S5	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	422,7	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘(g‘)	ph; (š)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	dolní části mírných až středních svahů, mělké úžlabiny	0–22	různá	(260–)300–520	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Avenella flexuosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rotundifolia*, *Cardamine impatiens*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3S5e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí – exponovaná**	1,2	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘(g‘)	ph; (š)	slepenec, droba	dolní části příkrých svahů	22–30	různá	400–480	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3S6	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **hlinitější**	1835,6	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘(l‘)	ph–h; (š)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(260–)340–540	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rotundifolia*, *Carex digitata*, *Dactylis glomerata*, *Fragaria vesca*, *Galium rotundifolium*, *Galium sylvaticum*, *Melica nutans*, *Oxalis acetosella*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3S6e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **hlinitější – exponovaná**	69,4	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘(l‘)	ph–h; (š)	droba, slepenec, granodiorit, metabazalt	příkré svahy	22–30	různá	(300–)340–500	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3S7	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější**	143,3	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	320–500 (–540)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula rotundifolia*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Galium rotundifolium*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Melica nutans*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3S7e	SVĚŽÍ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	157,9	BK 26–28; BO 26–30; SM 26–30	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	příkré svahy	22–35(–45)	různá	(280–)320–500(–540)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

4S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4S1	SVĚŽÍ BUČINA **modální**	6593,7	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, granodiorit, slepenec, fylit, metabazalt	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(360–)440–600(–640)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Epilobium montanum*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4S1e	SVĚŽÍ BUČINA **modální – exponovaná**	718,1	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, slepenec, granodiorit, diorit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(340–)420–560(–600)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	–„–									
	Mechové patro:	–„–									
Poznámka											
4S2	SVĚŽÍ BUČINA **chudší**	91,0	BK 26–30; SM 28–32	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	440–580	BK 7–9, JD 1–3, DB 1, LPM, KL, HB
	Bylinné patro (60–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Epilobium montanum*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Viola riviniana*									
	Mechové patro:	*Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4S2e	SVĚŽÍ BUČINA **chudší – exponovaná**	4,9	BK 26–30; SM 28–32	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	480–540	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											

4S3	SVĚŽÍ BUČINA **bohatší**	1311,3	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, ortorula, slepenec, metabazalt	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(360–)400–580(–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Epilobium montanum*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium odoratum*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4S3e	SVĚŽÍ BUČINA **bohatší – exponovaná**	6,6	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	metabazalt, droba, prachovec, granodiorit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	360–540	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4S4	SVĚŽÍ BUČINA **sušší**	257,0	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	mírné až střední svahy (horní části), vrcholy	5–22	převážně slunná	400–580(–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	*Carex digitata*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4S4e	SVĚŽÍ BUČINA **sušší – exponovaná**	55,4	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	(vypouklé) příkré svahy	22–35 (–45)	převážně slunná	440–600	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	–„–									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4S5	SVĚŽÍ BUČINA **vlhčí**	14,8	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘(g‘)	ph; (š)	droba, prachovec, slepenec, jílovitá břidlice	dolní části mírných až středních svahů, mělké úžlabiny	0–22	různá	420–580	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Epilobium montanum*, *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4S6	SVĚŽÍ BUČINA **hlinitější**	1090,4	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘(l‘)	ph–h; (š)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(360–)420–580(–640)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Dactylis glomerata*, *Epilobium montanum*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4S6e	SVĚŽÍ BUČINA **hlinitější – exponovaná**	20,1	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘(l‘)	ph–h; (š)	slepenec, droba, prachovec	příkré svahy	22–30	různá	360–520	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4S7	SVĚŽÍ BUČINA **skeletnatější**	128,7	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	420–600	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Epilobium montanum*, *Epipactis helleborine* agg., *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4S7e	SVĚŽÍ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	392,9	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, ortorula, slepenec, fylit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	360–560 (–600)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

5S

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5S1	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	2639,1	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, granodiorit, dolerit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	520–700 (–740)	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (60–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
5S1e	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	18,1	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, granodiorit, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–35(–45)	různá	460–620	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (60–70 %):	– „ –									
	Mechové patro:	– „ –									
Poznámka											
5S2	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	176,3	BK 26–30; SM 30–32	KAmd‘m‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	560–680	BK 5–7, JD 3–5, SM, LPM, KL
	Bylinné patro (60–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex pilulifera*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Polygonatum verticillatum*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5S3	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	27,4	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	540–640	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Festuca altissima*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
5S5	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **vlhčí**	57,2	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘(g‘)	ph; (š)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	dolní části mírných (až středních) svahů, mělké úžlabiny	0–15	různá	(540–)600–640	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris dilatata*, *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Milium effusum*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
5S7	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	35,7	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	500–640	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (60–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex digitata*, *Carex pilulifera*, *Dryopteris carthusiana*, *Dryopteris dilatata*, *Galium rotundifolium*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5S7e	SVĚŽÍ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	7,2	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘(s‘)	hp–ph; (k)	droba, prachovec	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	500–600	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (60–70 %):	–„–									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2F

2F0	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	1,4	DBZ 20–24; BO 20–24	AN(sk), KAasa‘	hp–ph; k–b	droba, prachovec (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	(0–)10–35	různá	240–300	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Dactylis glomerata*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Lathyrus vernus*, *Luzula luzuloides*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum multiflorum*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	14,9	DBZ 20–24; BO 20–24	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	granodiorit, droba, prachovec, diorit	kamenité mírné až příkré svahy, hřbety	(0–)10–35(–45)	různá	240–500	DBZ 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, DBL, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Calamagrostis arundinacea*, *Dactylis glomerata*, *Dryopteris filix-mas*, *Fragaria vesca*, *Lathyrus vernus*, *Luzula luzuloides*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum multiflorum*, *Veronica officinalis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3F

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	307,1	BK 24–28; SM 26–30	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	kamenité mírné až příkré svahy, hřbety	(0–)10–35(–45)	různá	(260–)300–500(–540)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Calamagrostis arundinacea*, *Carex digitata*, *Dryopteris filix-mas*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Melica uniflora*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Polypodium vulgare*, *Senecio nemorensis* agg., *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
3F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	74,6	BK 24–28; SM 26–30	KAsa‘(e‘), RNka‘(e‘), (RNma‘(e‘))	hp–ph; k–b	granodiorit, droba, prachovec, metabazalt	kamenité mírné až příkré svahy	(0–)10–35(–45)	různá	(320–)360–520	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–80 %):	*Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Circaea lutetiana*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3F4	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	69,1	BK 24–28; SM 26–28	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	droba, prachovec, granodiorit, pararula	kamenité střední až příkré svahy, hřbety, vrcholy	(0–)10–35(–45)	převážně slunná	(320–)360–540(–580)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	*Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Dryopteris dilatata*, *Fragaria viridis*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Senecio nemorensis* agg., *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3F9	SVĚŽÍ KAMENITÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	18,3	BK 24–28; SM 26–30	KAsa‘, RNka‘, (KAya‘)	hp–ph; k	droba, prachovec, granodiorit	kamenité rokle	(0–)10–35(–45)	stinná	280–420	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV
	Bylinné patro (60–70 %):	*Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium rotundifolium*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Senecio nemorensis* agg., *Veronica officinalis*										
	Mechové patro:	*Dicranella heteromalla*, *Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4F

4F0	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **antropogenní**	0,4	BK 26–30; SM 28–32	AN(sk), KAasa‘	hp–ph; k–b	droba, prachovec (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	5–10	různá	600–620	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (60–70 %):	*Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula persicifolia*, *Dryopteris filix-mas*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Melica uniflora*, *Oxalis acetosella*, *Polypodium vulgare*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

4F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **modální**	682,9	BK 26–30; SM 28–32	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	droba, prachovec, slepenec, ortorula	kamenité plošiny, mírné až příkré svahy, hřbety	0–45	různá	(340–)380–580(–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (60–70 %):	*Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula persicifolia*, *Dryopteris filix-mas*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Melica uniflora*, *Oxalis acetosella*, *Polypodium vulgare*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Pohlia nutans*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **bohatší**	29,9	BK 26–30; SM 28–32	KAsa‘(e‘), RNka‘(e‘), (RNma‘(e‘))	hp–ph; k–b	droba, prachovec, jílovitá břidlice	kamenité mírné až příkré svahy	(0–)10–45	různá	440–600	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula persicifolia*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Melica uniflora*, *Oxalis acetosella*, *Polypodium vulgare*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											
4F4	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **sušší**	71,8	BK 26–30; SM 28–30	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	droba, prachovec, jílovitá břidlice	kamenité střední až příkré svahy, hřbety, vrcholy	(0–)10–45	převážně slunná	420–620	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (60–70 %):	*Avenella flexuosa*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Dryopteris filix-mas*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Melica uniflora*, *Polypodium vulgare*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4F9	SVĚŽÍ KAMENITÁ BUČINA **specifická – roklinová**	48,6	BK 26–30; SM 28–32	KAsa‘, RNka‘, (KAya‘)	hp–ph; k	droba, prachovec, slepenec, jílovitá břidlice	kamenité rokle	0–30 (–40)	stinná	440–580 (–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, HB
	Bylinné patro (60–70 %):	*Asarum europaeum*, *Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula persicifolia*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Melica uniflora*, *Oxalis acetosella*, *Polypodium vulgare*, *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Pohlia nutans*									
Poznámka											

5F

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5F1	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	16,8	BK 26–30; SM 28–32	KAsa‘, RNka‘, (RNma‘)	hp–ph; k–b	droba, prachovec	kamenité plošiny, mírné až příkré svahy, hřbety	0–35	různá	480–580	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (60–70 %):	*Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula persicifolia*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris dilatata*, *Dryopteris filix-mas*, *Oxalis acetosella*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Polypodium vulgare*									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Pohlia nutans*									
Poznámka											

5F3	SVĚŽÍ KAMENITÁ JEDLOVÁ BUČINA **bohatší**	5,5	BK 26–30; SM 28–32	KAsa‘(e‘), RNka‘(e‘), (RNma‘(e‘))	hp–ph; k–b	granodiorit	kamenité mírné až příkré svahy, hřbety	0–35	převážně stinná	550–670	BK 5–7, JD 3–5, JV, LP, SM
	Bylinné patro (60–70 %):	*Asarum europaeum*, *Asplenium trichomanes*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula persicifolia*, *Circaea lutetiana*, *Dryopteris dilatata*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Oxalis acetosella*, *Polypodium vulgare*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

1C

1C1	VYSÝCHAVÁ HABROVÁ DOUBRAVA **modální**	107,5	DBZ 18–20; BO 18–22	KAma‘(s‘), KAsa‘, RNka‘	hp–ph; š–k	slepenec, granodiorit, droba, pískovec	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–45	slunná	220–400	DBZ 7–9, LP 1–3, HB 1–3, BB, BRK, DBL
	Bylinné patro (±60 %):	*Anthericum ramosum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Campanula persicifolia*, *Carex caryophyllea*, *Carex humilis*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex muricata* agg., *Carex praecox*, *Clinopodium vulgare*, *Cytisus nigricans*, *Euphorbia epithymoides*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria moschata*, *Fragaria viridis*, *Lathyrus niger*, *Melittis melissophyllum*, *Pimpinella saxifraga*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1C2	VYSÝCHAVÁ HABROVÁ DOUBRAVA **chudší**	1,2	DBZ 16–20; BO 18–22	KAmd‘m‘(s‘), KAsd‘m‘, RNkd‘m‘	hp–ph; š–k	droba, prachovec, jílovitá břidlice	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–22 (–30)	slunná	300–360	DBZ 7–9, LP 1–3, HB 1–3, BB, BRK, DBL
	Bylinné patro (±40 %):	*Carex caryophyllea*, *Carex humilis*, *Carex muricata* agg., *Carex praecox*, *Clinopodium vulgare*, *Cytisus nigricans*, *Festuca ovina*, *Genista germanica*, *Genista tinctoria*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Pimpinella saxifraga*, *Poa pratensis*, *Silene nutans*, *Trifolium alpestre*, *Veronica officinalis*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

1C3	VYSÝCHAVÁ HABROVÁ DOUBRAVA **bohatší**	12,1	DBZ 18–20; BO 18–22	KAme‘(a‘)(s‘), KAse‘(a‘), RNke‘(a‘)	hp–ph; š–k	granodiorit, pískovec	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–35	slunná	220–320	DBZ 7–9, LP 1–3, HB 1–3, BB, BRK, DBL
	Bylinné patro (±60 %):	*Anemone sylvestris*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula persicifolia*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex muricata* agg., *Convallaria majalis*, *Dactylis glomerata*, *Dictamnus albus*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria moschata*, *Geranium sanguineum*, *Hypericum perforatum*, *Melittis melissophyllum*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Trifolium alpestre*, *Veronica chamaedrys* agg., *Viola hirta*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1C9	VYSÝCHAVÁ HABROVÁ DOUBRAVA **specifická – vápencová**	41,7	DBZ 18–20; BO 18–22	RZm, RZk, (RZt)	ph–h; š–k	vápenec, vápencová brekcie	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–40	slunná	260–440	DBZ 5–7, HB 1–3, LP 1–3, JVM, BB, BRK, TR, JS, MK
	Bylinné patro (±80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula rapunculoides*, *Carex humilis*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Clematis recta*, *Clinopodium vulgare*, *Convallaria majalis*, *Dictamnus albus*, *Galium aparine*, *Geranium sanguineum*, *Geum urbanum*, *Laserpitium latifolium*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Silene nutans*, *Teucrium chamaedrys*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

2C

2C1	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	796,2	DBZ 18–22; BO 20–24	KAma‘(s‘), KAsa‘, RNka‘	hp–ph; š–k	granodiorit, slepenec, droba, diorit, metabazalt	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–45	slunná	(220–)260–460(–520)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK
	Bylinné patro (±60 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Campanula persicifolia*, *Carex caryophyllea*, *Carex humilis*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex muricata* agg., *Carex praecox*, *Convallaria majalis*, *Dactylis polygama*, *Digitalis grandiflora*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria viridis*, *Galium verum*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Hypericum montanum*, *Melica transsilvanica*, *Pimpinella saxifraga*, *Poa nemoralis*, *Primula veris*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Trifolium alpestre*, *Veronica chamaedrys* agg., *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2C2	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	326,3	DBZ 18–22; BO 20–24	KAmd‘m‘(s‘), KAsd‘m‘, RNkd‘m‘	hp–ph; š–k	granodiorit, droba, slepenec, diorit	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–45	slunná	(240–)300–480(–540)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK
	Bylinné patro (±60 %):	*Campanula persicifolia*, *Carex caryophyllea*, *Carex humilis*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex muricata* agg., *Carex praecox*, *Convallaria majalis*, *Digitalis grandiflora*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca heterophylla*, *Festuca ovina*, *Fragaria viridis*, *Galium verum*, *Hieracium murorum*, *Hieracium sabaudum* s. l., *Hypericum montanum*, *Pimpinella saxifraga*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Veronica chamaedrys* agg., *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

2C3	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	102,0	DBZ 18–22; BO 20–24	KAme‘(a‘)(s‘), KAse‘(a‘), RNke‘(a‘)	hp–ph; š–k	granodiorit, droba, slepenec, metabazalt	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–35 (–45)	slunná	(220–)260–420(–480)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK
	Bylinné patro (±60 %):	*Anemone sylvestris*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Campanula rapunculoides*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex praecox*, *Convallaria majalis*, *Dactylis polygama*, *Digitalis grandiflora*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria moschata*, *Fragaria vesca*, *Galium sylvaticum*, *Galium verum*, *Geum urbanum*, *Melica transsilvanica*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Veronica chamaedrys* agg., *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2C8	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **specifická – vápnitá**	31,3	DBZ 18–22; BO 20–24	PRm, PRk	hp–h; š–k	písčitý slínovec, vápnitý pískovec, vápnitý prachovec, spraš	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–35 (–45)	slunná	300–380 (–480)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK
	Bylinné patro (±80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Convallaria majalis*, *Festuca heterophylla*, *Geranium sanguineum*, *Laserpitium latifolium*, *Melittis melissophyllum*, *Poa angustifolia*, *Poa nemoralis*, *Salvia pratensis*, *Sesleria caerulea*, *Silene nutans*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

2C9	VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **specifická – vápencová**	341,4	DBZ 18–22; BO 20–24	RZm, RZk, (RZt)	ph–h; š–k	vápenec, vápencová brekcie	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–30 (–45)	slunná	(240–)280–500	DB 5–7, BK, HB 1–3, LP 1–3, JVM, JS, BB, BRK, TR, MK
	Bylinné patro (±80 %):	*Acinos arvensis*, *Anthericum ramosum*, *Brachypodium pinnatum*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula persicifolia*, *Carex humilis*, *Carex montana*, *Cytisus nigricans*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria moschata*, *Galium verum*, *Laserpitium latifolium*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Origanum vulgare*, *Poa nemoralis*, *Primula veris*, *Silene nutans*, *Trifolium alpestre*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3C

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3C1	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	496,6	DBZ 20–24; BO 22–26	KAma‘(s‘), KAsa‘, RNka‘	hp–ph; š–k	droba, prachovec, granodiorit, slepenec, metabazalt	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–35 (–45)	slunná	(280–)320–540(–560)	BK 5–7, DB 1–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (±80 %):	*Acinos arvensis*, *Campanula persicifolia*, *Carex humilis*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Filipendula vulgaris*, *Galium verum*, *Origanum vulgare*, *Pimpinella saxifraga*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Trifolium alpestre*, *Viscaria vulgaris*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3C2	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	260,1	DBZ 20–24; BO 22–26	KAmd‘m‘(s‘), KAsd‘m‘, RNkd‘m‘	hp–ph; š–k	droba, prachovec, granodiorit, slepenec, pararula	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–30 (–45)	slunná	(340–)400–520(–600)	BK 5–7, DB 1–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (±80 %):	*Campanula persicifolia*, *Campanula rapunculoides*, *Clinopodium vulgare*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Hypericum montanum*, *Melampyrum pratense*, *Origanum vulgare*, *Pimpinella saxifraga*, *Poa nemoralis*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Trifolium alpestre*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3C3	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	5,4	DBZ 20–24; BO 22–26	KAme‘(a‘)(s‘), KAse‘(a‘), RNke‘(a‘)	hp–ph; š–k	granodiorit, droba, prachovec, slepenec	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–40	slunná	380–520	BK 5–7, DB 1–3, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anemone sylvestris*, *Brachypodium pinnatum*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula persicifolia*, *Campanula trachelium*, *Carex humilis*, *Fragaria viridis*, *Galium verum*, *Lathyrus sylvestris*, *Origanum vulgare*, *Silene nutans*, *Trifolium alpestre*, *Vincetoxicum hirundinaria*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3C9	VYSÝCHAVÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – vápencová**	40,8	BK 20–24; BO 22–26	RZm, RZk, (RZt)	ph–h; š–k	vápenec, dolomit, vápencová a dolomitová brekcie	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–45	slunná	(300–)340–560	BK 7–9, DB 1–3, LP 1, HB, JS, JV, TR, BB, MK, BRK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula persicifolia*, *Carex humilis*, *Carex montana*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria viridis*, *Laserpitium latifolium*, *Lathyrus sylvestris*, *Origanum vulgare*, *Silene nutans*, *Trifolium alpestre*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

4C

4C1	VYSÝCHAVÁ BUČINA **modální**	53,3	BK 22–26; SM 22–26	KAma‘(s‘), KAsa‘, RNka‘	hp–ph; š–k	droba, prachovec, fylit, slepenec	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–45	slunná	(340–)440–620	BK 7–9, DB 1–3, JD, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula rapunculoides*, *Filipendula vulgaris*, *Galium verum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Poa nemoralis*, *Potentilla argentea*, *Securigera varia*, *Sedum acre*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Trifolium montanum*, *Viscaria vulgaris*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

4C2	VYSÝCHAVÁ BUČINA **chudší**	4,1	BK 22–26; SM 22–26	KAmd‘m‘(s‘), KAsd‘m‘, RNkd‘m‘	hp–ph; š–k	droba, prachovec, jílovitá břidlice	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–30	slunná	580–620	BK 7–9, DB 1–3, JD, LP, HB, JV
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula rapunculoides*, *Euphorbia cyparissias*, *Festuca ovina*, *Filipendula vulgaris*, *Hylotelephium telephium* agg., *Hypericum montanum*, *Melampyrum pratense*, *Poa nemoralis*, *Potentilla argentea*, *Securigera varia*, *Sedum acre*, *Tanacetum corymbosum*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4C9	VYSÝCHAVÁ BUČINA **specifická – vápencová**	3,0	BK 22–26; SM 22–26	RZm, RZk, (RZt)	ph–h; š–k	vápenec, krystalický vápenec	vrcholy, hřbety, vypouklé mírné až příkré svahy	5–40	slunná	360–500	BK 9–10, DB, LP, HB, JS, JV, TR, MK, BRK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Biscutella laevigata*, *Brachypodium pinnatum*, *Cephalanthera damasonium*, *Cephalanthera longifolia*, *Laserpitium latifolium*, *Lathyrus sylvestris*, *Origanum vulgare*, *Securigera varia*, *Silene nutans*, *Trifolium montanum*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

1B

1B4	BOHATÁ HABROVÁ DOUBRAVA **sušší**	12,0	DBZ 20–22; BO 22–24	KAma‘, KAme‘	hp–ph; (š–k)	slepenec, droba, granodiorit, aplit	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	240–380	DB 7–9, HB 1–3, LP 1–3, JVM, BB, BRK, TR, JS, JLM, MK
	Bylinné patro (±80 %):	*Campanula persicifolia*, *Carex curvata*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Convallaria majalis*, *Dactylis glomerata*, *Dictamnus albus*, *Festuca heterophylla*, *Geranium sanguineum*, *Hypericum montanum*, *Lactuca quercina*, *Lathyrus niger*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Tanacetum corymbosum*, *Teucrium chamaedrys*, *Viola mirabilis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2B

2B1	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	589,1	DBZ 22–24; BO 24–26	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	granodiorit, slepenec, droba, diorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)280–460(–500)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (±80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Dactylis polygama*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Lathyrus niger*, *Melica nutans*, *Melittis melissophyllum*, *Milium effusum*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2B1e	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální – exponovaná**	59,1	DBZ 22–24; BO 24–26	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	granodiorit, slepenec, diorit, metabazalt	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	240–420 (–480)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (±80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2B2	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	32,5	DBZ 22–24; BO 24–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(260–)300–400	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex montana*, *Dactylis polygama*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Lathyrus niger*, *Melica nutans*, *Melittis melissophyllum*, *Milium effusum*, *Poa nemoralis*, *Stellaria holostea*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2B2e	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší – exponovaná**	2,1	DBZ 22–24; BO 24–26	KAma‘	hp–ph; (š–k)	granodiorit	příkré svahy	22–35(–45)	různá	320–360	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2B4	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	839,2	DBZ 22–24; BO 24–26	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	granodiorit, slepenec, droba, diorit, metabazalt	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	(240–)280–460(–500)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (±80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex curvata*, *Carex digitata*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex pilosa*, *Clinopodium vulgare*, *Convallaria majalis*, *Dactylis polygama*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hypericum montanum*, *Lathyrus niger*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Tanacetum corymbosum*, *Veronica chamaedrys* agg., *Vincetoxicum hirundinaria*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
2B4e	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší – exponovaná**	182,3	DBZ 22–24; BO 24–26	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	granodiorit, slepenec, droba, diorit, metabazalt	příkré svahy	22–45	různá	220–440 (–500)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (±80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2B7	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější**	24,3	DBZ 22–24; BO 24–26	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	ph–h; (k)	slepenec, granodiorit, metabazalt, diorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(280–)320–480	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula persicifolia*, *Carex digitata*, *Carex michelii*, *Carex pilosa*, *Convallaria majalis*, *Dactylis polygama*, *Festuca heterophylla*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus niger*, *Lathyrus vernus*, *Melica uniflora*, *Platanthera bifolia*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum multiflorum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stellaria holostea*, *Viola mirabilis*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2B7e	BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **skeletnatější – exponovaná**	5,6	DBZ 22–24; BO 24–26	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	ph; (k)	granodiorit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	340–440	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3B

3B1	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	3309,0	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, granodiorit, slepenec, metabazalt, diorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)320–520(–560)	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3B1e	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	187,4	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	granodiorit, diorit, droba, metabazalt, slepenec	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(240–)280–500	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3B2	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	7,5	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, slepenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus hirtus* agg., *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3B2e	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	9,7	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, granodiorit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	340–500	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3B3	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **nitrofilnější**	0,9	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	400–500	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus hirtus* agg., *Scrophularia nodosa*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3B4	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	182,2	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	granodiorit, slepenec, diorit, droba	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	(280–)320–520	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex pilosa*, *Fragaria moschata*, *Galium aparine*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Stellaria holostea*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3B4e	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	294,8	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	granodiorit, slepenec, droba, diorit	příkré svahy	22–45	převážně slunná	(240–)260–480(–520)	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3B7	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější**	854,0	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	ph; (k)	droba, granodiorit, slepenec, pararula	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)380–560	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hordelymus europaeus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3B7e	BOHATÁ DUBOVÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	61,2	BK 26–28; DBZ 24–26; SM 26–30	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	ph; (k)	droba, granodiorit, diorit, metabazalt	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(240–)300–540(–580)	BK 5–7, DB 1–3, HB 1, JD1, LP, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

4B

4B1	BOHATÁ BUČINA **modální**	2745,0	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, metabazalt, granodiorit, ortorula, fylit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(320–)420–620(–660)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Euphorbia amygdaloides*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4B1e	BOHATÁ BUČINA **modální – exponovaná**	147,7	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, granodiorit, slepenec, diorit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	(320–)360–560(–660)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4B2	BOHATÁ BUČINA **chudší**	190,9	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	droba, slepenec, ortorula, dolerit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(360–)440–580(–660)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Euphorbia amygdaloides*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus hirtus* agg., *Senecio nemorensis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											
4B2e	BOHATÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	23,9	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘	hp–ph; (š–k)	slepenec, droba	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	400–580	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4B3	BOHATÁ BUČINA **nitrofilnější**	4,4	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	460–540	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus hirtus* agg., *Scrophularia nodosa*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4B4	BOHATÁ BUČINA **sušší**	57,3	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, slepenec, jílovitá břidlice	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	500–640	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex pilosa*, *Fragaria moschata*, *Galium aparine*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Stellaria holostea*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4B7	BOHATÁ BUČINA **skeletnatější**	832,4	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	ph; (k)	droba, prachovec, metabazalt, ortorula	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(400–)480–640(–680)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hordelymus europaeus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus hirtus* agg., *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4B7e	BOHATÁ BUČINA **skeletnatější – exponovaná**	154,9	BK 26–30; SM 28–32	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	ph; (k)	droba, prachovec, ortorula, metabazalt	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	360–580 (–620)	BK 7–9, JD 1–3, DB, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

5B

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5B1	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	72,0	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, granodiorit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	520–680	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Euphorbia amygdaloides*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus hirtus* agg., *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
5B1e	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	1,1	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘, KAme‘	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	příkré svahy	22–35	různá	580–600	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
5B2	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	130,3	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	520–680	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (60–80 %):	*Carex sylvatica*, *Euphorbia amygdaloides*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus hirtus* agg., *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5B7	BOHATÁ JEDLOVÁ BUČINA **skeletnatější**	12,2	BK 26–30; SM 30–32	KAma‘(s‘), KAme‘(s‘)	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	520–680	BK 5–7, JD 3–5, JV, JS, LP, JLH
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Aruncus dioicus*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Galium odoratum*, *Lunaria rediviva*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus hirtus* agg., *Senecio nemorensis* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2W

2W1	VÁPENCOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	7,8	DBZ 22–24; BO 22–26	KAve‘, RZk	ph–h; (š–k)	vápenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	240–420	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, MK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (±80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Campanula trachelium*, *Carex pilosa*, *Dactylis polygama*, *Euphorbia epithymoides*, *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melittis melissophyllum*, *Moehringia trinervia*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Viola hirta*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2W1e	VÁPENCOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální – exponovaná**	1,4	DBZ 22–24; BO 22–26	KAve‘, RZk	ph–h; (š–k)	vápenec	příkré svahy	22–30	různá	320–400	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, MK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (±80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2W4	VÁPENCOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	24,5	DBZ 22–24; BO 22–26	KAve‘, RZk, (RZv)	ph–h; (š–k)	vápenec	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	5–22	převážně slunná	340–440	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, MK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (±80 %):	*Anthericum ramosum*, *Brachypodium pinnatum*, *Bupleurum falcatum*, *Carex montana*, *Dactylis polygama*, *Euphorbia epithymoides*, *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Silene nemoralis*, *Tanacetum corymbosum*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
2W4e	VÁPENCOVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší – exponovaná**	1,8	DBZ 22–24; BO 22–26	KAve‘, RZk, (RZv)	ph–h; (š–k)	vápenec	příkré svahy	22–30 (–40)	převážně slunná	340–420	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV, BB, BRK, MK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (±80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3W

3W1	VÁPENCOVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	1203,6	BK 26–28; SM 26–30	KAve‘, (RZk)	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit, vápencová brekcie	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)360–520(–580)	BK 5–7, DB 1–3, HB, LP, JD, JV, JLM, JLH, JS, BB, TR, BRK, MK
	Bylinné patro (±80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Carex pilosa*, *Dactylis polygama*, *Epipactis atrorubens*, *Euphorbia epithymoides*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melittis melissophyllum*, *Moehringia trinervia*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3W1e	VÁPENCOVÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	7,2	BK 26–28; SM 26–30	KAve‘, (RZk)	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit	příkré svahy	22–35 (–45)	různá	340–540	BK 5–7, DB 1–3, HB, LP, JD, JV, JLM, JLH, JS, BB, TR, BRK, MK
	Bylinné patro (±80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3W3	VÁPENCOVÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	17,4	BK 26–28; SM 26–30	KAve‘, (RZk)	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	420–520	BK 5–7, DB 1–3, HB, LP, JD, JV, JLM, JLH, JS, BB, TR, BRK, MK
	Bylinné patro (±80 %):	*Campanula trachelium*, *Carex pilosa*, *Dactylis polygama*, *Epipactis atrorubens*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melittis melissophyllum*, *Moehringia trinervia*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3W4	VÁPENCOVÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	118,0	BK 24–28; SM 26–30	KAve‘, RZk	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	0–22	převážně slunná	(300–)340–520(–560)	BK 5–7, DB 1–3, HB, LP, JD, JV, JLM, JLH, JS, BB, TR, BRK, MK
	Bylinné patro (70–80 %):	*Anthericum ramosum*, *Brachypodium pinnatum*, *Bupleurum falcatum*, *Carex montana*, *Dactylis polygama*, *Euphorbia epithymoides*, *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Laserpitium latifolium*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Silene nemoralis*, *Tanacetum corymbosum*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3W4e	VÁPENCOVÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	7,5	BK 26–28; SM 26–30	KAve‘, RZk	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit	příkré svahy	22–35 (–45)	převážně slunná	(300–)340–460	BK 5–7, DB 1–3, HB, LP, JD, JV, JLM, JLH, JS, BB, TR, BRK, MK
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

4W

4W1	VÁPENCOVÁ BUČINA **modální**	250,2	BK 26–30; SM 28–30	KAve‘, (RZk)	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit, krystalický vápenec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(360–)420–580(–620)	BK 9–10, DB, JD, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Carex pilosa*, *Epipactis atrorubens*, *Euphorbia epithymoides*, *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

4W3e	VÁPENCOVÁ BUČINA **bohatší – exponovaná**	2,1	BK 26–30; SM 28–30	KAve‘, (RZk)	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit, krystalický vápenec	příkré svahy	22–40	různá	500–560	BK 9–10, DB, JD, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Carex montana*, *Euphorbia epithymoides*, *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Laserpitium latifolium*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Silene nemoralis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4W4	VÁPENCOVÁ BUČINA **sušší**	11,4	BK 26–30; SM 28–30	KAve‘, RZk	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit, krystalický vápenec	mírné až střední svahy (horní části), hřbety	0–22	převážně slunná	340–540	BK 9–10, DB, JD, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Campanula trachelium*, *Carex pilosa*, *Epipactis atrorubens*, *Euphorbia epithymoides*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4W4e	VÁPENCOVÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	17,3	BK 26–30; SM 28–30	KAve‘, RZk	ph–h; (š–k)	vápenec, dolomit, krystalický vápenec	příkré svahy	22–40	převážně slunná	340–480	BK 9–10, DB, JD, LP, JV, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (±80 %):	–„–									
	Mechové patro:										
Poznámka											

1H

1H1	HLINITÁ HABROVÁ DOUBRAVA **modální**	19,1	DBZ 20–24	HNm(g‘), HNl(g‘)	h–jh	spraš, sprašová hlína	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	240–360	DB 7–9, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK, MK
	Bylinné patro (±80 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Campanula persicifolia*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Convallaria majalis*, *Dactylis polygama*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria moschata*, *Lathyrus niger*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Viola hirta*, *Viola mirabilis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1H4	HLINITÁ HABROVÁ DOUBRAVA **sušší**	1,0	DBZ 20–22	HNm, HNl	h–jh	spraš, sprašová hlína	(vypouklé) mírné až střední svahy	5–22	převážně slunná	240–420	DB 7–9, HB 1–3, LP 1–3, BB, BRK, MK
	Bylinné patro (±80 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula persicifolia*, *Carex humilis*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Convallaria majalis*, *Dictamnus albus*, *Fragaria moschata*, *Hylotelephium telephium* agg., *Inula salicina*, *Iris variegata*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Tanacetum corymbosum*, *Verbascum chaixii* subsp. *austriacum*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

2H

2H1	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	90,7	DBZ 22–26; BO 22–26	HNl, HNm, (LUma‘)	h–jh	spraš, sprašová hlína, polygenetická hlína	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	240–420 (–480)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Campanula persicifolia*, *Carex montana*, *Carex pilosa*, *Convallaria majalis*, *Corydalis cava*, *Corydalis solida*, *Dactylis polygama*, *Lathyrus niger*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Primula veris*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Veronica chamaedrys* agg., *Viola hirta*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2H1e	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální – exponovaná**	8,7	DBZ 22–26; BO 22–26	HNl, HNm, (LUma‘)	h–jh	spraš, sprašová hlína, polygenetická hlína	příkré svahy	22–40	různá	240–400	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2H2	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	399,4	DBZ 22–26; BO 22–26	HNl, KAld‘m‘, (LUmd‘m‘)	h–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, sprašová hlína	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)280–440(–480)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Ajuga reptans*, *Campanula persicifolia*, *Carex montana*, *Convallaria majalis*, *Dactylis polygama*, *Hieracium murorum*, *Lathyrus niger*, *Lathyrus vernus*, *Platanthera bifolia*, *Tanacetum corymbosum*, *Veronica officinalis*, *Viola hirta*, *Viola riviniana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
2H2e	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší – exponovaná**	7,5	DBZ 22–26; BO 22–26	HNl, KAld‘m‘, (LUmd‘m‘)	h–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, sprašová hlína	příkré svahy	22–40	různá	300–400 (–440)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2H3	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	390,5	DBZ 22–26; BO 22–26	HNl, HNm, (LUma‘, LUme‘)	h–jh	spraš, sprašová hlína, droba, prachovec	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(220–)260–440(–500)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Anemone ranunculoides*, *Asarum europaeum*, *Campanula persicifolia*, *Carex montana*, *Carex pilosa*, *Corydalis cava*, *Corydalis pumila*, *Corydalis solida*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Fragaria vesca*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium intermedium*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geum urbanum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus niger*, *Lathyrus vernus*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Primula veris*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stellaria holostea*, *Viola mirabilis*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2H3e	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší – exponovaná**	3,6	DBZ 22–26; BO 22–26	HNl, HNm, (LUma‘, LUme‘)	h–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, sprašová hlína	příkré svahy	22–40	různá	(220–)280–380	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2H4	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	35,2	DBZ 22–26; BO 22–26	HNl, HNm	h–jh	spraš, sprašová hlína, polygenetická hlína	plošiny, (vypouklé) mírné až střední svahy	0–22	převážně slunná	240–420 (–460)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Campanula persicifolia*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex pilosa*, *Clinopodium vulgare*, *Dactylis polygama*, *Digitalis grandiflora*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria moschata*, *Galium odoratum*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Poa angustifolia*, *Poa nemoralis*, *Primula veris*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Veronica officinalis*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2H4e	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší – exponovaná**	1,9	DBZ 22–26; BO 22–26	HNl, HNm	h–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, sprašová hlína	příkré svahy	22–40	převážně slunná	240–360	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2H5	HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **vlhčí**	48,2	DBZ 24–26; BK 24–26	HNlg‘, HNmg‘, HNpg‘, LUmg‘a‘(e‘), PRpg‘	h–jh	spraš, sprašová hlína, prachovec, vápnitý jíl	mírně proláklé plošiny, proláklé mírné (až střední) svahy, ploché úžlabiny	0–15	různá	240–440	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, BB, JV, JD, BRK, JLM, TR
	Bylinné patro (±75 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone ranunculoides*, *Betonica officinalis*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Convallaria majalis*, *Corydalis cava*, *Corydalis pumila*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hieracium murorum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Platanthera bifolia*, *Polygonatum multiflorum*, *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3H

3H1	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	966,1	DBZ 24–28; BK 26–30; SM 26–30	LUma‘, KAla‘, HNl, HNm	h–jh	droba, sprašová hlína, granodiorit, hlinitý překryv	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)280–540(–580)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Campanula persicifolia*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dactylis polygama*, *Lathyrus vernus*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Primula veris*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Scrophularia nodosa*, *Veronica chamaedrys* agg., *Viola hirta*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3H1e	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	10,5	DBZ 24–28; BK 26–30; SM 26–30	LUma‘, KAla‘, HNl, HNm	h–jh	sprašová hlína, slepenec, granodiorit, hlinitý překryv	příkré svahy	22–30 (–40)	různá	320–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3H2	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	14,2	DBZ 24–28; BK 26–30; SM 26–30	KAld‘m‘, LUmd‘m‘, (HNl)	(ph–)h	droba, slepenec, metabazalt, hlinitý překryv	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	300–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (±80 %):	*Ajuga reptans*, *Campanula persicifolia*, *Carex montana*, *Convallaria majalis*, *Dactylis polygama*, *Galium rotundifolium*, *Hepatica nobilis*, *Platanthera bifolia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stellaria holostea*, *Tanacetum corymbosum*, *Veronica officinalis*, *Viola hirta*, *Viola riviniana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3H3	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	1216,8	DBZ 24–28; BK 26–30; SM 26–30	LUma‘(e‘), HNl, KAla‘(e‘)	h–jh	droba, sprašová hlína, granodiorit, hlinitý překryv	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(240–)280–500(–540)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (±80 %):	*Actaea spicata*, *Anemone ranunculoides*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula persicifolia*, *Carex pilosa*, *Corydalis cava*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Maianthemum bifolium*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Polygonatum multiflorum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Scrophularia nodosa*, *Stellaria holostea*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3H3e	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší – exponovaná**	8,7	DBZ 24–28; BK 26–30; SM 26–30	LUma‘(e‘), HNl, KAla‘(e‘)	(ph–)h	granodiorit, hlinitý překryv	příkré svahy	22–30 (–40)	různá	280–400	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (±80 %):	–„–									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3H4	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	120,8	DBZ 24–28; BK 26–30; SM 26–30	LUma‘, KAla‘, HNl, HNm	h–jh	sprašová hlína, granodiorit, metabazalt, hlinitý překryv	plošiny, (vypouklé) mírné až střední svahy	0–22	převážně slunná	280–480(–560)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (±80 %):	*Campanula persicifolia*, *Carex montana*, *Clematis vitalba*, *Clinopodium vulgare*, *Origanum vulgare*, *Primula veris*, *Silene nutans*, *Tanacetum corymbosum*, *Veronica officinalis*, *Viola hirta*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3H4e	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší – exponovaná**	1,7	DBZ 24–28; BK 26–30; SM 26–30	LUma‘, KAla‘, HNl, HNm	(ph–)h	granodiorit, hlinitý překryv	příkré svahy	22–30 (–40)	převážně slunná	300–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (±80 %):	–„–									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3H5	HLINITÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	633,3	DBZ 24–28; BK 26–30; SM 26–30	LUmg‘a‘(e‘), KAlg‘a‘(e‘), HNlg‘	h–jh	sprašová hlína, droba, granodiorit, hlinitý překryv	mírně prolá klé plošiny, prolá klé mírné (až střední) svahy, ploché úžlabiny	0–15	různá	(260–)320–500(–580)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1–3, HB, LP, JV, BB, JS, TR, JLH, JLM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Adoxa moschatellina*, *Ajuga reptans*, *Anemone ranunculoides*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Festuca gigantea*, *Lathyrus vernus*, *Milium effusum*, *Platanthera bifolia*, *Sanicula europaea*, *Vinca minor*, *Viola reichenbachiana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

4H

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4H1	HLINITÁ BUČINA **modální**	512,0	BK 26–30; SM 28–32	KAla‘, LUma‘	h–jh	droba, prachovec, metabazalt, hlinitý překryv	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(320–)380–560(–600)	BK 7–9, JD 1–3, DB, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (70–90 %):	*Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Epilobium montanum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Oxalis acetosella*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Scrophularia nodosa*, *Veronica chamaedrys* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4H1e	HLINITÁ BUČINA **modální – exponovaná**	0,2	BK 26–30; SM 28–32	KAla‘, LUma‘	h–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, hlinitý překryv	příkré svahy	22–30	různá	500–540	BK 7–9, JD 1–3, DB, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4H3	HLINITÁ BUČINA **bohatší**	215,5	BK 26–30; SM 28–32	KAla‘(e‘), LUma‘(e‘), (HNl)	h–jh	droba, prachovec, granodiorit, hlinitý překryv	plošiny, mírné až střední svahy	0–22	různá	(220–)440–580	BK 7–9, JD 1–3, DB, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (80–90 %):	*Actaea spicata*, *Adoxa moschatellina*, *Anemone ranunculoides*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Corydalis cava*, *Epilobium montanum*, *Lathyrus vernus*, *Milium effusum*, *Moehringia trinervia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Scrophularia nodosa*, *Stachys sylvatica*, *Veronica chamaedrys* agg., *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4H5	HLINITÁ BUČINA **vlhčí**	241,6	BK 26–30; SM 28–32	KAlg‘a‘(e‘), LUmg‘a‘(e‘)	h–jh	droba, prachovec, metabazalt, hlinitý překryv	mírně proláklé plošiny, proláklé mírné (až střední) svahy, ploché úžlabiny	0–15	různá	(340–)400–600(–640)	BK 7–9, JD 1–3, DB, HB, LP, JV, JS, TR, JLH
	Bylinné patro (80–90 %):	*Actaea spicata*, *Ajuga reptans*, *Anemone ranunculoides*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Festuca gigantea*, *Lathyrus vernus*, *Milium effusum*, *Sanicula europaea*, *Stachys sylvatica*, *Vicia sepium*, *Vinca minor*, *Viola reichenbachiana*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2D

2D1	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	57,5	DBZ 22–26; BK 22–26	HNm, HNl, KAme‘	ph–jh	granodiorit, droba, spraš, sprašová a deluviální hlína	úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	220–380 (–440)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (±90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Anemone ranunculoides*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Corydalis cava*, *Corydalis intermedia*, *Corydalis solida*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Isopyrum thalictroides*, *Lapsana communis*, *Lathyrus vernus*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
2D2	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	75,6	DBZ 22–26; BK 22–26	KAma‘, HNm	ph–h	granodiorit, droba, spraš, sprašová a deluviální hlína	úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	240–440	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Dactylis polygama*, *Dryopteris filix-mas*, *Geum urbanum*, *Melica nutans*, *Rubus* sect. *Rubus*, *Veronica chamaedrys* agg., *Veronica officinalis*, *Viola riviniana*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
2D2e	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší – exponovaná**	1,2	DBZ 22–26; BK 22–26	KAma‘	ph–h	droba, pískovec, metaryolit, deluviální hlína	proláklé báze příkrých svahů	22–35	různá	240–400	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
2D4	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	87,0	DBZ 22–26; BK 22–26	HNm, KAme‘	ph–jh	granodiorit, droba, spraš, sprašová a deluviální hlína	úžlabiny, báze mírných až středních svahů	0–22	převážně slunná	(240–)280–440(–480)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Alliaria petiolata*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Campanula persicifolia*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Carex michelii*, *Carex montana*, *Carex pilosa*, *Clinopodium vulgare*, *Dactylis polygama*, *Festuca heterophylla*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Lapsana communis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Veronica chamaedrys* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2D4e	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **sušší – exponovaná**	4,5	DBZ 22–26; BK 22–26	HNm, KAme‘	ph–jh	granodiorit, droba, deluviální hlína	báze příkrých svahů	22–35	převážně slunná	340–460	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2D5	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **vlhčí**	8,9	DBZ 22–26; BK 22–26	HNmg‘, HNlg‘, KAmg‘e‘	h–jh	granodiorit, pararula, spraš, sprašová a deluviální hlína	údolní dna, svahové úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	220–380	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (90–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Allium ursinum*, *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides*, *Asarum europaeum*, *Betonica officinalis*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex michelii*, *Carex sylvatica*, *Corydalis cava*, *Corydalis solida*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Galium odoratum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Lamium maculatum*, *Lysimachia nummularia*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Paris quadrifolia*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stellaria holostea*, *Viola mirabilis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2D9	OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **specifická – roklinová**	54,8	DBZ 22–26; BK 22–26	KAme‘(g‘), KAne‘(g‘), HNm(g‘)	ph–jh	sprašová a deluviální hlína, granodiorit, droba	neskeletnaté rokle, strže	22–40	stinná	240–360 (–440)	DB 5–7, BK 1–3, HB 1, LP 1, JV 1, JS, JLM, JD, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*, *Dactylis polygama*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geum urbanum*, *Lamium maculatum*, *Melica uniflora*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus caesius*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

3D

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3D1	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	617,7	DBZ 26–28; BK 26–30; SM 28–32	KAme‘, HNl, HNm	ph–jh; (š)	granodiorit, droba, metabazalt, sprašová a deluviální hlína	úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	(220–)280–500(–560)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (±80 %):	*Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Anemone ranunculoides*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Corydalis cava*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3D1e	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **modální – exponovaná**	15,0	DBZ 26–28; BK 26–30; SM 28–32	KAme‘, KAne‘, HNm	ph–jh; (š)	granodiorit, droba, slepenec, sprašová a deluviální hlína	proláklé báze příkrých svahů	22–40	různá	240–440 (–480)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (±80 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3D2	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	186,8	DBZ 26–28; BK 26–30; SM 28–32	KAma‘, HNm	ph–jh; (š)	granodiorit, droba, slepenec, sprašová a deluviální hlína	úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	(240–)280–480(–540)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dactylis polygama*, *Dryopteris filix-mas*, *Galanthus nivalis*, *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3D2e	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	5,9	DBZ 26–28; BK 26–30; SM 28–32	KAma‘, HNm	ph–jh; (š)	droba, prachovec, granodiorit, sprašová a deluviální hlína	proláklé báze příkrých svahů	22–40	různá	320–460 (–500)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
3D4	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **sušší**	1,9	DBZ 26–28; BK 26–30; SM 28–32	KAme‘, HNm	ph–jh; (š)	droba, granodiorit, sprašová a deluviální hlína	úžlabiny, báze mírných až středních svahů	0–22	převážně slunná	420–460	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Alliaria petiolata*, *Campanula persicifolia*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Carex montana*, *Carex pilosa*, *Clinopodium vulgare*, *Dactylis polygama*, *Festuca heterophylla*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Veronica chamaedrys* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3D5	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **vlhčí**	171,6	DBZ 26–28; BK 26–30; SM 28–32	KAmg‘e‘, HNlg‘, HNmg‘	h–jh	droba, prachovec, granodiorit, sprašová a deluviální hlína	údolní dna, svahové úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	(240–)300–520	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (90–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Anemone ranunculoides*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Corydalis cava*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca gigantea*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium phaeum*, *Lathyrus vernus*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3D9	OBOHACENÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – roklinová**	795,7	DBZ 26–28; BK 26–30; SM 28–32	KAme‘(g‘), KAne‘(g‘), HNm(g‘)	ph–jh	droba, prachovec, granodiorit, sprašová a deluviální hlína	neskeletnaté rokle, strže	22–40	stinná	(240–)280–480(–560)	BK 5–7, DB 1–3, JD 1, LP, HB, JV, JLH, JLM, JS, BB, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Glechoma hederacea*, *Melica uniflora*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4D

4D1	OBOHACENÁ BUČINA **modální**	470,6	BK 28–32; SM 30–32	KAme‘, KAne‘, (HNl)	ph–jh	droba, prachovec, slepenec, sprašová a deluviální hlína	úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	340–540 (–600)	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Corydalis cava*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca gigantea*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											
4D1e	OBOHACENÁ BUČINA **modální – exponovaná**	6,7	BK 28–32; SM 30–32	KAme‘, KAne‘, (HNl)	ph–h	droba, granodiorit, slepenec, deluviální hlína	proláklé báze příkrých svahů	22–40	různá	300–480 (–600)	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4D2	OBOHACENÁ BUČINA **chudší**	134,0	BK 28–32; SM 30–32	KAma‘	ph–h	droba, slepenec, granodiorit, deluviální hlína	úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	(320–)380–560(–600)	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Dactylis polygama*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Hepatica nobilis*, *Hordelymus europaeus*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4D2e	OBOHACENÁ BUČINA **chudší – exponovaná**	3,5	BK 28–32; SM 30–32	KAma‘	ph–h	droba, prachovec, granodiorit, deluviální hlína	proláklé báze příkrých svahů	22–45	různá	280–600	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	– „ –									
	Mechové patro:										
Poznámka											
4D3	OBOHACENÁ BUČINA **bohatší**	7,4	BK 28–32; SM 30–32	KAme‘, KAne‘, (HNl)	ph–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	460–540	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Anemone ranunculoides*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Corydalis cava*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca gigantea*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Scrophularia nodosa*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4D5	OBOHACENÁ BUČINA **vlhčí**	102,9	BK 28–32; SM 30–32	KAmg‘e‘, KAng‘e‘, (HNlg‘)	h–jh	droba, prachovec, ortorula, sprašová a deluviální hlína	údolní dna, svahové úžlabiny, prolaklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	(320–)380–560(–620)	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex pilosa*, *Carex sylvatica*, *Corydalis cava*, *Dactylis polygama*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca gigantea*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium phaeum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											
4D9	OBOHACENÁ BUČINA **specifická – roklinová**	798,9	BK 28–32; SM 30–32	KAme‘(g‘), KAne‘(g‘), HNl(g‘)	ph–jh	droba, prachovec, granodiorit, sprašová a deluviální hlína	neskeletnaté rokle, strže	22–40	stinná	(260–)340–560(–640)	BK 7–9, JD 1–3, LP 1, JV 1, DB, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (60–80 %):	*Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex pilosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Glechoma hederacea*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5D

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5D2	OBOHACENÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	0,4	BK 28–30; SM 30–32	KAma‘	ph–h	droba, prachovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	úžlabiny, proláklé báze mírných až středních svahů	0–22	různá	480–580	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JLH, JS, LP, JVM
	Bylinné patro (60–80 %):	*Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Dactylis glomerata*, *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galanthus nivalis*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Hepatica nobilis*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											

1A

1A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ JAVOROHABROVÁ DOUBRAVA **sušší**	0,8	DBZ 20–22; BO 20–24	KAse‘(a‘), RNke‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–ph; k–b	granodiorit	kamenité střední až příkré svahy, hřbety, vrcholy	(5–)15–45	převážně slunná	220–340	DB 5–7, HB 1–3, JVM 1–3, LP 1–3, BB, BRK, JS, JLM, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Alliaria petiolata*, *Anthericum ramosum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex montana*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Dactylis glomerata*, *Dactylis polygama*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Chelidonium majus*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Tanacetum corymbosum*, *Teucrium chamaedrys*, *Vincetoxicum hirundinaria*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2A0	OBOHACENÁ KAMENITÁ JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,9	DBZ 20–24; BO 22–26	AN(sk), KAas‘a‘(e‘)	ph–h; k–b	droba, prachovec, metabazalt (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	0–45	různá	280–400	DB 5–7, HB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, BK 1–3, JS, JLM, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (50–60 %):	*Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Dentaria bulbifera*, *Digitalis grandiflora*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											

2A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	40,6	DBZ 20–24; BO 22–26	KAs(n)e‘(a‘), RNk(n)e‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–h; k–b	granodiorit, droba, prachovec, slepenec	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy	0–45	různá	220–500	DB 5–7, HB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, BK 1–3, JS, JLM, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (50–60 %):	*Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Dentaria bulbifera*, *Digitalis grandiflora*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg.									
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Hypnum cupressiforme* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA **sušší**	185,4	DBZ 20–24; BO 22–26	KAse‘(a‘), RNke‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–h; k–b	granodiorit, droba, prachovec, slepenec	kamenité mírné až příkré svahy (horní části), hřbety, vrcholy	5–45	převážně slunná	220–460 (–520)	DB 5–7, HB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, BK 1–3, JS, JLM, BB, BRK, TR
	Bylinné patro (40–60 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium pinnatum*, *Bromus benekenii*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Digitalis grandiflora*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Vincetoxicum hirundinaria*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

2A9	OBOHACENÁ KAMENITÁ JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA **specifická – vápencová**	258,0	DBZ 20–24; BO 22–26	RZm, RZv, RZk, RZn	ph–h; k–b	vápenec, dolomit, vápencová brekcie	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy, hřbety, vrcholy	0–45	různá	(240–)340–480(–520)	DB 3–5, BK 1–3, HB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JS, JLM, BB, BRK, MK, TR
	Bylinné patro (60–90 %):	*Alliaria petiolata*, *Allium ursinum*, *Asarum europaeum*, *Campanula trachelium*, *Carex digitata*, *Cephalanthera damasonium*, *Corydalis cava*, *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum multiflorum*, *Sanicula europaea*, *Veronica chamaedrys* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3A

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3A0	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **antropogenní**	0,9	BK 24–28; SM 26–30	AN(sk), KAas‘a‘(e‘)	ph–h; k–b	droba, prachovec, jílovitá břidlice (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	0–45	různá	300–440	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Dentaria bulbifera*, *Digitalis grandiflora*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Scrophularia nodosa*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **modální**	478,7	BK 24–28; SM 26–30	KAs(n)e‘(a‘), RNk(n)e‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–h; k–b	droba, slepenec, granodiorit, metabazalt	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy	0–45	různá	(220–)300–580(–620)	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Dentaria bulbifera*, *Digitalis grandiflora*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Scrophularia nodosa*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **chudší**	197,8	BK 24–28; SM 26–30	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp–ph; k–b	droba, granodiorit, prachovec, slepenec	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy	0–45	různá	(220–)280–520(–580)	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Digitalis grandiflora*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **sušší**	593,5	BK 24–28; SM 26–28	KAse‘(a‘), RNke‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–ph; k–b	droba, granodiorit, slepenec, metabazalt	kamenité mírné až příkré svahy, hřbety, vrcholy	5–45	převážně slunná	(240–)300–580	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB
	Bylinné patro (70–80 %):	*Asarum europaeum*, *Brachypodium pinnatum*, *Bromus benekenii*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Digitalis grandiflora*, *Euphorbia cyparissias*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Vincetoxicum hirundinaria*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3A9	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPODUBOVÁ BUČINA **specifická – vápencová**	703,7	BK 24–28; SM 26–30	RZm, RZv, RZk, RZn	ph–h; k–b	vápenec, dolomit	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy, hřbety, vrcholy	0–45	různá	(240–)340–520(–600)	BK 5–7, DB 1–3, JV 1–3, LP 1–3, JLH, JLM, JS, HB, TR, JD, BB, MK, TS, BRK
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Cephalanthera damasonium*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Euphorbia amygdaloides*, *Euphorbia epithymoides*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Vincetoxicum hirundinaria*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

4A

4A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **modální**	808,6	BK 26–30; SM 28–32	KAs(n)e‘(a‘), RNk(n)e‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–h; k–b	droba, granodiorit, slepenec, metabazalt	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy	0–45	různá	(280–)420–620(–660)	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Dentaria bulbifera*, *Digitalis grandiflora*, *Epilobium montanum*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Impatiens noli-tangere*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Scrophularia nodosa*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **chudší**	245,7	BK 26–30; SM 28–32	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp–ph; k–b	droba, granodiorit, slepenec, dolerit	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy	0–45	různá	280–600 (–640)	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Digitalis grandiflora*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											

4A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **sušší**	306,8	BK 26–30; SM 28–32	KAse‘(a‘), RNke‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–ph; k–b	droba, slepenec, granodiorit, metabazalt	kamenité mírné až příkré svahy, hřbety, vrcholy	5–45	převážně slunná	(280–)420–620	BK 5–7, LP 1–3, JV 1–3, DB 1, JD 1, JLH, JS, HB, TR
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Dentaria bulbifera*, *Digitalis grandiflora*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4A9	OBOHACENÁ KAMENITÁ LIPOVÁ BUČINA **specifická – vápencová**	124,3	BK 26–30; SM 28–32	RZm, RZv, RZk, RZn	ph–h; k–b	vápenec, dolomit, krystalický vápenec	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy, hřbety, vrcholy	0–45	různá	(280–)320–540(–600)	BK 7–9, LP 1–3, JV 1–3, JS, JLH, DB, JD, HB, TR, MK, TS, BRK
	Bylinné patro (70–90 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Cephalanthera damasonium*, *Dentaria bulbifera*, *Dentaria enneaphyllos*, *Euphorbia amygdaloides*, *Euphorbia epithymoides*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Galium sylvaticum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Melica nutans*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Vincetoxicum hirundinaria*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

5A

5A1	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **modální**	136,4	BK 26–30; SM 28–32	KAs(n)e‘(a‘), RNk(n)e‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–ph; k–b	droba, granodiorit, prachovec, slepenec	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy	0–35	různá	(460–)520–700	BK 5–7,JDP 1–3, KL 1–3, JLH, LP, JS, JVM
	Bylinné patro (70–80 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Circaea lutetiana*, *Dentaria bulbifera*, *Digitalis grandiflora*, *Epilobium montanum*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Impatiens noli-tangere*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Lunaria rediviva*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Phegopteris connectilis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Scrophularia nodosa*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5A2	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **chudší**	10,3	BK 26–30; SM 28–32	KAsa‘, RNka‘, RNma‘	hp–ph; k–b	droba, prachovec	kamenité plošiny a mírné až příkré svahy	0–35	různá	(520–)560–720	BK 5–7,JDP 1–3, KL 1–3, JLH, LP, JS, JVM
	Bylinné patro (60–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Circaea lutetiana*, *Digitalis grandiflora*, *Dryopteris filix-mas*, *Epilobium montanum*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Melica nutans*, *Phegopteris connectilis*, *Polygonatum verticillatum*, *Pulmonaria officinalis* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											

5A4	OBOHACENÁ KAMENITÁ KLENOVÁ BUČINA **sušší**	16,3	BK 26–30; SM 28–32	KAse‘(a‘), RNke‘(a‘), RNme‘(a‘)	hp–ph; k–b	granodiorit, droba, prachovec	kamenité mírné až příkré svahy, hřbety, vrcholy	5–35	převážně slunná	560–680	BK 5–7,JDP 1–3, KL 1–3, JLH, LP, JS, JVM
	Bylinné patro (60–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Campanula rapunculoides*, *Campanula trachelium*, *Carex muricata* agg., *Circaea lutetiana*, *Dentaria bulbifera*, *Digitalis grandiflora*, *Epilobium montanum*, *Galium odoratum*, *Geum urbanum*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Lunaria rediviva*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum verticillatum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

1J

1J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ HABROVÁ JAVOŘINA **modální**	0,3	DBZ 16–20; HB 16	RNse‘(a‘), RNm(n)e‘(a‘), RNte‘(a‘), LIme‘(a‘)	hp–ph; k–kh	slepenec	suťové a skalnaté svahy	5–45	různá	240–260	JVM 1–3, DB 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BRK, BB, JLM, JS, TR
	Bylinné patro (±60 %):	*Alliaria petiolata*, *Allium ursinum*, *Campanula rapunculoides*, *Carex muricata* agg., *Clinopodium vulgare*, *Corydalis cava*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Chelidonium majus*, *Lamium maculatum*, *Melica uniflora*, *Mercurialis perennis*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Torilis japonica*, *Urtica dioica*, *Viola hirta*, *Viola mirabilis*, *Viola odorata*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
1J4	OBOHACENÁ SKELETOVÁ HABROVÁ JAVOŘINA **sušší**	22,7	DBZ 16–20; HB 16	RNse‘(a‘), RNme‘(a‘), RNte‘(a‘), LIme‘(a‘)	hp–h; k–kh	granodiorit, droba, slepenec, prachovec	suťové a skalnaté svahy, hřbety	5–45	převážně slunná	220–380 (–480)	JVM 1–3, DB 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BRK, BB, JLM, JS, TR
	Bylinné patro (±50 %):	*Alliaria petiolata*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Clinopodium vulgare*, *Dactylis polygama*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Hylotelephium telephium* agg., *Chelidonium majus*, *Melica transsilvanica*, *Melica uniflora*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum odoratum*, *Urtica dioica*, *Vincetoxicum hirundinaria*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
1J8	OBOHACENÁ SKELETOVÁ HABROVÁ JAVOŘINA **specifická – vápencová**	37,5	DBZ 16–20; HB 16	RZm, RZt, RZs, LIce‘	ph–h; k–kh	vápenec, dolomit, vápencová brekcie	suťové a skalnaté svahy, hřbety	5–45+	různá	(280–)320–520	JVM 1–3, DB 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BRK, BB, JLM, JS, TR
	Bylinné patro (±60 %):	*Acinos arvensis*, *Alliaria petiolata*, *Allium flavum*, *Anthericum ramosum*, *Asplenium trichomanes*, *Brachypodium pinnatum*, *Buglossoides purpurocaerulea*, *Bupleurum falcatum*, *Convallaria majalis*, *Corydalis pumila*, *Euphorbia cyparissias*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Lamium maculatum*, *Melica ciliata*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Origanum vulgare*, *Polygonatum odoratum*, *Sesleria caerulea*, *Tanacetum corymbosum*, *Teucrium chamaedrys*, *Veronica chamaedrys* agg., *Vincetoxicum hirundinaria*, *Viola hirta*, *Viola mirabilis*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
1J9	OBOHACENÁ SKELETOVÁ HABROVÁ JAVOŘINA **specifická – stržová**	1,3	DBZ 16–22; HB 16	HNm, (RGc)	h–jh	spraš, sprašová hlína	strže	22–45+	stinná	260–340	JVM 1–3, DB 1–3, HB 1–3, LP 1–3, BRK, BB, JLM, JS, TR
	Bylinné patro (20–50 %):	*Alliaria petiolata*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium aparine*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Chelidonium majus*, *Melica uniflora*, *Mycelis muralis*, *Poa nemoralis*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3J

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **modální**	141,7	BK 22–26; HB 20–22	RNse‘(a‘), RNte‘(a‘), RNm(n)e‘(a‘), (LIme‘(a‘))	hp–h; k–kh	droba, granodiorit, slepenec, metabazalt	suťové a skalnaté svahy, hřbety	5–45+	různá	(240–)260–560(–640)	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (60–90 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Dentaria bulbifera*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Impatiens noli-tangere*, *Isopyrum thalictroides*, *Lilium martagon*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3J2	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **chudší**	164,0	BK 22–26; HB 20–22	RNsa‘, RNta‘, RNma‘, (LIma‘)	hp–ph; k–kh	droba, granodiorit, slepenec, metabazalt	suťové a skalnaté svahy, hřbety	5–45+	různá	220–540(–620)	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (60–80 %):	*Actaea spicata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rapunculoides*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas* agg., *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Oxalis acetosella*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3J4	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **sušší**	25,6	BK 22–26; HB 20–22	RNse‘(a‘), RNme‘(a‘), RNte‘(a‘), LIme‘(a‘)	hp–h; k–kh	droba, prachovec, granodiorit, slepenec	suťové a skalnaté svahy, vrcholy, hřbety	5–45+	převážně slunná	240–600	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (60–70 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rapunculoides*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Lilium martagon*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Poa nemoralis*, *Vincetoxicum hirundinaria*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3J8	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **specifická – vápencová**	447,3	BK 22–28; JS 22–28	RZs, RZt, RZn, LIce‘	ph–h; k–kh	vápenec, dolomit, vápencová brekcie	suťové a skalnaté svahy, vrcholy, hřbety	5–45+	různá	(240–)300–520(–600)	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (±60 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bupleurum falcatum*, *Campanula rapunculoides*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Convallaria majalis*, *Corydalis cava*, *Corydalis solida*, *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Lilium martagon*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*, *Vincetoxicum hirundinaria*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3J9	OBOHACENÁ SKELETOVÁ LIPOVÁ JAVOŘINA **specifická – roklinová**	5,7	BK 22–26; HB 20–22	RNke‘(a‘), RNme‘(a‘), RNne‘(a‘), KAsne‘(a‘)	ph–h; k–b	granodiorit, tonalit	skeletnaté rokle	22–45+	stinná	260–460	JV 1–3, BK 1–3, LP 1–3, DB 1, JD, HB, JS, JLH, JLM, BRK, MK, BB
	Bylinné patro (60–80 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rapunculoides*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Impatiens noli-tangere*, *Isopyrum thalictroides*, *Lilium martagon*, *Melittis melissophyllum*, *Mercurialis perennis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

5J

5J0	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **antropogenní**	0,1	BK 26–28; SM 28–30	ANsk, LIme‘(a‘)	hp–h; k–kh	droba (halda, odval, lom)	opuštěné kamenolomy	5–45	různá	560–580	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JL 1–3, JLH, JS, LP, SM
	Bylinné patro (60–80 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Aruncus dioicus*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Impatiens noli-tangere*, *Isopyrum thalictroides*, *Lilium martagon*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5J1	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **modální**	3,6	BK 26–28; SM 28–30	RNse‘(a‘), RNte‘(a‘), RNm(n)e‘(a‘), (LIme‘(a‘))	hp–h; k–kh	droba, slepenec	suťové a skalnaté svahy, hřbety	5–30	různá	520–720	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JL 1–3, JLH, JS, LP, SM
	Bylinné patro (60–80 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Aruncus dioicus*, *Asarum europaeum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*, *Impatiens noli-tangere*, *Isopyrum thalictroides*, *Lilium martagon*, *Lunaria rediviva*, *Mercurialis perennis*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
5J2	OBOHACENÁ SKELETOVÁ JILMOJASANOVÁ JAVOŘINA **chudší**	26,6	BK 26–28; SM 28–30	RNsa‘, RNta‘, RNma‘, (LIma‘)	hp–ph; k–kh	granodiorit, droba, slepenec, tonalit	suťové a skalnaté svahy, hřbety, vrcholy	5–45	různá	(360–)440–680	JV 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JL 1–3, JLH, JS, LP, SM
	Bylinné patro (60–80 %):	*Actaea spicata*, *Alliaria petiolata*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Campanula rapunculoides*, *Carex digitata*, *Carex muricata* agg., *Dentaria bulbifera*, *Dryopteris filix-mas*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Hepatica nobilis*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

2L

2L1	PAHORKATINNÝ LUH **modální**	54,0	DBL 26–30; OLL 26–30; JS 26–30	FLme‘(g‘), FLke‘(g‘), FLge‘	ph–jh	holocénní fluviální hlína	říční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	220–380 (–440)	DBL 3–5, JS 1–3, JLM 1, JLV 1, JVM, OLL, LP, HB, BB
	Bylinné patro (až 100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Allium ursinum*, *Brachypodium sylvaticum*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Humulus lupulus*, *Impatiens noli-tangere*, *Leucojum vernum*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus caesius*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3L

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3L1	JASANOOLŠOVÝ LUH **modální**	616,1	OLL 28–30; JS 26–30	FLme‘g‘, FLge‘, (FLqe‘, FLkg‘e‘)	ph–h	holocénní fluviální hlína	potoční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	240–540 (–660)	OLL 5–7, JS 1–3, JV, DBL, JLH, JLV, BB
	Bylinné patro (až 100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Cirsium oleraceum*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium phaeum*, *Glechoma hederacea*, *Humulus lupulus*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Leucojum vernum*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Oxalis acetosella*, *Primula elatior*, *Sanicula europaea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3L5	JASANOOLŠOVÝ LUH **vlhčí**	15,4	OLL 28–30; JS 26–30	FLqe‘, GLfe‘	ph–jh	holocénní fluviální hlína	potoční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	260–460 (–520)	OLL 5–7, JS 1–3, JV, DBL, JLH, JLV, BB
	Bylinné patro (až 100 %):	*Ajuga reptans*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Caltha palustris*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Cirsium oleraceum*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum telmateia*, *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon luteum* agg., *Geranium phaeum*, *Glechoma hederacea*, *Humulus lupulus*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Leucojum vernum*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites hybridus*, *Primula elatior*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

5L

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5L1	MONTÁNNÍ (JASANO) OLŠOVÝ LUH **modální**	72,7	OLL 28–30; JS 26–30; SM 30–32	FLmg‘e‘(a‘), FLge‘(a‘), (FLqe‘(a‘), FLkg‘e‘(a‘))	ph–h	holocénní fluviální hlína	potoční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	600–640	OLL 7–9, JS 1–3, SM, KL, JD, JLH
	Bylinné patro (80–100 %):	*Ajuga reptans*, *Cardamine impatiens*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Circaea lutetiana*, *Cirsium oleraceum*, *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Geranium phaeum*, *Geum rivale*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha longifolia*, *Petasites albus*, *Ranunculus flammula*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5L5	MONTÁNNÍ (JASANO) OLŠOVÝ LUH **vlhčí**	3,4	OLL 28–30; JS 26–30; SM 30–32	FLqe‘(a‘), GLfe‘(a‘)	ph–jh	holocénní fluviální hlína	potoční nivy (fluviální roviny)	0–5	—	600–680	OLL 7–9, JS 1–3, SM, KL, JD, JLH
	Bylinné patro (80–100 %):	*Ajuga reptans*, *Caltha palustris*, *Cardamine impatiens*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Circaea lutetiana*, *Cirsium oleraceum*, *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Geranium phaeum*, *Geum rivale*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nemorum*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha longifolia*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Ranunculus flammula*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5L9	MONTÁNNÍ (JASANO) OLŠOVÝ LUH **specifický – prameništní**	23,8	OLL 26–28; JS 26–28; SM 30–32	GLme‘(a‘), GLqe‘(a‘)	ph–jh	droba, prachovec, deluviální hlína	prameniště ve sníženinách plošin a mírných (až středních) svahů	0–15	různá	480–720	OLL 7–9, JS 1–3, SM, KL, JD, JLH
	Bylinné patro (80–100 %):	*Ajuga reptans*, *Caltha palustris*, *Cardamine impatiens*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Circaea lutetiana*, *Cirsium oleraceum*, *Festuca gigantea*, *Filipendula ulmaria*, *Geranium phaeum*, *Geum rivale*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nemorum*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha longifolia*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Ranunculus flammula*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*									
	Mechové patro:										
Poznámka											

3U

3U1	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **modální**	886,7	KL 26–32; JS 26–32; SM 28–34	KAmg‘e‘, KAge‘, FLkg‘e‘, (GLfke‘)	ph–h; (š)	droba, prachovec, slepenec, fluviálně–deluviální hlína	úžlabiny vodotečí	0–22	různá	(260–)300–520(–600)	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JD, OLL, JLM, JLH, JLV, LP, HB, BB
	Bylinné patro (až 100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Allium ursinum*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Euphorbia dulcis*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium phaeum*, *Hepatica nobilis*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Petasites hybridus*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Scrophularia nodosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3U5	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **vlhčí**	37,8	KL 26–32; JS 26–32; SM 28–34	FLke‘g‘, FLge‘, GLfke‘, KAfge‘	ph–h	deluviálně–fluviální hlína, (droba, slepenec, fylit)	širší úžlabiny s aluvii, (potoční nivy)	0–10	různá	(260–)300–500(–540)	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JD, OLL, JLM, JLH, JLV, LP, HB, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Allium ursinum*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum telmateia*, *Euphorbia dulcis*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium phaeum*, *Hepatica nobilis*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nemorum*, *Mercurialis perennis*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites hybridus*, *Sanicula europaea*, *Scrophularia nodosa*, *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

3U7	ÚŽLABNÍ JAVOROVÁ JASENINA **skeletnatější**	192,4	KL 26–32; JS 26–32; SM 28–34	KAgs‘e‘, KAsg‘e‘, (FLye‘)	ph–h; š–k	droba, granodiorit, metabazalt, deluviální hlína	kamenité úžlabiny vodotečí	15–30	převážně stinná	(280–)320–560(–620)	JS 3–5, JV 1–3, DB 1–3, BK 1–3, JLH, JLM, JLV, JD, LP, HB, BB, OLL
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Allium ursinum*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum telmateia*, *Euphorbia dulcis*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium phaeum*, *Hepatica nobilis*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nemorum*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites hybridus*, *Sanicula europaea*, *Scrophularia nodosa*, *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*, *Veronica chamaedrys* agg.										
	Mechové patro:										
Poznámka											

5U

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5U1	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **modální**	218,0	KL 26–32; JS 26–32; SM 30–34	KAmg‘e‘(a‘), KAge‘(a‘), FLkg‘e‘(a‘), (GLfke‘(a‘))	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, tonalit, fluviálně–deluviální hlína	úžlabiny s vodotečí	0–22	převážně stinná	420–640(–680)	JV 1–3, JS 1–3, BK 1–3, JD 1–3, JLH, SM, LP, OLL
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Allium ursinum*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Euphorbia dulcis*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium phaeum*, *Geum rivale*, *Hepatica nobilis*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Mercurialis perennis*, *Milium effusum*, *Petasites albus*, *Petasites hybridus*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Scrophularia nodosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:										
Poznámka											

5U5	ÚŽLABNÍ JASANOVÁ JAVOŘINA **vlhčí**	1,8	OLL 24–28; JS 26–30; SM 28–32	FLke‘g‘(a‘), FLge‘(a‘), GLfke‘(a‘), KAfge‘(a‘)	ph–h; (š)	deluviálně–fluviální hlína	širší úžlabiny s aluvii, (potoční nivy)	0–15	různá	520–640	JV 1–3, JS 1–3, OLL 1–3, BK, JLH, LP, JD, SM
	Bylinné patro (80–100 %):	*Aegopodium podagraria*, *Ajuga reptans*, *Allium ursinum*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum sylvaticum*, *Euphorbia dulcis*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium phaeum*, *Geum rivale*, *Hepatica nobilis*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lathyrus vernus*, *Lysimachia nemorum*, *Mercurialis perennis*, *Myosotis palustris* agg., *Petasites albus*, *Petasites hybridus*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Scrophularia nodosa*, *Senecio nemorensis* agg., *Stachys sylvatica*, *Urtica dioica*, *Veronica chamaedrys* agg.									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

2V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2V1	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **modální**	1,0	DBL 22–30; JS 26–30	KAge‘(a‘), KAqe‘(a‘), HNg, (GLke‘(a‘))	ph–jh; (hrp–k)	granodiorit, sprašová hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	220–420	DB 3–5, BK 1–3, JV 1, JS 1, JD 1, HB, LP, JLM, JLV, OLL, BB, TR
	Bylinné patro (80–100 %):	*Adoxa moschatellina*, *Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis pumila*, *Corydalis solida*, *Dactylis polygama*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Holcus lanatus*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Sanicula europaea*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

2V2	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **chudší**	0,8	DBL 22–30; JS 26–30	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	300–400	DB 3–5, BK 1–3, JV 1, JS 1, JD 1, HB, LP, JLM, JLV, OLL, BB, TR
	Bylinné patro (80–100 %):	*Adoxa moschatellina*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex digitata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Dactylis polygama*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Holcus lanatus*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
2V3	VLHKÁ BUKOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	1,2	DBL 22–30; JS 26–30	KAge‘, KAqe‘, HNg, (GLke‘)	ph–jh	polygenetická hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	260–340	DB 3–5, BK 1–3, JV 1, JS 1, JD 1, HB, LP, JLM, JLV, OLL, BB, TR
	Bylinné patro (80–100 %):	*Adoxa moschatellina*, *Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Anemone ranunculoides*, *Athyrium filix-femina*, *Betonica officinalis*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis pumila*, *Corydalis solida*, *Dactylis polygama*, *Festuca gigantea*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Melica nutans*, *Milium effusum*, *Pulmonaria officinalis* agg., *Rubus* sect. *Rubus*, *Sanicula europaea*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

3V

3V1	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **modální**	115,6	JS 26–30; SM 28–32	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph–jh; (š–k)	droba, granodiorit, fylit, sprašová a deluviální hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	(240–)280–500(–560)	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Adoxa moschatellina*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis pumila*, *Corydalis solida*, *Dactylis polygama*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Holcus lanatus*, *Lysimachia nummularia*, *Sanicula europaea*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
3V2	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **chudší**	14,4	JS 26–30; SM 28–32	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	320–540	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Adoxa moschatellina*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex digitata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Dactylis polygama*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Holcus lanatus*, *Lysimachia nummularia*, *Oxalis acetosella*, *Stellaria holostea*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Mnium hornum*, *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											
3V3	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **bohatší**	4,4	JS 26–30; SM 28–32	KAge‘, KAqe‘, (GLke‘)	ph–jh; (š–k)	droba, prachovec, granodiorit, polygenetická hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	260–380	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, JV, JS, LP, JLH, JLM, JLV, OLL, HB, BB
	Bylinné patro (80–100 %):	*Adoxa moschatellina*, *Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis pumila*, *Corydalis solida*, *Dactylis polygama*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Lysimachia nummularia*, *Sanicula europaea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:										
Poznámka											
3V9	VLHKÁ DUBOVÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	3,6	JS 26–30; SM 28–32	GLka‘(e‘), GLma‘(e‘), (KAqa‘(e‘))	ph–jh; (hrp–š)	granodiorit, sprašová a deluviální hlína	ploché úžlabiny, svahová prameniště	0–22	různá	360–500	BK 3–5, DBL 1–3, JD 1–3, OLL, JS, JV, LP, JLH, JLM, JLV, BB
	Bylinné patro (70–90 %):	*Adoxa moschatellina*, *Athyrium filix-femina*, *Carex brizoides*, *Carex pendula*, *Carex remota*, *Circaea lutetiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Geum urbanum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nummularia*, *Myosotis palustris* agg.										
	Mechové patro:	*Brachythecium rivulare*, *Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

4V

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4V1	VLHKÁ BUČINA **modální**	115,7	JS 26–30; SM 28–32	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	hp–jh; (š–k)	droba, ortorula, fylit, sprašová a deluviální hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	(320–)400–580(–620)	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (80–100 %):	*Adoxa moschatellina*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis solida*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Holcus lanatus*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nummularia*, *Sanicula europaea*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiochila asplenioides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

4V2	VLHKÁ BUČINA **chudší**	14,6	JS 26–30; SM 28–32	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	droba, prachovec, jílovitá břidlice, deluviální hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	440–580	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Adoxa moschatellina*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex digitata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Holcus lanatus*, *Lysimachia nummularia*, *Oxalis acetosella*, *Stellaria holostea*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*, *Rhizomnium punctatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4V3	VLHKÁ BUČINA **bohatší**	0,5	JS 26–30; SM 28–32	KAge‘, KAqe‘, (GLke‘)	ph–jh; (š–k)	droba, prachovec, sprašová a deluviální hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	500–580	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (80–100 %):	*Adoxa moschatellina*, *Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis solida*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nummularia*, *Sanicula europaea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:										
Poznámka											

4V7	VLHKÁ BUČINA **skeletnatější**	4,8	JS 26–30; SM 28–32	KAgs‘a‘(e‘), KAqs‘a‘(e‘)	ph–h; k	metabazalt, granodiorit, (deluviální hlína)	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	350–450	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (80–90 %):	*Adoxa moschatellina*, *Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Brachypodium sylvaticum*, *Carex digitata*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Holcus lanatus*, *Impatiens noli-tangere*, *Sanicula europaea*, *Stellaria holostea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4V9	VLHKÁ BUČINA **specifická – podmáčená**	0,6	JS 26–30; SM 28–32	GLka‘(e‘), GLma‘(e‘), (KAqa‘(e‘))	ph–jh; (š)	droba, metabazalt, granodiorit, deluviální hlína	ploché úžlabiny, svahová prameniště	0–22	různá	0,0	BK 3–5, JD 1–3, DBL 1, JV, JS, JLH, LP, OLL
	Bylinné patro (70–90 %):	*Adoxa moschatellina*, *Athyrium filix-femina*, *Carex pendula*, *Carex remota*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Deschampsia cespitosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Festuca gigantea*, *Galeobdolon luteum* agg., *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Holcus lanatus*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nemorum*, *Lysimachia nummularia*, *Myosotis palustris* agg.										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

5V

5V1	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **modální**	40,6	JS 26–28; SM 28–32	KAga‘(e‘), KAqa‘(e‘), (GLka‘(e‘))	ph–h; (š–k)	droba, prachovec, ortorula, deluviální hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	(440–)460–680	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OLL, OLS, SM
	Bylinné patro (80–100 %):	*Adoxa moschatellina*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Athyrium filix-femina*, *Carex digitata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Circaea lutetiana*, *Corydalis cava*, *Corydalis solida*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Geum rivale*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Impatiens noli-tangere*, *Lysimachia nummularia*, *Petasites albus*, *Petasites hybridus*, *Sanicula europaea*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
5V2	VLHKÁ JEDLOVÁ BUČINA **chudší**	4,8	JS 26–28; SM 28–32	KAga‘, KAqa‘, (GLka‘)	hp–h; (š–k)	granodiorit, deluviální hlína	prohyby plošin, terénní sníženiny, svahové úžlabiny	0–22	různá	550–650	BK 5–7, JD 3–5, KL 1, JS, JLH, LP, JVM, OLL, OLS, SM
	Bylinné patro (70–90 %):	*Adoxa moschatellina*, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Carex digitata*, *Carex remota*, *Carex sylvatica*, *Circaea alpina*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Festuca gigantea*, *Glechoma hederacea*, *Holcus lanatus*, *Lysimachia nummularia*, *Oxalis acetosella*, *Petasites albus*										
	Mechové patro:	*Atrichum undulatum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Rhizomnium punctatum*									
Poznámka											

2O

2O2	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLO(BUKOVÁ) DOUBRAVA **chudší**	0,2	DBL 22–26; JD 22–26	KAga‘(d‘m‘), KAla‘(d‘m‘), PGk(l)a‘(d‘m‘), (LUga‘(d‘m‘))	h–jh	droba, sprašová hlína	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	320–340	DB 7–9, JD 1–3, BK 1–3, LP 1, HB 1, JV, JS
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex brizoides*, *Carex hirta*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Hypericum montanum*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum nemorosum*, *Solidago virgaurea*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

2O3	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLO(BUKOVÁ) DOUBRAVA **bohatší**	0,8	DBL 22–26; JD 22–26	KAg(l)e‘(a‘), HNlg, LUge‘(a‘), PGk(l)e‘(a‘)	h–jh	droba, sprašová hlína	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	290–320	DB 7–9, JD 1–3, BK 1–3, LP 1, HB 1, JV, JS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex brizoides*, *Carex muricata* agg., *Carex pilosa*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Ficaria verna*, *Gagea lutea*, *Geum urbanum*, *Humulus lupulus*, *Potentilla alba*, *Rubus idaeus*, *Sanicula europaea*, *Symphytum officinale*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

3O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **modální**	175,6	DBL 24–26; SM 26–32	KAg(l)a‘, LUga‘, PGka‘, PGla‘	h–jh	droba, granodiorit, pískovec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	(260–)320–540	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Cardamine impatiens*, *Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Lysimachia nemorum*, *Oxalis acetosella*, *Potentilla alba*, *Rubus idaeus*, *Symphytum officinale*									
	Mechové patro:	*Eurhynchium striatum*, *Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											
3O2	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **chudší**	4,7	DBL 24–26; SM 26–32	KAga‘(d‘m‘), KAla‘(d‘m‘), PGk(l)a‘(d‘m‘), (LUga‘(d‘m‘))	ph–h	droba, prachovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	360–400	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (70–80 %):	*Carex brizoides*, *Carex hirta*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Hypericum montanum*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum nemorosum*, *Oxalis acetosella*, *Solidago virgaurea*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											
3O3	OGLEJENÁ SVĚŽÍ JEDLODUBOVÁ BUČINA **bohatší**	71,7	DBL 24–26; SM 26–32	KAg(l)e‘(a‘), LUge‘(a‘), HNlg, PGk(l)e‘(a‘)	h–jh	droba, prachovec, slepenec, (sprašová) hlína	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	280–540	BK 3–5, DB 1–3, JD 1–3, LP, HB, JV, OS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Actaea spicata*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Cardamine impatiens*, *Carex brizoides*, *Carex muricata* agg., *Carex pilosa*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Ficaria verna*, *Gagea lutea*, *Geum urbanum*, *Oxalis acetosella*, *Paris quadrifolia*, *Rubus idaeus*, *Sanicula europaea*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

4O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	586,2	DBL 24–28; SM 28–34	PGka‘, PGma‘, PGla‘, KAga‘, (LUga‘)	ph–h	droba, granodiorit, slepenec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	(360–)400–620	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galium rotundifolium*, *Lysimachia nemorum*, *Oxalis acetosella*, *Rubus hirtus* agg., *Rubus idaeus*, *Symphytum officinale*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l., *Polytrichum formosum*									
Poznámka											
4O3	OGLEJENÁ SVĚŽÍ DUBOVÁ JEDLINA **bohatší**	3,0	DBL 24–28; SM 28–34	PGke‘(a‘), PGme‘(a‘), PGle‘(a‘), KAge‘(a‘), (LUge‘(a‘))	ph–jh	droba, granodiorit, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–15	různá	500–550	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1–3, LP, OS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Actaea spicata*, *Brachypodium sylvaticum*, *Bromus benekenii*, *Carex brizoides*, *Carex muricata* agg., *Carex pilosa*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna*, *Gagea lutea*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Oxalis acetosella*, *Rubus hirtus* agg., *Rubus idaeus*, *Sanicula europaea*, *Senecio nemorensis* agg., *Symphytum officinale*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

5O

5O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ (BUKOVÁ) JEDLINA **modální**	1028,3	SM 28–34; BK 26–28	PGka‘, PGma‘, KAga‘	ph–h	droba, granodiorit, slepenec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	(400–)520–680(–720)	JD 5–7, BK 1–3, SM, OS, LP
	Bylinné patro (70–90 %):	*Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galium rotundifolium*, *Lysimachia nemorum*, *Oxalis acetosella*, *Ranunculus repens*, *Rubus hirtus* agg., *Rubus idaeus*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

6O

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
6O1	OGLEJENÁ SVĚŽÍ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	0,2	SM 30–32	PGma‘, PGka‘, KAga‘, (KPg)	ph–h; (š)	droba, prachovec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	(540–)600–680(–720)	JD 3–5, BK 1–3, SM 1–3, OS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Carex brizoides*, *Carex sylvatica*, *Deschampsia cespitosa*, *Festuca gigantea*, *Galium rotundifolium*, *Lysimachia nemorum*, *Oxalis acetosella*, *Ranunculus repens*, *Rubus hirtus* agg., *Rubus idaeus*									
	Mechové patro:	*Plagiomnium affine* s. l.									
Poznámka											

2P

2P1	OGLEJENÁ KYSELÁ DOUBRAVA S JEDLÍ **modální**	36,1	DBL 22–26; JD 22–26	PGd, PGkd‘, KAgd, KAgd‘	hp–h; (š)	droba, slepenec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	260–440	DB 5–7, JD 1–3, BK, BO, BR, OS, SM
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex brizoides*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

3P

3P1	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **modální**	39,4	DBL 22–26; SM 26–30	PGd, PGkd‘, KAgd, KAgd‘, (LUgd‘)	hp–h; (š)	droba, prachovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	260–440	DB 3–5, JD 1–3, BK 1–3, SM, BR, OS, BO
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Carex brizoides*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nemorum*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

4P

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
4P1	OGLEJENÁ KYSELÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	131,7	DBL 24–26; SM 28–32	PGd, PGkd', KAgd, KAgd'	hp–h; (š)	droba, prachovec, slepenec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	420–580	JD 3–5, DBL 1–3, BK 1, BO 1, SM, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex hirta*, *Carex pilulifera*, *Convallaria majalis*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium rotundifolium*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nemorum*, *Maianthemum bifolium*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Potentilla erecta*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5P

5P1	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **modální**	1354,7	SM 28–32	PGd, PGkd', KAgd, KAgd'	hp–h; (š)	droba, prachovec, granodiorit, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	(420–)540–740	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO 1, BR, OS
	Bylinné patro (40–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex hirta*, *Carex pilulifera*, *Cirsium palustre*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Galium rotundifolium*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nemorum*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg., *Potentilla erecta*, *Pteridium aquilinum*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

5P5	OGLEJENÁ KYSELÁ JEDLINA **vlhčí**	6,8	SM 28–32	PGqd', PGdq	hp–h; (š)	droba, prachovec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	660–680	JD 5–7, BK 1–3, SM 1, BO 1, BR, OS
	Bylinné patro (50–80 %):	*Avenella flexuosa*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex hirta*, *Carex pilulifera*, *Cirsium palustre*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Epilobium palustre*, *Equisetum sylvaticum*, *Galium rotundifolium*, *Luzula luzuloides*, *Luzula pilosa*, *Lysimachia nemorum*, *Maianthemum bifolium*, *Molinia caerulea* agg., *Potentilla erecta*, *Pteridium aquilinum*, *Ranunculus flammula*, *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Hypnum cupressiforme* s. l., *Pleurozium schreberi*, *Pohlia nutans*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

3Q

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **modální**	10,2	DBL 20–24; JD 20–26	PGdz‘, PGkdz‘, PZg	jp–h; (š)	pískovec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	360–470	DB 5–7, JD 2–4, BO 1, BR, OS, BK, SM
	Bylinné patro (40–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Danthonia decumbens*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*									
Poznámka											

4Q

4Q1	OGLEJENÁ CHUDÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	0,2	DBL 20–24; JD 20–26	PGdz‘, PGkdz‘, PZg	jp–h; (š)	pískovec, hlinitý překryv	plošiny a báze mírných svahů, terénní sníženiny	0–10	různá	360–500	JD 5–7, DB 3–5, BO 1, BR 1, SM 1, BK, OS
	Bylinné patro (50–60 %):	*Avenella flexuosa*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Danthonia decumbens*, *Melampyrum pratense*, *Molinia caerulea* agg., *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium vitis-idaea*									
	Mechové patro:	*Dicranum polysetum*, *Dicranum scoparium*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*									
Poznámka											

1G

1G1	MOKŘADNÍ OLŠINA **modální**	1,2	OLL 22–24	GLqe‘(a‘), GLme‘(a‘)	ph–jh	deluviální hlína	mokřady s tůněmi v pokleslinách plošin	0–5	—	240–280	OLL 7–9, VR 1–3, JS, TPC, TPB, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (±90 %):	*Alisma plantago-aquatica*, *Butomus umbellatus*, *Caltha palustris*, *Carex acutiformis*, *Carex elongata*, *Carex vesicaria*, *Cirsium oleraceum*, *Galium palustre* agg. (převážně *G. palustre*), *Hottonia palustris*, *Humulus lupulus*, *Iris pseudacorus*, *Lemna minor*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Lythrum salicaria*, *Myosotis palustris* agg., *Phalaris arundinacea*, *Phragmites australis*, *Solanum dulcamara*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Mnium hornum*, *Plagiothecium denticulatum*, *Rhizomnium punctatum*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
1G4	MOKŘADNÍ OLŠINA **sušší**	0,4	OLL 22–24	GLme‘(a‘), (GLke‘(a‘))	ph–jh	deluviální hlína	mělké sníženiny a mělké prohyby plošin a fluviálních rovin, ploché úžlabiny	0–5	—	320–340	OLL 7–9, VR 1–3, JS, TPC, TPB, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (až 100 %):	*Agrostis stolonifera*, *Barbarea vulgaris*, *Carex acuta*, *Carex acutiformis*, *Deschampsia cespitosa*, *Galium aparine*, *Galium palustre* agg. (převážně *G. palustre*), *Galium uliginosum*, *Glechoma hederacea*, *Iris pseudacorus*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Mentha aquatica*, *Myosotis palustris* agg., *Persicaria hydropiper*, *Phalaris arundinacea*, *Poa trivialis*, *Ranunculus repens*, *Rubus caesius*, *Stachys palustris*, *Symphytum officinale*, *Urtica dioica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

1G8	MOKŘADNÍ OLŠINA **specifická – lužní**	5,2	OLL 22–24	GLfe‘, GLfqe‘	h–jh	fluviální hlína	mokřady s tůněmi a prameniště na fluviálních rovinách	0–5	—	260–300	OLL 7–9, VR 1–3, JS, TPC, TPB, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (±90 %):	*Caltha palustris*, *Calystegia sepium*, *Carex acuta*, *Carex acutiformis*, *Carex vulpina*, *Cirsium oleraceum*, *Deschampsia cespitosa*, *Filipendula ulmaria*, *Galium aparine*, *Galium palustre* agg. (převážně *G. palustre*), *Glechoma hederacea*, *Iris pseudacorus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Lysimachia vulgaris*, *Lythrum salicaria*, *Mentha aquatica*, *Myosotis palustris* agg., *Persicaria hydropiper*, *Persicaria mitis*, *Phalaris arundinacea*, *Phragmites australis*, *Rubus caesius*, *Solanum dulcamara*, *Symphytum officinale*										
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Climacium dendroides*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*									
Poznámka											

3G

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní typ/subtyp/ varieta	Půdní druh; skelet	Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
	Synuzie podrostu										
3G0	GLEJOVÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **antropogenní**	0,9	JD 26–32; OLL 22–28	GLaa‘, ANq	ph–jh	jílovitá břidlice, hlinitý sediment	umělé terénní poklesliny	0–5	—	400–450	DBL 3–5, JD 3–5, OLL 1, SM, OS, BR, LPM, OLS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Mentha aquatica*, *Myosotis palustris* agg., *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Mnium hornum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											
3G1	GLEJOVÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **modální**	0,6	JD 26–32; OLL 22–28	GLma‘, SGma‘, (GLka‘)	ph–jh	droba, prachovec, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách, plochá údolní dna	0–5	—	360–380	DBL 3–5, JD 3–5, OLL 1, SM, OS, BR, LPM, OLS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Mentha aquatica*, *Myosotis palustris* agg., *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Mnium hornum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											
3G3	GLEJOVÁ JEDLOVÁ DOUBRAVA **bohatší**	3,4	JD 26–32; OLL 22–28	GLma‘, SGma‘, (GLka‘)	ph–jh	droba, prachovec, slepenec, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách, plochá údolní dna	0–5	—	360–480	DBL 3–5, JD 3–5, OLL 1, SM, OS, BR, LPM, OLS
	Bylinné patro (90–100 %):	*Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum sylvaticum*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Myosotis palustris* agg., *Scirpus sylvaticus*, *Solanum dulcamara*									
	Mechové patro:	*Brachythecium rutabulum*, *Plagiomnium affine* s. l., *Plagiomnium undulatum*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

4G

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
4G0	GLEJOVÁ DUBOVÁ JEDLINA **antropogenní**	0,2	SM 26–32; OLL 22–28	GLaa‘, ANq	hp–jh	granodiorit, hlinitý sediment	umělé terénní poklesliny	0–5	—	400–500	JD 5–7, DBL 3–5, OLL 1, SM, OS, BR, OLS, BK
	Bylinné patro (70–90 %):	*Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Mentha aquatica*, *Myosotis palustris* agg., *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

4G1	GLEJOVÁ DUBOVÁ JEDLINA **modální**	25,0	SM 26–32; OLL 22–28	GLma‘, SGma‘, (GLka‘)	ph–jh	droba, prachovec, slepenec, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách, plochá údolní dna	0–5	—	(300–)420–560	JD 5–7, DBL 3–5, OLL 1, SM, OS, BR, OLS, BK
	Bylinné patro (70–90 %):	*Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum sylvaticum*, *Juncus conglomeratus*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia nummularia*, *Mentha aquatica*, *Myosotis palustris* agg., *Scirpus sylvaticus*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*, *Stachys sylvatica*										
	Mechové patro:	*Plagiomnium undulatum*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

5G

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
5G1	GLEJOVÁ JEDLINA **modální**	70,2	SM 26–32; OL 22–28	GLma‘(o‘), GLoa‘, SGma‘(o‘), (GLka‘)	ph–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách, plochá údolní dna	0–5	—	(420–)460–680	JD 5–7, SM 1–3, OLL 1, BK, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Equisetum sylvaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Juncus effusus*, *Lycopus europaeus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg., *Petasites albus*, *Petasites hybridus*, *Ranunculus repens*										
	Mechové patro:	*Pleurozium schreberi*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum girgensohnii*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

5G2	GLEJOVÁ JEDLINA **chudší**	39,2	SM 26–32; OL 22–28	GLmd‘m‘(o‘), SGmd‘m‘(o‘), (GLkd‘m‘)	ph–jh	droba, prachovec, jílovitá břidlice, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách, plochá údolní dna	0–5	—	540–660	JD 5–7, SM 1–3, OLL 1, BK, OS, BR, OLS
	Bylinné patro (70–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex canescens*, *Carex elongata*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Juncus effusus*, *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg., *Valeriana dioica*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Bazzania trilobata*, *Calypogeia azurea*, *Lepidozia reptans*, *Mnium hornum*, *Polytrichum commune*, *Polytrichum formosum*, *Sphagnum* sp. div., *Tetraphis pellucida*, *Thuidium tamariscinum*									
Poznámka											

6G

Symbol	Lesní typ	Plocha [ha]	AVB	Půdní		Podloží (substrát)	Reliéf	Sklon [°]	Expozice	Nadmořská výška [m n. m.]	Přirozená dřevinná skladba
				typ/subtyp/ varieta	druh; skelet						
	Synuzie podrostu										
6G1	GLEJOVÁ SMRKOVÁ JEDLINA **modální**	8,6	SM 26–32; OLS 22–26	GLma‘(o‘), GLoa‘, SGma‘(o‘)	hp–jh	droba, slepenec, hlinitý sediment	terénní poklesliny na plošinách, plochá údolní dna	0–5	—	580–700	JD 3–5, SM 3–5, OLS 1, OLL, OS, BK, BR, BRP
	Bylinné patro (60–90 %):	*Calamagrostis villosa*, *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *Carex elongata*, *Carex remota*, *Cirsium oleraceum*, *Crepis paludosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum palustre*, *Equisetum sylvaticum*, *Filipendula ulmaria*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Juncus effusus*, *Molinia caerulea* agg., *Petasites albus*, *Petasites hybridus*, *Ranunculus repens*										
	Mechové patro:	*Dicranum scoparium*, *Polytrichum commune*, *Sphagnum girgensohnii*									
Poznámka											

1T

1T9	MOKŘADNÍ BŘEZOVÁ OLŠINA **specifická – se smrkem**	8,4	OLL 18–22	GLqo‘d‘, GLod‘, GLmo‘d‘	ph–jh	droba, deluviální hlína	poklesliny na plošinách, plochá údolní dna, prameniště	0–5	—	360–660	OLL 7–9, BR 1–3, BRP 1–3, SM 1, OS, JR, OLS
	Bylinné patro (80–100 %):	*Cardamine amara*, *Carex acuta*, *Carex acutiformis*, *Carex canescens*, *Carex elongata*, *Carex riparia*, *Cirsium oleraceum*, *Deschampsia cespitosa*, *Galium palustre* agg. (převážně *G. palustre*), *Glyceria fluitans* agg., *Lysimachia vulgaris*, *Molinia caerulea* agg., *Myosotis palustris* agg., *Scirpus sylvaticus*, *Valeriana dioica*, *Viola palustris*										
	Mechové patro:	*Sphagnum* sp. div.									
Poznámka											

POUŽITÉ ZKRATKY A JMÉNA DŘEVIN:

ZKRATKA	ČESKÉ JMÉNO	VĚDECKÉ JMÉNO
SM	smrk ztepilý	***Picea abies*** (L.) H. Karst.
JD	jedle bělokorá	***Abies alba*** Mill.
BO	borovice lesní	***Pinus sylvestris*** L.
BOR	borovice vystoupavá rašelinná	***Pinus*** ×***ascendens*** Businský **nothosubsp.** ***skalickyi*** Businský
KOS	borovice kleč	***Pinus mugo*** Turra
BL	borovice pyrenejská blatka	***Pinus uncinata*** Ramond ex DC. **subsp.** ***uliginosa*** (G. E. Neumann) Businský
MD	modřín opadavý	***Larix decidua*** Mill**.**
TS	tis červený	***Taxus baccata*** L.
DB	dub letní a okruh dubu zimního	***Quercus robur*** L. + ***Q***. ***petraea*** **agg.**
DBL	dub letní	***Quercus robur*** L.
DBZ	dub zimní, okruh blízce příbuzných druhů	***Quercus petraea*** **agg.**
DBP	dub pýřitý, okruh blízce příbuzných druhů	***Quercus pubescens*** **agg.**
CER	dub cer	***Quercus cerris*** L.
BK	buk lesní	***Fagus sylvatica*** L.
HB	habr obecný	***Carpinus betulus*** L.
JV	javor mléč a j. klen	***Acer platanoides*** L. + ***A***. ***pseudoplatanus*** L.
JVM	javor mléč	***Acer platanoides*** L.
KL	javor klen	***Acer pseudoplatanus*** L.
BB	javor babyka	***Acer campestre*** L.
JS	jasan ztepilý	***Fraxinus excelsior*** L.
JSU	jasan úzkolistý podunajský	***Fraxinus angustifolia*** Vahl **subsp.** ***danubialis*** Pouzar
JLM	jilm habrolistý	***Ulmus minor*** Mill.
JLH	jilm drsný	***Ulmus glabra*** Huds.
JLV	jilm vaz	***Ulmus laevis*** Pall.
BR	bříza bělokorá	***Betula pendula*** Roth
BRP	bříza pýřitá nebo bříza karpatská	***Betula pubescens*** Ehrh**.** / ***Betula carpatica*** Waldst. et Kit. ex Willd.
JR	jeřáb ptačí	***Sorbus aucuparia*** L.
BRK	jeřáb břek	***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz
MK	jeřáb muk, okruh blízce příbuzných druhů	***Sorbus aria*** **agg.**
TR	třešeň ptačí	***Prunus avium*** (L.) L.
STR	střemcha obecná	***Prunus padus*** L.
LP	lípa srdčitá a l. velkolistá	***Tilia cordata*** Mill. + ***T***. ***platyphyllos*** Scop.
LPM	lípa srdčitá (l. malolistá)	***Tilia cordata*** Mill.
OLL	olše lepkavá	***Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn.
OLS	olše šedá	***Alnus incana*** (L.) Moench
OS	topol osika	***Populus tremula*** L.
TPB	topol bílý	***Populus alba*** L.
TPC	topol černý	***Populus nigra*** L.
JIV	vrba jíva	***Salix caprea*** L.

ZKRATKA	ČESKÉ JMÉNO	VĚDECKÉ JMÉNO
VR	vrba bílá, v. křehká a jejich kříženec	***Salix alba*** L. + ***S***. ***euxina*** L. V. Belyaeva + ***S***. ×***rubens*** Schrank
VRD	vrba dvoubarvá	***Salix bicolor*** Willd.
VRE	vrba šedá	***Salix elaeagnos*** Scop.
VRN	vrba nachová	***Salix purpurea*** L.
VRS	vrba slezská	***Salix silesiaca*** Willd.
VRT	vrba trojmužná	***Salix triandra*** L.

Česká a vědecká jména dřevin a vymezení druhových agregátů (agg.) odpovídá Seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka et al. 2012).

SYNUZIE PODROSTU

Synuzie podrostu představuje abecedně seřazený výpis druhů bylinného a mechového patra charakteristický pro konkrétní lesní typ. Výběr charakteristických druhů byl vytvořen na základě empirického rozboru lesnicko-typologických zápisů, které byly pořízeny v porostech s dřevinnou skladbou blízkou skladbě potenciálně přirozené, tj. přibližně odpovídající stupni přirozenosti 4–6 (Macků 2012). Většina synuzií podrostu byla převzata z charakteristik oblastních plánu rozvoje lesů I (1997–2001) a expertně revidována. V souvislosti s revizemi lesnicko-typologických map a úpravou Lesnicko-typologického klasifikačního sytému byl pro některé lesní typy vytvořen výpis charakteristických druhů synuzie podrostu zcela nový.

Taxonomické pojetí a nomenklatura druhů a poddruhů byla sjednocena podle národních seznamů cévnatých rostlin (Danihelka et al. 2012), mechorostů (Kučera et al. 2012) a lišejníků (Liška et al. 2008). Taxonomicky komplikované skupiny druhů nebo druhy, u kterých lze očekávat častější výskyt chyb při determinaci (např. *Molinia arundinacea* a *M*. *caerulea*), byly sloučeny do širších pojetí. V případě bylinného patra byly využity zejména agregáty (zkratka agg.) jednoznačně vymezené v Seznamu cévnatých rostlin České republiky (Danihlelka et al. 2012). Výjimku tvoří lesní ostružiníky, které nejsou řazeny pod *Rubus fruticosus* agg., ale přímo do vnitrorodového taxonu *Rubus* sect. *Rubus*. U mechorostů, lišejníků a v omezené míře také u cévnatých rostlin bylo využito obecnějšího vymezení druhových skupin s pomocí zkratky „s. l.“ (viz níže). Vymezení těchto druhových skupin bylo převzato z Vegetace České republiky 4: Lesní a křovinná vegetace (Chytrý 2013). Pokud bylo možné jednoznačně odvodit konkrétní druh z širšího pojetí (např. z *Anthoxanthum odoratum* agg. v nižších polohách *Anthoxanthum odoratum* s. str.) nebo se alespoň dal předpokládat jeho častější výskyt v daném lesním typu (např. specifikem přírodní lesní oblasti), byl druh uveden samostatně nebo v závorce za zmiňovanou šířeji pojatou skupinou. Zejména jedinci mechů z rodu rašeliník (*Sphagnum*) a lišejníků z rodu dutohlávka (*Cladonia*) jsou při fytocenologickém popisu vegetace často určovány pouze na úroveň rodu, přesto i nejednoznačná informace o jejich prezenci je indikačně významná. Proto, pokud nejsou zmiňovány konkrétní druhy, následuje v těchto případech za rodovým jménem zkratka „sp. div.“, tj. ve smyslu přítomnosti více možných druhů rodu (nikoliv všech).

Do mechového patra jsou kromě mechorostů tradičně řazeny také lišejníky. Ve výpisu charakteristických druhů jsou uvedeny vždy po mechorostech za středníkem. Ačkoliv je pokryvnost mechového patra u řady lesních typů významným determinačním znakem (vysokou pokryvnost mívají zejména kyselá, živinami chudá a jinou než srážkovou vodou ovlivněná stanoviště), nebyla v podkladových materiálech uváděna konzistentně, a tudíž není zmiňována. Nicméně u lesních typů, kde jsou jednotlivé druhy (taxony) mechového patra uváděny, lze pokryvnost předpokládat vyšší.

Zkratky používané v synuziích podrostu:

agg. agregát (latinsky *aggregate*)
sect. sekce (latinsky *sectio*)
s. l. v širším smyslu, v širším pojetí (latinsky *sensu lato*)
s. str. v užším smyslu, v užším pojetí (latinsky *sensu stricto*)
sp. div. různé druhy rodu (latinsky *species* div*ersae*)
subsp. poddruh (latinsky *subspecies*)

Literatura:

Danihelka, J., Chrtek, J. jun. & Kaplan, Z.: *Checklist of vascular plants of the Czech* Republic. Preslia 84, s. 647–811, 2012.

Kučera, J., Váňa, J. & Hradílek, Z.: *Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List and a brief analysis*. Preslia 84, s. 813–850, 2012.

Liška, J., Palice, Z. & Slavíková, Š.: *Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic*. Preslia 80, s. 151–182, 2008.

Macků, J.: *Methodology for establishing the degree of naturalness of forest stands*. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LX, 5, s. 161–166, 2012.

RELIÉF, SKLON, EXPOZICE A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Charakteristiky sklon, expozice a nadmořská výška byly získány analýzou aktuálních lesnicko-typologických map. Rozpětí hodnot představuje interval mezi 5. a 95. percentilem. V závorce jsou uvedeny revidované krajní hodnoty, které přesáhly mezipercentilové rozpětí o více než 20 m u nadmořské výšky a 5° u sklonu.

Svahy se sklonem 5–10° jsou v reliéfu označeny jako mírné, se sklonem 10–22° jako střední, se sklonem 22–45° jako příkré a se sklonem > 45° jako strmé (srázné). Roviny a plošiny mají sklon 0–5°.

PŮDY

PŮDNÍ TYP

(velkými písmeny)

LI	litozem
RN	ranker
RZ	rendzina
PR	pararendzina
RG	regozem
FL	fluvizem
KO	koluvizem
SM	smonice
CE	černozem
CC	černice
SE	šedozem
HN	hnědozem
LU	luvizem
KA	kambizem
PE	pelozem
AD	andozem
KP	kryptopodzol
PZ	podzol
PG	pseudoglej
SG	stagnoglej
GL	glej
SR	solončak
SC	slanec
OR	organozem
KU	kultizem
AN	antropozem

subtyp

(malými písmeny)

a	antropický
an	andický (KA)
c	karbonátový
d	dystrický
e	povrchový (GL)
f	fluvický
fi	fibrický (OR)
g	oglejený
h	humusový (PZ)
h	humolitový (OR)
hr	hořečnatý (LI)
i	stratifikovaný (FL)
j	chromický (rubifikovaný)
k	kambický
l	luvický
m	modální
me	mezický (OR)
n	melanický
o	histický
p	pelický
pl	planický
q	glejový
q	akvický (GL)
r	arenický
s	suťový
s	rankerový
sa	saprický (OR)
su	sulfidický
t	litický
u	umbrický
v	vyluhovaný
ve	vertický (CE)
w	hydroeluviovaný
x	černický (CE)
y	psefitický
z	podzolový (RN)

subtypy kultizemě KU:

ho	hortická
ky	kypřená
ri	rigolovaná

subtypy antropozemě AN:

g	oglejená
h	humózní
hh	hlubokohumózní
in	intoxikovaná
ko	kontaminovaná
p	pelická
pk	překrytá
q	glejová
r	arenická
re	redukovaná
sk	skeletovitá
sp	spolická
su	sulfidická
te	terasovaná
ur	urbická

varieta

(malými písmeny s apostrofem)

a‘	mezobazická
b‘	eutrofní
c‘	slabě karbonátová
d‘	oligobazická (LI)
e‘	eubazická
g‘	slabě (hluboko) oglejená
h‘	humózní
k‘	kaolinitická
l‘	slabě luvická (KA)
n‘	mělce melanická
o‘	zrašelinělá
q‘	hluboko glejová
s‘	silně skeletovitá
u‘	mělce umbrická
v‘	slabě vyluhovaná
w‘	slabě hydroeluviovaná
x‘	hořečnatá
y‘	ortštejnová (PZ)
z‘	podzolovaná
z‘	železitá (PZ)

subvarieta

d‘	oligotrofní
m‘	mezotrofní
d‘m‘	oligomezotrofní

akumulační fáze

i‘	akumulovaná
w‘	erodovaná
y‘	překrytá

půdní druh

p	písčitá (půda)
hp	hlinitopísčitá
ph	písčitohlinitá
h	hlinitá
jh	jílovitohlinitá
j	jílovitá, (jíl)
jp	jílnatý písek
jhp	jílnatohlinitý písek
org	organická

SKELET

hrp	hrubý písek (2–4 mm)
š	štěrk (4–30 mm)
k	kameny (30–300 mm)
b	balvany (> 300 mm)
kh	kompaktní hornina (skála)

SKELETNATOST (příklad zápisu)

hp–ph	hlinitopísčitá až písčitohlinitá, 0–10 % skeletu
hp, (k)	hlinitopísčitá, 10–50 % kamene
ph, k	písčitohlinitá, 50–80 % kamene
(ph), k	kamenitá (> 80 % kamene) s písčitohlinitou výplní

Nomenklatura půdních jednotek je uvedena podle:

Němeček, J. et al.: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Praha: ČZU, 2011;

Vokoun, J. et al.: Příručka pro průzkum lesních půd (Taxonomický klasifikační systém půd ČR v lesnické praxi). Interní text, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2003.